


4786 1- ii my. PK



# TPAKTATB

# ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ

БОЛБЗНЯХЪ, вътрехъчастяхъ,

сь рисунками,

Заключиющій въ себ в Анатомическое и Физіологическое описаніе двтородных в частей обоего пола; начальный источникь, возрожденіе, Натуру, зараженіе и разпространеніе сей зловредной бользии, такь какь и льченіе оной во всёхь ел степеняхь.

Изданный на АглинскомЪ языкъ

Наилучшимъ сей болъзни испытателемъ и практикомъ, Врачебной Науки Докторомъ

Я. Д. Фалкомъ.

СЪ Аглинскаго по вшорому изданію на Нъмецкій переведенный, и изданный нынъ въ свышь на Россійскомъ языкъ

Иваномъ Вороновымъ.

MOCKBA, 1800.

ВЬ Универсишенской Типографіи, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудія.

Съ дозволенъя Московской Цензуры.

ungung demant a beginger in

ЕГО

СІЯТЕЛЬСТВУ,

ДВОРА

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

ДЪЙСТВИТЕЛЬНОМУ

КАММЕРГЕРУ,

ГРАФУ

ГРИГОРЬЮ


ВЛАЛИМИРОВИЧУ

владимировичу ОРЛОВУ,

Милостивьйшему государю.

Не смотря на заглавіе книги, но на пользу, могущу о произойти оть оной какь для страждущихь, такь и для вратующихь, и изь уваженія кь Особю ЕГО СЛЯ ГЕЛЬ-СГВЯ осмюливается посвятить труды свои

Переводчикъ.



## предисловів

# Къ переому Изданію.

Я предлагаю свѣту такую Теорію, которая благополучнымь успѣхомь вы дѣятельности увѣнчанна. Сіе есть по моему мнѣнію надежнѣйшій путь кы достиженію истинны.

Я знаю силу предразсужденій; такожде знаю я, что тоть имбеть преодольвать многія затрудненія, который отважится опровергать закосньлыя заблужденія, особливо поддерживаемыя великими мужами. Однакожь осмьлился я по должности моей и изь любви кь истиннь истребить ивкоторые нельпые предразнать

судки, какb- то Читатель удобно видыть можеть.

Но родь человьческій мало имфеть вы томы пользы, когда покажушь оному погрыщности его, не стараясь купно оныя исправить. Достиженіе сего было главною цьлью сего моего предпріятія. И ежели не значить выступать изь предбловь скромности, когда мы безпристрастно скажемь по, что думаемь о собственной своей работь, то твердо увърень я, что сей Трактать, естьли оному последующе, послужить болье ив пользь моихь собратій, нежели какой либо изв'другихв, которые читаль я о сей матеріи.

Я читаль различныя сочиненія о Венерическихь бользняхь, и признаюсь, что много

обязань писателямь оныхь. Какь исшинны ихь, такь и ихь заблужденія, были для меня полезны. Многіе изв нихв писали такь, какь подлинно думали; а всякаго такь поступающаго мужа почипаю я, хошя мивніе его св моимв и не согласно. Инные поступали вь семь не такь искренно и откровенно, чему была можеть быть причиною ненасыпная жадность кь славь; слабость, которая часто мнотихь, впрочемь великихь мужей, содблывала смфшными, и которая не ръдко лишала ихь того, чего они сь шакою жадностію домогались,

Методь, которому сльдоваль я во всемь Трактать, примьтно отличается оть другихь мнь извъстныхь; и я думаль, что сіе нужно было для вразумленія разположеній моихь о сей матеріи, кой оть обыкновенныхь весьма отдалены. Сверьхь того думаль я, что для большей части Читателей будеть сіе пріятно; а хотя и составляеть цьлое одну цьть, однакожь находятся вь ономь отдьленія, которыя освобождають Читателя болье читать, нежели какь чувствуеть онь вь себь склонности.

Я признаюсь, что описываль очень обстоятельно; но любопытствующіе узнать свойство бользней и льченіе оныхь, найдуть, какь и надыюсь, время, ими на прильжное прочтеніе всей книги употребленное, достаточно вознагражденнымь, а именно: какь

ученые, такь и не ученые. Естьли Читатель не примътно кв важнымв замвчаніямв, касающимся до экономіи живошныхв, или кв разсмошрьнію подобных в бользней, или кь нравственнымь чувствованіямь приведень будеть, не теряя при томь изь глазь надлежащаго предмеша, но получая паче яснъйшее обь ономь понятіе, то надінось, что онь скорье простить мнь такую погрышность (естьли полько шаковою почеспься можеть) нежели противнаго рода; ибо искусная перемъна матеріи, естьли она не совсьмь опдалена опь описуемаго предмеша, непремьнно нужна для предупрежденія, чіпобь предметь, особливо шакого рода, не наскучиль: небреженіе сей предосторожности есть, какь я мню, одна изь главнъйшихь причинь, для чего врачебныя книги не такь часто читають, какь бы надлежало.

Я надъюсь, что исполниль симь мою должность, и ласкаю себя одобреніемь любителей истинны и друзей человьчества. А какой пріемь будеть имьть сія книга у криводушныхь, о томь не пекусь ни мало.

Большую часть жизни моей препроводиль я вь снисканіи познаній; а остальную часть оной желаю посвятить на пользу человьчества, и воздать взаимно за благодъянія, коими я оть общества наслаждался.



# предисловіє


Ко второму Изданію.


Вь жизни моей научился я извинять людскіе предразсудки и слабости; почему, хотя и увбрень быль, что могу изь опыта писать о настоящей бользни и содьйствовашь нъсколько къ поправленію Врачевства, вооружился я толикимь равнодушіемь, сколько мнь нужнымь казалось, для отвращенія, чтобь ни тщетное упованіе похвалы, ни безвременное опасеніе крипінки, не могли никакого имъть на меня вліянія, прежде нежели рьшился производить плань мой. Побъдивши такимь образомь собственныя свои слабости и успокоя свои сомньнія, взяль я перо и писаль сь такимь же удовольствіемь и откровенностью кь свьту, какь бы ввъряль мысли свои кругу друзей, Я быль столько счастливь, что сей мой Трактать благосклонно принять, что и подтверждаеть купно справедливость моихь мыслей.

Помянутое одобреніе и скорой расходь перваго изданія побудиль меня выпустить сіе второе сь большимь удовольствіемь, при чемь спарался я наилучшимь образомь опвратить всякіе вь ономь недостатки.

Первая и Впюрая Часть остались в разсужденіи матеріи непремънными. А поелику вообще утверждали, что я въ Третей Части входиль въ разныхъ мъстахъ въ глубочайшія врачебныя разсужденія, нежели то нужно было: то я казавшееся мнъ излишнимъ выпустиль, и надъюсь, что хотя и сдълалась книга потонъе, однакожъ въ разсужденіи дъла ничего не убыло.

Впрочемь благодарю за одобреніе, коимь я при семь случаь отв весьма многихь удостоень; будучи увърень, что содьйствоваль ньсколько ко благу человьчества и впредь содьйствовать кы оному уповаю, радуюсь, что сльдуя собственнымы моимы увъреніямы, получилы и одобреніе оть достойный шихы врачей.





#### AHATOMUYECKOE

И

### физіологическое описаніе

къ

Родотворенію служащих в састей

#### ОБОЕГО ПОЛА

#### BBEAEHIE.

И тобь имъть точное познаніе о какой либо бользни, то надлежить непремьнно знать ть части, вы коихы имъсть она свое мъстопребываніе; вы противномы случать станешь заблуждаться во тьмы вы предметахы и запутываться, что при свыть знанія отвратить часть І.

бы можно было. В слъдствіе сего предлагаю я благосклонному Читателю вбрное описаніе тьхь частей, вь коихь ядь оной бользни, о которой наоказывается. Чрезь сіе будеть онь вь состояни не полько усмотрьть краткость, удобство и достаточность предлагаемаго образа льченія, но и открыть причину опасных в преткновеній, которымь нькоторые частію отв собственнаго нерадънія, а частію и отв того подвергаются, что попадающся вы неискусных руки.

€>00000¢



#### ГЛАВА І.

О мужеских детородных удахв.

Мужескіе дѣтородные члены удобно въ двухъ видахъ разсматриваемы быть имѣютъ: вопервыхъ, по колику служать они къ отдѣленію и испражненію мочи; а вовторыхъ, въ разсужденіи того, что Источникъ бытія нашего опредѣлиль оные для распложенія рода человѣческаго, и избраль ихъ орудіями для высочайшаго чувственнаго удовольствія.

Простота примътна во всъхв дълахв Природы; и по тому положить можно, что цъль ея далъе простирается, нежели какв человъкв способенв проникнуть, предопредъливь почти одному члену двъ столь различныя работы.

0

X

Не безъ удивленія взираемь мы на различные способы, которымь Природа слъдовала при образованіи къ плодотворенію служащихъ частей въ

разных родах живошных , так в что он в не только различествуют в в величин и образовани, но и соотвытствуют в той стихи, в коей он в обитают в. Нужды в в том в ньтв, какія мный имью я в в разсуждени сей тайны; а лучшее употребленіе, какое можем в мы сдылать из в нашего наблюденія, состоит в в том в том в чтоб в том в том

Къ частямъ, служащимъ къ отдъленїю и изверженїю урины, принадлежатъ почки, мочевые протоки, мочевый пубырь и мочевый стволъ. Послъдній, такъ какъ общій каналъ мочи и съмени, подверженъ напболье заразъ венерической; но о семъ упомянуто будетъ ниже пространнье.

Почки служать къ отдъленію мочи оть крови, доставляемой онымъ нисходящею вътьвію большой боевой

жилы, от которой (почти въ томъ же мѣсшѣ) и дѣтородныя орудія свою часть получають. Оть сей боевой жилы идеть сь объихь сторонь къ почкамь по въшьви, именуемых в боевыя жилы выданвающія (arteriae emulgentes); онъ раздъляющся въ желевообразной части почекъ на безчисленное множество маленьких в вътьвей, и кончатся наконець въ столь же малых вышьвяхь жиль кровавых , сопровождающих в артеріи и относящих в кровь из почек в в большую пустую кровавую жилу, которая приносить кровь для обращнаго кругообращенія къ сердцу.

Во время пребыванія вы почкахы крови отділяють множество небольшихь сухожильныхь стволиковь, между кровавыми сосудами лежащихь, мочу понемногу оть крови, и приносять оную вы своихы каналахы, напослідокь разширяющихся вы ея хранилище, откуда мочевые протоки переносять по томы оную вы мочевой пузырь.

Сте вмъсшилище, или почечный тазб удивишельно образовань. Основанїе онаго сухожильно и наполнено маленькими сосочками (papillae), которые имьють, по моему мивнію, также и нервы; они нъсколько отдалены отв почечной пустоты, вв котпорой находятся, выключая только различныя трубочки, въ самыя почки погружающіяся. Многіе спарались узнашь, какимъ подлинно образомь происходить отдъление, однако съ неудачнымъ успъхомъ. Все, что мы утвердить можемь, есть то, что оно точно происходить. О образъ же сего происхождентя мы столь же мало объявить можемь, какъ и о другихъ неизвъсшныхъ намъ отдъленіяхь, какь-то: панкреатическаго соку, слины и пт. д. а особливо съмени. Въ тазу рождается часто камень, который находять ввономь у особь, страждущих в каменною бользнію. Сїе удостозьряеть нась ясно, что иловатое или каменистое существо обрътается прежде въ крови;

чито оно вскоръ послъ отдъления соединяется; что от в покоя умножается; и что слъдовательно мочегонительныя средства въ сей болъзни полезны.

Корпусь, или основание почекъ состоить изъ трехь родовь сосудовь, а именно: изв боевыхв и кровавыхв жиль и отпабляющихь сосудовь. Безь сомнънія бывающь почки вь живомь швав въ безпрестанномъ движении. Сте движенте, котпорое подобно можешь бышь червообразному движенію кишокь, столькожь нужно вь почкахъ, какъ и въ прочихъ железахъ. Всеобщее есть мнънїе, что Натура снабдила тъло жиромъ для шепла: сїе есть безь сомнънія часть ея цъли; и такъ когда обрътаемъ мы почки въ жирныхъ людяхъ многимъ жиромъ обростшими, то сїе безъ сомньнія для того, чтобъ содержать ихв вь теплоть и движе-HIU.

Отдъленная въ почкахъ моча переносится носредствомъ сухожиль-

ных в протоков в в мочевый пузырь; сіи протоки имъють обыкновенно толщину посредственнаго гусинаго пера. Они входять вы мочевой пузырь такимъ образомъ, что по испражненій мочи замыкаются, и препятствують обратному оной изтеченію, а именно: они извивающся прежде насколько промежду плевъ мочеваго пузыря, и замыкающся по шомъ на подобіе заслонки. Опісюду явствуеть, для чего бываемь мы вь состояни надувать пузырь въ натуральномь его положении; когда же оборачиваемь, то онь ни воды, ни воздуха держать не можеть.

Мочевой пузырь, который состоить изь мускулознаго, сухожильнаго и нервнаго существа, имъеть великую способность разширяться, и равную способность стягиваться. Что оный весьма чувствителень, видно у больныхь, страждущихь каменною бользяйю. Мясистыя онаго волокна снабдыны боевыми и кровавыми жилами, происходящими оть жиль подчревных в. Обыкновенно считаются вы пузыр в три покрова: первый мускулозный, имъющій направленіе свое вы длину; второй поперегы, а третій простирается во всь стороны: но они такы плотно соединены между собою, что можно сказать, что составляють они только одинь.

Шейка мочеваго пузыря весьма мускулозна; мясистыя волокна составляють вы семь мысть сжимательную мышку, которая препятствуеть мочь вытекать вонь изы
пузыря. Стя мочеваго пузыря часть
чувственножильные и плотные, чымы
другая, и оты того подвержена
бываеть воспалентямы и сильнымы
судорогамы, оты комхы многтя сильныя боли воспртяли свое начало, и
оты неприличнаго лычентя сдылались
неисцылимыми; но е семы будемы
говорить пространные вы надлежащемы мысть.

>

ī

0

a

Весь пузырь, а особливо шейка онаго и мочевый стволь снабдены

маленькими железками, отделяющими слизь, которая защищаеть внутренность онаго и мочевый каналь оть такости урины.

Сїй сушь орудія мочи. Но оставимі ихі на время и разсмотримі ті, кои важнійшую приносять пользу, то есть разсмотримі орудія родотворенія.

Ядра, или яички суть не только наиважньйшія изв оныхв, но онь имъюшь вь себъ и нъчшо священное, такъ что заключають въ себъ, кажется, душу мужественности. Ихъ бываеть обыкновенно два: я говорю обыкновенно, пошому что были люди, имъвшје оныхъ по шри, и многје, которые одно только янчко имѣли. Хоня прежде и думали, что одного яичка для оплодотворенія не достаточно, однако теперь догольно уже доказано, что оно какъ у человъка, -такъ и у другихъ животныхъ къ разпложенію рода их в достаточны. Сей недостатокъ никакого болье безпокойства съ собою не приносить,

какв и кривымв одно око, потому что дъйствие одного изв оныхв не зависитв отв дъйствия другаго.

Ядра получають кровь для отдъленія съмени опів нисходящей вътьви большой боевой жилы, насколько пониже выдаивающих в сосудовь, такъ какъ и отъ нъкоторыхъ маленькихъ вътьвей послъднихъ. Сти боевыя жилы, извиваясь насколько во оныхв, соединяющся по томъ съ кровавыми жилами, кои возвращають кровь изъ ядеръ обрашно назадъ, и испражняющь оную въ восходящую въшьвь пустой жилы (vena caua) позади вышьы большой аршеріи лежащую. Сїй боевыя и кровавыя жилы извиваются во чревъ различным в образом в, гдв объемляния брюшиною, а по томъ опускаются въ шулята и въ янчко. КакЪ боевыя жилы разными извижинами приносять кровь вы яичко, то равнымь образомы и кровавыя жилы относять оную многими излучинами изъ янчка въ восходящую вышьвь пустой жилы.

Сіи сосуды называются сосудами, сымя приуготовляющими. Частію строенте их , отчасти же и многтя кривизны причиною тому, что они весьма понки и нъжны, почему и бываеть придавление яичекь сопряжено съ великою опасностію, и омертвънје въ сей часни, естьли не будеть тотчась отделено, весьма скоро навлекаеть смерть. Часть сихь свменных в сосудовь раздъляется на разныя вътьви прежде вступленія вь янчко, и образуеть сплетенте, называемое corpus varicofum. Тъло яичекъ ограждается краемъ, составленнымъ изъ сплетенныхъ между собою сосудовь, которымь следують нъкоторые съменные сосудцы, конечно въ намърении прододжить отдъляющіе сосуды. Самое яичко имбеть величину большаго голубинаго янца; существо онаго мягко и нъж , и состоить изв теперь помянутыхв сосудовь, кои имъющь вы семь мъсшъ толщину волосоподобных в сосудцовъ. Они смъщены съ опідъляющими сосудами, которые кончатся въ общемь каналь, называемомь сосудомъ извергающимь, по средствомь котораго пртуготовленное въ яичкахъ съмя переносится въ съменные пузырьки.

Ядра имъють тройную оболочку: внутренняя изв нихв есть былогная (albuginea); сія есть собственная ядрь оболочка, которая съ внутренней поверхности прилъпляется къ самому ядру, бъла и сухожильна, и при томъ весьма нъжна и чувствишельна. Вторая (elytroides) есть продолжение брюшины, объемлющей плотно стменные сосуды, когда они находятся во чревъ, и проходящей по томъ съ оными сквозь отверстія косой и поперечной брюшных в мышекъ, и сопровождающей оные до начала самаго ядра, гдв и укрвпляется: по томъ отдъляется отъ оных в и образуеть для ядрь новую оболочку, при чемъ кажется, что бълочная въ семъ мъсть облегаеть; внутри она гладка. Въ томъ мъстъ,

)

)

гдъ поводокъ просверливаетъ чрево происходять грыжи или килы, коимь прямо ходящее живошное, человъкъ, четвероногими, наипаче бываеть подвержень; поелику сте отверстте брюшины от в напряженія и прямаго положенія удобно распространяется, и попускаеть входить кишкамъ купно сь поводкомь вь шуляша. Третій покровь ядръ суть шулята, или шулятная сумка. Сія есть натуральной мъшекь и продолжение кожи, съ тою только разницею, что вмъсто жирной плевы имъетъ плеву тонкую, снабденную масистыми волокнами, образующими подвемлющую шулята мышку. Сти двъ послъднія плевы соединены между собою вЪ натуральном в положени весьма плотно, и промежду ими - то бываеть обыкновенно водяная шудять опухоль; а весьма ръдко между продолжениемъ влагалищной и бълочной плевы.

Первая оболочка защищаеть непосредственно ядра и съменные сосуды, и содержить сти нъжныя части въ первомъ ихъ положении, дабы онъ въ состояни были безпрерывно отправлять свою работу; вторая служишь, кажешся, для держанія сихь частей, которая у новорожденных в младенцовъ принадлежишъ ко внутреннимъ частямъ. Я видалъ часто у малых дътей, что никогда одно янчко, особливо лъвое, а иногда и оба вшягивались въ чрево и пропадали: шакже находиль я сте и у взрослыхь. Таковыя противоестественныя разширенія подають поводь къ трыжамъ. Шуляпная мошна есть внъшняя сихъ частей сумка, и подвемлет. ся вверьхв мышечною плевою подвемлющаго мускула; снаружи поддерживаешся она мясисшыми онаго волокнами.

Отпосящие съменные сосуды у засроваго и кръпкаго человъка толщиною въ посредственное гусиное перо. Они происходять по видимому въ томъ мъсть, гдъ съменные сосуды входять, и увиваются около оныхъ; они идуть вверьхъ окру-

женные брюшиною, и стремятся къ чреву, гдв отделясь отв сопровождающих в оные сосудовв, простираются къ задней части шейки мочеваго пувыря, и соединясь съ съменными пузырьками испражняють въ оные съмя. Относящие сосуды стремятся, кажется, какъ я уже сказаль, съ пріуготовляющими сосудами вверьхв, но разсмотря тщательно, увидимъ, что оные прежде вь одномь конць янчка выходять, а по томъ уже вверьхъ идуть. Нижніе раздъленные концы оных в соединяющся удивишельным в образом в св сосудами, изъ коихъ состоять яичьки.

Съменныя хранилища представляють два безпорядочно образованные пузырьки; они находятся при шейкъ мочеваго пузыря на заднепроходней кишкъ нъсколько повыше съменной железы. Вь нихъ- то сохраняется съмя до употреблентя. Они состоять изъ многихъ клътокъ, имъющихъ между собою сообщенте: покровъ ихъ состоить изъ нервнаго и весьма нъжнаго покрова. Два помянушые относящіе сосуды соединяются вь томь самомь мысть, гдь они входять вы съменные пузырьки; отверстія ихъ въ шейку мочеваго пузыря и въ съменной пузырекъ находятся близко одинъ возав другаго, однако безъ всякаго одинъ другому препятствія. Оптносящіе сосуды выпоражниваются вь съменные пузырьки, а сін изливають полученное паки съ удивительною скоростію вь шейку мочеваго пузыря, ошкуда съмя немедленно и пульсоподобнымъ сожаштемъ переносится далве, и сохраняется для изверженія при соитіи.

Отверстія протоково во шейку мочеваго пузыря суть особеннаго строенія: устья суть мускулозны и нероны; во шейко пузыря находится великое множество маленькихо железоко, отделяющихо клейкую слизь, которая охраняето сто часть ото находящихся во моче острыхо солей: однакожо еще во больщемо количество существуюто сти железы Часть І.

e

й

й

A

Ъ

Ъ

.

около помянутых в отверстви. Кромъ сихв железв имъются близь съменной железы еще отверства отв двух в примътно больших в железв, кои опредълены для умножентя вв сей части слизи.

Съменные пузыръки имъють два отверстія, между коими находится мясистый сосочикь. Сей сосочикь замыкаеть оба отверстія. Добросвойственная гоноррея происходить оть слабости мясистаго сего сосочка, и часто трудно выльчивается.

Предстательная, или съменная железа имъеть положенте подъ съменными пузырьками. Часть протоковь, относящихъ съмя оть съменных пузырьковь вы мочеиспускательный стволь проходить сквозь сто железу. Стя железа подала поводъ ко многимъ прентямъ; однако изъ транстата разсмотрънтя явствуеть, что она принадлежить къ тъмъ сложнымъ железамъ, кои состоять изъ многихъ маленькихъ железокъ (Gl. conglomerata); также

совершенно увъренъ я, что оная отдъляеть слизь во внутреннюю часть шейки мочеваго пузыря и въ мясистой сосочекь, и имветъ большое участве вы оплодотворительной силь съмени: ибо вопервых в нашаи оную у кастратовь совсымь сморщившеюся, такъ, что вмъсто того, чтобъ имъть величину Грецкаго оръха, была она плоскою и увядшею; а во вшорыхь вопрошаю я каждаго вь венерических в бользнях в искуснаго и опытнаго врача: не было ли продолжительное съменотечение, или безплодіе съмени непремъннымі сабденыїемь находящагося вь предстательной железъ чирья. И едва извъстно мив большее эло, которымъ больной поражень быть можеть, и которое быт искусству врачей болбе противилось. Пространные о семь будеть говорено

По порядку надлежало бы описащь теперь мочевый стволь; но мы оный осшавиль и раз мощримь прежде мужескій члень вообще; а по томь опишемъ и мочеиспускательный стволь, какъ слъдуеть оный въ цъли нашего разсужденїя.

## О мужеском тлень.

Иппократь назваль оный упорнымь неукротимымь звъремь, да и справедливо; ибо когда онь естественнымь побуждентемь одушевляется, то весьма склонень жертвовать всякою вещью, которая ему хотя малое предположить препятствте. Но сему врожденному побуждентю посвятимь мы особенное разсужденте, а теперь займемся только разсмотрънтемь удивительнаго его строентя.

Мужескій глено одьть кожею; которая есть продолженіе общаго всего тьла покрова, оть коего разнится только вы разсужденія жира: ибо у самыхы даже жирныхы людей бываеть сія часть оть онаго обнаженна. Думають, что частое сей части употребленіе зарожденію жира препятствуєть; но мнь кажется, что сіе не есть тому причиною.

Какъ бы то ни было, но мы обыкновенно жиру въ сей части не находимъ. Сія гока одъваеть мужескій членъ до плъшки, или дътородоудной головки, и шушь укрыпляется; головка же напрошивъ того одъта тоненькою только плевою, или кожицею, отв чего и есть весьма чувствительна. Помянутая кожа весьма слабка, особливо на концъ мужескаго члена, гдъ натура опредълила оную для защищенія сей ньжной часши оть внъшних в насилій, или пока оная находишся во поков, или пока оная от частаго употребленія окрыпнеть. Сіе явно; ибо плъшка у дътей бываеть обыкновенно покрыта до тьхв порв, пока они выростутв, кожа отв частаго соитія разширится и павшка получить болье кръпоспти.

Сїл излишнею кажущаяся кожа именуется крайнею плотью, или переднею кожицею. Натура ни въ ка-кой части не была столь разнообразна, какъ въ сей; ибо у нъкоторыхъ

особь покрываенть она плъшку болье, нежели как нужно. У других же напрошивъ того бываетъ такъ узка, что и чрезъ самое искусство столько не разширяется, чтобъ удалитьсу при соищій за плѣшку. Сіе сшѣсненіе, или сожашіе сопряжено съ нъкоторым в неудобством в; ибо часто случается, что отделенная позади пабшки находящимися железами мокрота дълается острою и причиняеть гнилаго рода язвы даже и безь существованія венерическаго яда. Сте была можеть быть одна изъ побудительныхъ причинъ Моисеева закона въ разсуждении обръзанія: я находиль также многихь, особливо изъ Жидовъ, которые въ шаковой операціи имъли нужду, и которая дъйствительные была, нежели употребляемая Раввинами. Есть еще другіе, у коихъ головка, когда достигнуть они мужественных льшь, не покрыта бываеть, и кажется, что они не довольно имьють кожи, когда члень ихь натрягается: у таковых вывает в крайняя плоть обыкновенно окрыплая, у других в же напротив того такв нъжна, что и прикосновен пальцом в было бы для них в бользненно.

Передняя кожица прикрыпляется уздочкою кы нижней части плышки: иногда кажется она слишкомы натянутою, однако частое соите какы оную, такы и крайнюю плоть ослабляеть. Примычаныя достойно то, что какы у престарылыхы людей побуждение кы любострастию проходить, и слыдовательно напряжение члена и соите рыже бываеть, то и крайняя плоть становится ужые и уздочка сокращается; оты сего могуть произойти, естьли не будуты наблюдать чистоту, язвы подобныя шанкерамы.

На внутренней сторон в передней кожицы находится множество маленьких в железок в, похожих в на булавочныя головки, кои отдъляют в весьма тонкую слизистую мокроту; протоки сих велез в мало по малу изсыхають по мърв частаго обнажения плъшки.

Многіе сукровичные сосуды находятся в оной в различном в направленій; сій и прежде помянутыя железки причиною тому, что сія часть мужескаго члена столькож в подвержена заразв, и удерживает в оную столь же долго, как в и другая часть онаго; опаденіе и напряженіе онаго происходят в равно скоропостижно, как в я восль постараюсь сіе еще болье объяснить.

Корпусь члена мужескаго состоить изь печуристыхь твль и изь мочеваго канала. Первыхь числомь два, покрыты и соединены собственнымь покровомь, и составляють спинку и больтую часть дътороднаго члена. Существо ихъ ноздревато и исполнено пещерками, имъющими между собою сообщение. Каждое изь нихь происходить купно сь подъемлющими мышками оть лобковыхь костей; онъ простираются, соединясь прежде съ мочеиспускательнымь каналомь до плашки. Посредь каждаго сихь печуристыхь таль пробытають нервы и боевая жила. Посладняя происходить от надчревной (сродгавіса), или пупочной боевой жилы; а перьвой частію от большаго голеннаго, частію же от третьяго нерва садальной кости. Сій чувственныя жилы, или нервы повсюду сопровождають боевыя жилы, и раздаляются на безчисленныя маленькія ватьви, какь вы пещеркахь и впадинахь печуристыхь таль, такь и около оныхь.

Всв сїй боевых в жил в вышьви воспріємлятся по концам в толиким в же числом в крововозвратных в жил в; сїй относять кровь из пещерок в печуристых в тел в в большую крововозвратную жилу, лежащую на хребтв мужескаго члена, от в коего и имбет в свое наименованіе. От давленія оной при корн в члена, которое препятствуєть вогнанной в печуристыя тела крови обратно возвращаться, происходит в напряженіе Часть І.

члена, которое до тъх поръ продолжается, пока кровь воспріемлеть прежній свой ходь, оставить печурки, и оныя по прежнему опадуть.

Мочевый каналь начинается вы корнь члена, и идеть внизь промежду печуристыми тылами кы плышкы. Она составляеть по настоящему главную часть уда. Существо онаго ноздревато и преисполнено маленькихы пещерокы.

Дътородоудная головка весьма мъжна и служить наиболъе кълюбострастію; раздражительность оной побуждаеть и прочія части отправлять во время соитія ихь должности. Она состоить изь сплетенія чувственныхь и кровавыхь жиль; пещерки оной менье и оть того въбольшемь количествъ имъются, чъмъ въ прочихь тълахь печуристыхъ.

Уздочка, какъ уже прежде сказино, соединена вънижней части плъшки съ крайнею плотью; но она имъетъ также плотное ссединенте со

внутреннею оболочкою мочеваго канала, гдъ укръпляется на подобіе струны: сїя весьма явственна и сопровождаения при естественномъ возстаніи члена не непріятным в ощущентемъ, при болъзненномъ же напряженіи или пріапизмъ бываеть она крайне чувствительна; от сильной напряженности оной въ злосвойственной гонорреи, когда она нашигивается на подобіе струны, происходить и Латинское название chorda, о чемъ ниже пространнъе говорено будеть. Прочая часть мочеваго ствола имветь, какь уже сказано, до самой шейки мочеваго пузыря существо ноздреватое, мускулозное и сухожильное. Ближе къ предстательной железь дылается мочевый стволь толще и кончится мясистою выпуклиною, которая именуется головкою (bullus). До сей части существо онаго весьма подобно другому, и смъщено изъ кровавыхъ сосудовъ и чувственных в жиль; почему и состоить оный сь печуристыми тьла-

0

ми въ непосредственномъ соединенти, и купно съ оными напрягается и опадаетъ.

Мочевый стволь, служащій прожедомь для мочи и съмени, простирается оть мочеваго пузыря, коего есть оный продолженіе до дътородоудной головки, или плъшки. Длина онаго составляеть, когда оный совершенно протянуть, двенатцать дюймовь; однако сіе у многихь людей не равно. Внутри есть оный существа сухожильнаго и неравнаго, и снабдень повсюду железками, отдъляющими слизкую мокроту, коею оный покрыть, и которая защищаеть оный оть пукости въ мочь, болье или менье находящейся.

Большая часть сихь железокь находишся около шейки мочеваго пузыря. Вь оныхь-то оказывается напередь заражение вы гонорреи, а рыско вы сыменныхы пузырыкахы и предстательной железы. Такы какы число сихы железы умножается, такы и величина ихы прибываеты; у шей-

жи мочеваго пувыря бывають онв болье, и вы семь мысть примытны отверсийя ковлеровых в железв. Онв служать для питанія и смазанія такь называемой пътушей головки (veru montanum, caput gallinaginis), которая служить для съменныхъ пузырьковь, есть весьма нъжна, и как важное плодотворенія орудіе бол ве им веть права на стю клейкую мокроту, да и большую имъеть въ оной нужду. Мужескому члену прасвоивающся двв пары мускуловъ и одинъ одинакой. Я находилъ оныхъ при раздробленти всегда шесть; нижакая часть Анатоміи не подавала причины к в большему несогласію, как в наука о мышкахъ. Слишкомъ точной Анатомик влегко может в удвоить число объявленных в; ибо вв самомв дълв кажется, что большая часть мышекъ состоить изъ многихъ маленькихь: сего ради удержу я принятое число оныхв, особливо по тому, что разность въ семь случав не им веть существенной пользы.

Первая пара мышек в суть ледоемлющія: онъ происходять оть возвышеній свдальных в косшей и кончашся въ ноздреващых в талах в дъщороднаго члена. Сіи мышки, изъ коихь на каждой сторонъ по одной находишся, служащь къ поднящію уда; когда жизненные духи въ оныя вливающся, що онв сокращающся и шанушь двтородный удь кв добковымь костямь. Кровь, которая часшію ошь придавленія крововозвращной жилы кЪ костямь, а частію оть непосредственнаго сокращентя самыя крововозврашныя жилы, или отб других в неизвъстных в причинъ, бу. дучи воспрепятствована въ обратномъ течении, входить въ пещерки ноздреваных в тъль, наполняет в оныя и напрягаеть такимь образомь мужескій члень; прочія мышки шакже при семъ случав помогающь.

Вторая пара мышек в суть поперего лежищия: онъ происходять отв съдальных в костей возлъ подвемлющих в, и кончатся в в головкъ

дътороднаго члена возлъ мышки ускорительной (accelerator). Онв служать сь прежденомянутыми и сь последующими мышками къ тому, чтобъ содержань дътородный членъ вь напряженномь его состояній. Величина оныхъ весьма бываешъ различна: у нъкошорыхъ онъ велики, у другихъ малы, а у иныхъ и совстмъ не бывающь; тушь консчно произошло какое нибудь 216.19ж. денїе: но какъ бы то ни было, одпако изв положенія ихв явствуетв, что Натура опредълила оныя какъ для сокращенія прововозврашных в жиль, такь и для отверзанія ноздреваных в штав и опчасни мочеваго сптвола.

Ассеlerator, или ускорительная мышка есть мышка одинакая; однако легко можно изб оной двъ сдълать, потому что она въ срединъ весьма явственно раздълена: пусть состоить она изб одной, или изб двухв, но сте не имъеть никакого отношентя къ ея пользъ. Она имъ-

еть сухожильное свое начало вь ноздевашомъ штат мочеваго ствола, вскорв послв шого двлаешся мясисиною и облемлень заднюю часть дъпороднаго уда, частію паки отъ онего удаляется и остается при геловсобразномъ корынъ уда дътороднаго, гдв придавляеть крововозврашныя жилы и способствуеть также жЪ давленію всего корня онаго; она проходить наконець купно съ членомъ подъ лобковыми костями, и достигаеть скоро до сжимательной заднепроходней мышки, гав осшавляеть два маленькія мясистыя тьла, называемыя нъкоторыми третьею парою мышекъ дътороднаго члена.

Сію ускорительную мышку почитаю я при напряженіи члена и при изліяніи съмени весьма нужною; ибо объемля такъ сказать члень, придавляеть она самую крововозвратную жилу и смежные крововозвратные сосуды плотнье, нежели дълають то подъемлющія мышки, прижимая оныя къ лобковымъ костямь: ибо естьли бы помянутое давление было вы семь случав главнымы двломы, ко- то искуственное давление рукою, ко- торое гораздо сильные, произвело бы равное дыйстве, чего однакожы не бываеты. Но что подвемлющия мышки кы придавлению крововозвратьной дытороднаго уда жилы и кы напряжению нысколько способствують, не подлежиты никакому сомный.

Когда мужескій члень напрягается, то бываеть вы корнь онаго сильныйшее давленіе и сжатіе, нежели у лобковыхы костей, а во встанихь, или пріапизмь бываеть иногда сїл часть воспаленною, какы я видьлы у одного человыка, который принялы настойки изы Шпанскихы мухь, и оты сей произшедшей опасности сы великимы трудомы помощію сильныхы кровопусканій и мягчительныхы промывательныхы избавился оты смерти.

Что ускорительная мышка при выпрыскиванти съмени наиболъе дътствуеть, въ томь всъ согласны; ибо всему мочевому сиволу прогоняющую силу: доказательствомы выше сказаннаго служаты и ть сжиманія, каковыя дълаемы мы обыкновенно по испущеніи мочи, коимы образомы, естьли часто повторять оныя, можно привести члены вы напряженіе: далье принадлежаты сожатія, бывающія при струнообразномы напряженій (chorda), или сильномы пріапизмы, которыя однако бывають вы послыдствій большою частью не вольныя, и причиняють сильную боль.

Сїй суть дъйствующій дътороднаго уда мышки: ясно видъть можно, что помощію оных мужескій члень напрагается и примътно увеличиваеть удовольствіе при соипіи. Но чудно то, что онъ вь одно время къ сему весьма готовы, а въ другое весьма лънивы бывають: я знаю, мнъ скажуть, что притеченіе жизненных сокавь во всъхь мускулахь такь дълаеть; и я желаль бы дать полное теченіе мыслямь моимь о сей матеріи, но поелику было бы сіє здѣсь слишком в пространно, и принесло бы для настоящей цѣли мало пользы, то оставлю сіе до другаго случая. Да будеть здѣсь довольно замѣтить то, что раздраженіе, дѣйствующее на чувственныя жилы, сіи мускулы также скоро, или и еще скорье, как ви другія съ сожатію побуждаеть.

Всякія корчи бывають болье или менье сопровождаемы напряженіемь мужескаго члена, а эпилептическія также и сильнымь испражненіемь съмени. Боль, каковою страждуть преступники во время съченія прутьями, увеличивается встанихою, или пріапизмомь, который ощущается и сущими на эшафоть. Естьли повышенной провисить до тьхь порь, пока охладьеть, то дьтородный члень его напрягается. Посль сихы насильственныхь и противоестественныхь возстаній всегда слъдуеть ослабленіе члена, навлекающее иног-

да совершенное разслабление, или параличь сихъ частей.

Естественное побужденте никакого почти не требуеть описантя; безсмысленныя животныя слъдують оному по одному естественному влечентю, а человъкъ основанному на разумъ. Исполненте утоляеть вы обоихъ жадность и сладострастте.

Однимь словомь, когда пувырьки наполнены съменемъ, то ощущается побуждение къ соитию. Душа преисполняется желаніемь, и вст прежде описанныя орудія согласуются другими доставить намъ высочайшее чувственное удовольствіе. Ежели наслажденіе съ объихъ сторонъ равно и соотвътственно законамъ природы и совъсти, то бываеть удовольствіе и по получении онаго столькож велико, какъ и предшествующее; въ сію минуту ощущаеть смертный наивеличайшее, можеть быть, счасте, какое онв только имъть можетв. Но когда оно помянутымь законамь противно, то следують укоризны и угрызенія совбети. Какв скоро съменные пузырьки извергнушь съмя, то мышки ослабъвають и душа успокоевается. Опсюду явствуеть, что части сін весьма между собою ссединены плошно, и раздраженіе съмени ві съменных в пузырькахъ должно бышь сильно; и шакке, что сте раздраженте всъмъ дътороднымь орудіямь, даже и съменнымь сосудамь, а чрезь сихь и орудіямь мочи сообщается. Сему - по дъто. родных в частей соотвътствованию и должно принисать, что мочегонительныя средства возбуждають купно и любострастіе.

Наконець строенте всей нашей машины такь расположено, что встволокна, какь бы онт отдалены ни были, мгновенно между собою сообщаются; вы семь удостовтряеть нась повсеминутно кы удивлентю нашему и почти видимымы образомы кругообращенте крови. Кто безь удивлентя возрыть можеть на то, что кровь, находящаяся вы рукт, чрезь

итьсколько миновеній, прошедши чрезь тьла, обрышается уже вы ногь! Сте удивленте еще болье увеличится, когда подумаемы о скорыхы дыйствіяхы, какія оказывають душа и тьло взаимно другь на друга; когда разсмотримы, что внышнія чувства наши, подобно многимы неусыпнымы и вырнымы стражамы, наимальйшее пріятное и непріятное ощущеніе сообщають душь сы молніе подобною скоростію.

Паховыя железы не льзя по настоящему причислить къ дътороднымъ частямъ, ибо не примътно между ими никакого сообщенїя: но поелику онъ въ венерическихъ бользняхъ весьма часто заражаются, то и нужно имъть нъкоторое познанте о строенти оныхъ.

Наука о железах весть во всей Анатоміи самая перепутанная; вообще извъстно, что онъ состоять изъ безчисленнаго множества малых между собою переплетенных сосудщовь; что онъ от дъляють от в крови

разные соки; что онъ въ безпрестанномъ находятся дъйстви; что онъ весьма нъжнаго строения суть и отъ того легко подвержены заваламъ. О железахъ очень много писано; но все выходить на то: что число оныхъ весьма велико; что можно раздълить ихъ на разные классы, и что онъ, какъ выше сказано, весьма страннаго строения суть.

Сравненіе, каковое я сділаю, покажется, можеть быть, смышнымь, хошя оно и не неприлично, а именно: я сравниваю железы в экономіи животных в св толиким в же числом в верстаковь; работники суть сами между собою равны, а разняшся только въ разсужденти отправляемых в ими работв; каждый классв отправляеть свое звание, но всь для общественнаго блага; ни одинь не можеть безь другаго подать совыта, однако при всемъ томъ находятся нъкоторые въ ближайшемъ между собою соединении, чъмь другие; такожде кажешся, что инные и по внъщнему виду болье или менье от дру-

Желаль бы я знать, отв чего ртуть производить слинотечение? от чего дъйствуеть она на слиноточивыя железы, десны, языкь и гортань болье, чъмь на вст други железы? Здъсь вижу я онаго младаго врача, который едва вступиль вы больницу, смъщимся нады мочить невъжествомы; сему должены я сказать, что я почиталь себя прежде столько же премудрымы, какы и оны, но что научаюсь часы отчасу болье познавать недостатки моего свъдения. Обратимся кы железамы:

Обрътающіяся въ пахахъ суть по всему виду сукровичнаго рода и шарообразно скатаны (gl. conglobatae); я замъчу напередъ, что онъ съ дътородными частями нихакой примътной не имъютъ связи; но когда прибъгнемъ къ точному и тщательному раздробленію, то скоро увъримся въ противности, и величайщая

наша учительница, опытность, не допустить нась сомнъваться вы непосредственномы и общемы соединеніи оныхь.

Сверьх в того находится вы паховых вых в железах веще начто, которое особенно располагаеть их в кв воспрінтію любострастнаго яда; ибо для чего смежныя железы не столько подвержены заразь? Но почти излишень вопрось сей, понеже безпрекословно уже принято, что накоторым железы также и накоторым бользнямы болье, или менье подвержены.

Да будеть для нась довольно того замътить, что покровь дътороднаго члена и ядерь снабдънь множествомь сукровичных в сосудовь, имъющихь непосредственное съ паховыми желегами сообщенте. Извъстно намь, что въ зараженномь любострастнымь ядомь оный съ одного мъста на другое переходить отъ распухлыхь ядерь въ пахи, оттуда назаль въ мочеиспускательный стволь,

Часть I.

и т. д. Далве извъстно изв опытовь, что ядь вы паховыхы железахы долгое время сокровены быть можеть; но надлежало бы намы въдать и то, что изв всъхы железы человыческаго тъла ни которыя не бывають такь удобоизлычимы, какы сти самыя.

Бубонь или паховикь весьма скоро изчезнеть, когда льчимы будеть 
надлежащимы образомы; а естьли 
когда либо страдаль кто онымы во 
время льченія долгое время, то 
утверждаю, хотя и не охотно, что 
оный превратнымы образомы врачуемы быль. Я присовокуплю еще, что 
естьли бы сій железы не были необыкновенно добросвойственны, то изы 
десяти ускользнувшихы оты вреда, 
наносимаго сыбдающими средствами, 
были бы девять жертвою сего жесто, 
каго поступка.

Здысь кончу я описание дытородных вастей мужескаго пола, и опишу ты, вы коих вышие нащепервое получаеть начало.





## ГЛАВА И.

О дътородных в тастях женскаго пола.

Стыданность есть свойство женскаго пола, посредством котораго пробрытаеть оный любовь нашу и почтение. Она есть вырный стражь добродытели, и служить кь вознышению всякаго другаго совершенства вы любимом предметь. Она служить оному (полу) подпорою протину его соблазнителей, и приводить вы ужасы тыхь, кои осмыливаются пожертвовать честью и благополучием онаго удовлетворению своего любострастия.

Женщина, потерявшая чувствованіе стыдливости и вдавшаяся вЪ распутство, дълзется тотчасЪ предметомъ презрънїя и ужаса; ей прилагается поносное название, и она теряеть почтение и дружество мужескаго пола и собственнаго своего, и даже самых в тъх несчастных в, ко-торыя в подобной ея находятся участи.

Но однъли женщины обязаны имѣть сте любви достойное свойство? НикакЪ! ибо мужЪ, не имъющій онаго, менъе заслуживаетъ извиненія. Въ глазахь каждой добродъшельной женщины нъть ничего преврительные, как в распушный и развращенный муж в, на словахь ли то или на дълъ. Нецвломудренной мужщина не шолько у добродътельных в женщинь бываеть въ презрънии, но даже и у тъхъ, кои поведением в своим в дълающь величайшій спыдь женскому полу; потому что оказывають чрезь то низкоснь души своей и недостатокъ разума, что всегда навлекаеть на себя общее презрънїе.

Я надъюсь, что сте разсужденте принято будеть вы надлежащемы его видь; ибо я пишу для лидей

разумных в. Злоупотребление, какое малоумные изв книги моей сделать могутв, уповательно не будеть мнв приписано. Я обращаюсь паки кв моему предмету:

Автородныя орудія женскаго пола соединены, такъ какъ и у мужщинь, съ орудіями мочи, но образь соединенія ихь весьма оть онаго различествуеть. Что касается до орудій мочи, то въ разсужденіи мочевых в каналов в мочеваго пузыря не находишся никакого различія, выключая шелько шого, что посл 4ній у другаго пола нъсколько побольше и способень къ сильнъйшему растяжению. Во всей экономии животных сушь вы женском в полв волокна, и все расположение нъжнъе чьмъ у мужщинь, не вы другомь какомь намърении, какъ шолько, чтобъ тъмъ удобнъе уступать суровости и силв мужщинь, которые оп в природы опре-Аблены ко власти, подпорв и защить слабыйшаго пола. Некоторые ушверждающь, что причиною сей

Г 3

**из**жности есть обыкновеніе; но сіє явно несправедливо и противно законамь природы.

Инейка мочеваго пузыря и мочеиспускательный стволь суть очень коротки, но примътно пространнъе, нежели у мужщинь; отв чего имъють онъ предъ оными многія выгоды. Онъ не столько подчержены каменной и другимь бользиямь, какъ мужщины; такожде запущеніе катетера или мочевой трубки бываеть у нихь гораздо удобнъе, и по сей же самой причинъ испускають онъ мочу гораздо свободнъе.

Мы разсмотримь дьтородныя орудія вь двухь видахь, а именю: вопервыхь, поколику онь безь всякаго раздробленія зрынію нашему представляются; а вовторыхь, поколику онь служать кь беременности, и не прежде какь по раздробленій видимы бывають.

Первыя называются женскою срамотою; она заключаеть вы себы всычасти, которыя оты венериной горы до заднепроходной кишки зрыйю и осязанію представляются, и которыя именно суть: венерина гора, большах щель, срамныя губы, женской тлени или клиторй, нимфы, мотевый канало и отверстіе, или устье матогнаго влагалища, которыя разсмотримь теперь по порядку:

Срамота окружена въ объихъ полахь волосами; хошя мужеской поль и болье волосовь получиль на свою часть, которые не мало способствують его силь, однакожь сіи части суть равно снабдены оными. Такъ какъ многія малости подавали причины къ прънзямъ, то не мало шакже и о сихъ спорили, для украшентя ли или для пользы опредвлила Нашура волосы? Но я думаю, что Натура ничего для украшенія не сотворила, чтобъ не было купно и полезно; а воображаемыя украшенія состоять совсъмъ въ другомъ. Гишпанцы прежде сего обривали стю часть у женъ своих в бритвами; да и по сте время. водится сте употребленте у нъкоторых Восточных в народовв.

Вырощение вологовы вы сихы частяхы есшь знакомы возмужалости, и намырение Природы было безы сомныны то, чтобы придать онымы болые крыность.

Венерина гора, или лобокъ, находишся сверьх в лобковых в косшей, наполнена довольнымъ тукомъ и обростаеть многими волосами. Она подвержена одной и той же жеищины перемънамь; величина оной соотвытетвуеть обыкновенно грудамь: во время вырощенія волосовь и при наступленіи мъсячнаго очищенія д стигаеть она до высочайшей величины, и груди напрягаются; Натура созръваеть, невинности исполненные глаза становятся томными, и наступаеть время, въ которое невинность наиболъе пребуеть охранительнаго Ангела. Докол 5 продолжаются страсти, дотоль бываеть она возвышенна даже и у сухощавых в персонв; а какъ сти начнутъ проходить, то она усыхаеть, и дълается у престарълыхь женщинь совсимь плескою.

Щель есть внышнее отверстве сихъ орудій; она находится подъ венериною горою и простирается почти до заднепроходнаго отверствя.

Часть, находящаяся между помянутыми отверстіями, именуется такомб; части, висящія по объимо сторонамо щели, суть продолженія кожи и кльтчетой плевы, которая во семо мость носколько потолще обыкновеннаго; ихо называюто тайныя зубы.

Сїи губы хотя и суть продолженїе кльтчетой плевы, но не имьють тука, какь то обыкновенно думають; ибо и у толстыхь и у сухощавыхь женщинь бывають онь равной толщины. Онь снабдьны множествомь сукровичныхь сосудовь, имьющихь непосредственное сообщенїе сь паховыми железами, оть чего женской поль столькожь подвержень опухолямь паховыхь железь, какь и мужеской.

Внутренняя сторона тайных в тубь весьма тонка и нъжна; почему Часть I.

медвержены онъ любострастнымъ язвамъ, сильно опухають и претерпъвають весьма жестокое воспаленіе, а именно по той же самой причинъ и такимъ же образомъ, какъ передняя кожица въ незалупъ и неотлупъ у мужщинъ; но и то и другое соединено съ меньшею болью и опасностію, такъ какъ и лъченіе съ меньшею трудностію.

Тайный женской удв подвержень также и такимъ испражненјамъ, коимъ мужщины не причастны; а по тому и обязаны онъ болье наблюдать чистоту: ибо отв упущенія оной могушь сій части не только учинишься зловонными, но можеть также отделиться во нихо жирная влага, которая, естьли на долго останется въ морщинахъ или сгибахЪ, дълается ъдкою и подаетъ поводь къ маленькимь язвинамь. Часто случалось, что впрочемь цъломудренныя женщины подпадали въ сихъ обстоятельствахь подозрънію, или по крайней мъръ подозръвали мужей евоихъ, хотя и съ объихъ сторонъ невинны были; поелику оныя раждались от нечистоты, а особливо когда при остротъ соковъ купно и теченте бъли существовало.

Женской удо или клиторо обрътается въ верьхней части щели подъ венериною горою. Вь ономъ ощущается во время соитія наивеличайшее чувственное удовольствіе, такъ какъ у мущинъ въ плъшкъ, которой онь вы маломы весьма подобень, только не имъеть отверстія. Величина онаго не у всъх равна; обыкновенно имъетъ онъ величину гортаннаго язычка. Часто бывал бон у новорожденных в младенцовь такъ великъ, что старухи не осмъливались ръшишь, мальчик ли то, или дъвочка, ошр чего и произошло название гермафродитово или двуснасныхо, коши въ точномъ смыслъ никогда совершенно двуснасных и не было. Мив кажется весьма неввроятнымв, чтобь натура, которая сама по себъ столь совершенна, могла такъ много

забыться въ произведении несовершенства: однако не льзя отрещись въ томъ, что были такие примъры, но въ оныхъ ни одного совершеннаго пола не было.

Клиторъ есть нужное родотворенія орудіе; соединенія онаго простираются далъе, нежели какъ прежде думали.

Онъ происходить оть лобковых в костей двумя сухожильными и мясястыми началами, такъ какъ подъемлющія мышки дьтороднаго мужескаго уда, и кончится ноздреватымь тьломь, которсе отдъляется вы срединъ плевочною преградою. Сія и прежде помянутая часть составляють бедры клитора; мясистыя же начала простираются до кострешных в костей (оба сохе), и суть подъемлющія женскаго уда мышки.

На другой сторонь онаго онь раздылющим, окружають маточное влагалище и образують печуристое тьло; и такь когда клипорь бываеть раздражаемь, то боевыя жилы

онаго придавляются помянутыми мышками, от чего обратное течение крови останавливается и клиторь напрягается; печуристое ть о онаго и обтемлющая маточное влагалище часть и самыя тайныя губы распухають, и дъйствують на мужеский члень во время соитя; чрезь спе не только увеличивають онъ сь объихь сторонь вождельние, но и запирають входь воздуху, такь что мужеское съмя во всей теплоть и непосредственно до основания матки достигнуть можеть.

Изъ всъхъ орудій, опредъленныхъ для соишія, нъшь ни одного шакого, съ которымъ бы женской членъ не имълъ сообщенія; по единому мановенію онаго все находишся къ его услугамъ. Приверженнымъ къ сладострастію сїе извъстно, но они употребляють сїе знаніе во зло.

Клиторъ окруженъ переднею кожицею, или крайнею плотью, которая не что иное есть, какъ удвоенное продолженте кожи. Кромъ помянутых вышек в находятся тутвеще двъ другія, происходящія отвежимательной заднепроходной мышки, хотя св равною справедливостію, а может быть и св большим в правом вомы можно бы причислить их в квишкам в маточнаго влагалища.

Воевыя жилы женскаго двтород. наго уда и печуристых в пъдв имъють одинакое сь боевыми жилами мужескаго члена происхождение; онв раздължопися по разными пещерками, гдъ кронь воспріемленся изв оныхв маленькими крововозврашными жилками, относящими оную паки вЪ подчревные сосуды (vafa hipogastrica). Чувственныя жилы получаеть оный оть нервь междуребренныхь; онз суть весьма многочисленны; а сверьх в пюго получаеть оный еще нъкоторыя чувственножильныя вътьви отъ связки, о которой скоро говорить буду пространнъе. Нервы и крововозвращныя жилы онаго разпространяющся, когда оный оставять по всъмъ частямь тайнаго уда, и сости части во время обниманія распухнуть, то служить сіе весьма много для плотнаго окруженія и тренія мужескаго члена, для разгоряченія сихь частей и изключенія наружнаго воздуха.

Подъ клиторомъ находится мочевый каналь; онь весьма коротокь и окружень довольно кръпкимъ мускуломь, который получиль наименование сжимательнаго.

Внутри имъеть онь такоежь сложение, какь и мочевый каналь у мужщинь, и от того онь также чувствителень. Отверстие онаго окружено небольшимь возвышениемь, которое покрыто продолжениемь внутренняго покрова; оно частию железисто и от части сухожильно. Сла часть обыкновенно сильно заражается венерическимь ядомь, хота и ръдко бываеть непосредственнымы мъстомы пребывания онаго. Родильницы часто страждуть вы ономы от тажкихы родовь, а еще чаще

A 4

отв худаго способа лъченія. Весьма часто разслабляются сіи части отв поманутых в причинъ такъ, что сжимательная мышка лишается способности удерживать мочу, что навърно составляеть не малое неудобство. Однако женщины вообще не такъ подвержены задержанію и запору мочи, какъ мужщины; есть даже примъры, что большіе камни вытащены были изъ пузыря безъ всякаго ръзанія и поврежденія частей.

Нимфы или меньшія губы происходять от передней кожицы клитора и окружають маточное влагалище, а именно такь, что онь мало по малу съужаются и бывають наконець вы такь весьма тонки. Существо ихь ньжно, красно и новдревато, и имьеть почти полулунный видь. Онь суть настоящія губы миточнаго влагалища; онь во время соитія распухають, чрезь что придавляють слегка мужескій члень и препятствують вхожденію наружнаго воздуха; однако кажется, что польза оных веще не вся состоить вы томы: ибо их в можно почесть за настоящія охранительныя складки, которыя дълають во время разрышенія то, что сій части безь раздранія довольно растягиваться могуть.

Бываеть иногда, что раждаются дъти съ большими противь обыкновеннаго нимфами, такъ, что онъ ниже висять и самой срамоты, что подало поводъ къ иному роду гермафродитовь; но сїи также, какъ и переднюю кожицу, можно безъ наимальйшаго затрудненїя хорошимъ лъкарскимъ ножичкомъ или ножницами отръзать. У незамужнихъ сїи нимфы или малыя губы всегда уже и плотиве; отъ частыхъ обниманій дълаются онъ ширъ и слабъе, а особливо дълается сїе отъ частыхъ родовъ.

Промежду меньших в губ в пониже мочеваго канала находится машочное влагалище. Оно опредълено натурою, чтоб в учинить расположение ро-

да нашего наисчастливъйшею въ жизни минутою; но злоупотребление сего вожавленія можеть также быть причиною и нашего несчастія. Я не имъю намъренія представлять завсь нравоучителя; но всякому мыслящему существу должно быть чувствительно, когда видить, сколько безумія предпріємлють оба пола на щеть своего здравія, вмѣсто того, что съ большею удобностью могли бы наслаждаться вожделеннъйшимъ удовольствіем в позволенных в обниманій, которыя соединены съ истиннымъ дружествомъ и любовію, какъ наивеличайшимъ блаженствомъ, опредъленнымъ по волъ всеблагаго Творца нашего.

Маточное влагалище есть тоть каналь, который оть тайнаго уда срамоты до маточнаго устья простирается; длина онаго составляеть оть тести до осьми дюймовь. Оно почти такь широко, какь мужескій члень, и находится между заднетроходной кишки и мочеваго пузыря;

съ оною соединенъ онъ мясистыми волокнами, а съ симъ ни мало.

Оно такъ устроено, что можетъ и въ ширину и въ длину растягиваться, но имъетъ также и способность сужиматься и съ уживаться. Оно преисполнено морщинъ и впереди уже.

При входъ примътна та часть, въ которой полагается дъвственность; она привлекла къ себъ вниманіе. Анатюмиковъ всъхъ времень, которые спорили не только о образованіи, но и о существованіи оной. Заблужденіе нъкоторых было причиною тому, что нъкоторыя невинныя были осуждены, а виновныя преступницы оправданы.

Между душевными силами есть сила разсужденія наивеличайшая; но должно, чтобь она безпрестанно путеводительствуема и охраняема была заравымь разсудкомь. Ибо какь скоро займеть мьсто предразсудокь, то сила разсужденія дылается онаго невольникомь, и человыкь теряеть право мыслящаго существа: онь коле-

блется тогда из стороны в сторону, подобно зыблемой в т пром в былинк в, и заключает в при всей своей учености как в нев в жа.

Наука о признаках важности; а как ученые о достовърности оной не совсъм между собою согласны, то объявлю партію, въ которой я принадлежу: то есть, я сдълаю читателя примъчательным в, и по том в предоставлю ему сте на разсужденте.

Обръззніе облзано происхожденіем в своим в неудобности от вслишком в длинной крайней плоти. Сіе способствовало всячески народному умноженію; Жиды женились весьма молоды и часто не дості гши мужеских в льтв. Предзніе Моисеево касалося, как в законный обрядь, до всьх в, хотя и не можно утвердить, чтобь оное для всьх вравно нужно было: ибо никакой член вебывает в улюдей столь различен вкак в сей, а особливо в в разсужденій пере-

дней кожицы. У дъщей бываетъ крайняя плоть по большой части покрыта, а какъ скоро приближатся онъ къ мужескимъ лъшамъ, то она рано или поздно обнажается; въ сте время страсти ихъ уподобляются труту, который отъ мальйшей искры возгарается. Никто не описаль сего времени шакь прекрасно какъ Руссо въ его Эмиліи. Нашура вліяла во нихо нѣкое желаніе, котораго онъ не знають. Естьли сохранять онь свою невинность, то питаеть сте ихь мужество; естьли же оную растлять, какь то вь больших в школах в и городах в почти неминуемо, то бывають послъдствія очень явны. Крайняя плошь, говорю я, рано или поздно обнажается, а дълается сте или отъ тайнаго блужденія, или отв соитія; у нѣкоторыхв двлается сёе легко, а у другихъ съ прудомъ.

Сїю передней кожицы узкость сравниваю я сb дъвственностью; понеже Іудеи женились очень молоды, и прежде нежели страсти их достигали до надлежащей зрълости, то была бы оная равно тягостна как для мужескаго пола, так и для женскаго; что и отвращено обръзантем в. Женщины, кои также весьма моходы выходили за муж д, и даже прежде своей перемъны, были естественным добразом д весьма нъжны. На сем до основалось Моисеево испытанте невинности.

Разумные люди легко со мною согласятся, что женщины въ разсуждени пространства и узкости маточнаго влагалища столь же много между собою различествують, какъ и мужщины въ разсуждени дътородныхъ удовъ, не приемля въ разсуждение величины оныхъ. Дъвищы, достигнувъ лътъ возмужалости, также легко приемлють огонь, какъ и мужщины; натура оныхъ столькожь дъятельна для учинения ихъ къ родотворению способными, какъ и у сихъ; страсти ихъ столько же подвержены воспламенъню. Къ счастию

образв ихв воспитанія препятствуетв имв такв легко предаваться страстямв, какв мужщины; но рано или поздно ощущають онв некоторую склонность кв другому полу; сїе и некоторыя таинственныя выраженія, слышанныя ими отв другихв, возбуждають ихв любопытство. Да какв сему инаково и быть? Разве когда были бы оне чужды всякихв страстей, чего однако, кроме телесныхв погрешностей, быть не можеть.

У дътей маточное влагалище обыкновенно узко, однако такъ, что восковую свъчу, толщиното въ гусиное перо, легко заправить можно. Естьли маточное влагалище не имъть отверстія, то сїе противно закону натуры; сїе иногда бываеть; но не случается ли сїе и съ заднепроходною кишкою и съ мужескимъ членомъ? Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ должно прибъгать къ искусству. Во всъхъ сихъ случаяхъ имълъ я великое пособіе отъ нарочно для сего сдъланнаго данцета. Искуснымъ

повивальным в бабкам в надлежало бы всегда осматривать сте у новорожденных в.

Сте противоестественное срощеніе почиталось дівственностью; и я опасаюсь, что оно иной пригожей дввочкъ стоило жизни. Могутван въ такомъ состояни вышекать мъсячныя крови? Ковперь описаль намъ чрезвычайной случай о замужней женщинъ, которой мужъ во время соитія пробиль сь великою трудностью дорогу въ мочевый каналь; задержанная мъсячная кровь выспічнила нъсколько изъ срамошы, что походило на припадокъ матки. Ковперь, разсмотря тщательно, нашель, что сїе была сростшаяся дівственная плева; какъ скоро онъ вскрыль оную, то вышекло до четырех В Аглинских в мър ссъдшейся крови. Сте препяшствіе приводило мужа въ заблужденіе; спустя годо по отвращеніи онаго, родила сїя женщина здороваго младенца.

Когда женскій удь напрягается, то ощущають сте вст части, и маточное влагалище претерпъваеть дъйствительное разширение и сжатие. Естьяя кто врсте время св таковою женщиною соединишся, то части весьма удобно распіягиваются, и естьли не будеть большаго неравенства вь дътородных в частяхь, и не будеть также слишкомъ жестоко поступлено, що ни кровошеченія, ни разодранія частей не посладуеть. Но сего не происходить при первомь соити; ибо цъломудренная дъвица бываетъ обыкновенно робка и боявлива, отъ чего сій части еще болье сжимаются и дълаются уже; мужщина напротивь того забываеть отв сильнаго желанія женскую нѣжность, о которой онъ при умъренномъ жару върно бы вспомниль; почему и не удивительно, что сій нъжныя части болье спраждушь.

Тълосложенія суть не однъ, которыя имьють вліяніе на узкость и пространство сикь частей; мьсяччасть І. ное очищение дълаеть вы семь также не малую перемъну. Даже и другие недостатки, коимь и самыя невинныя дъвицы подвержены, имъють на сие великое влиние.

Великая нъжность частей всегда существуеть у непорочной дъвицы, и она служить, по моему мнънію, столь же върнымь знакомь цъломудрія, какь и другіе, естьли еще не больше.

Когда дъвица претерпить перемъну, (прежде сего времени натура не опредълила ее для супружества) и почувствуеть вы себъ склонность кы соиттю, то перенесеть оное сы удовольствтемы безы боли и безы потери крови, развъ только слишкомы не искусно поступлено будеть, или найдется великое вы частяхы неравенство.

Но естьли маточное влагаляще от природы узко, как то сте у нъкоторых в случается, и соитте будет в особливо против склонности той женщины, то можно почесть ее болъе одного разу невинною дѣвицею; природа и искусство увѣряють нась въ томь примърами.

Когда о семъ разсудимъ, то увидимъ явственно, что признаки Моисеевы не всегда доказывали невинность. Однако мужъ съ разсудкомъ
легко можетъ и о семъ судить справедливо. Истинная стыдливость и
пъжность какъ въ тълъ, такъ и въ
обхожденти, пребудутъ навсегда безотлучными спутниками невинности,
не смотря на прочте признаки. Истинную непорочность искусствомъ произвесть не можно, ибо она отъ искусственной весьма отстоитъ далеко.

Сти суть мьсли мои о семь предметь; онь основываются на много повторенных в опытахь. Я почель за должность описать их в здысь, по- неже касаются оны предмета важнаго. Ибо безгрышные оставить десять виновных везы наказанія, нежели осудить одну невинную.

Входъ маточнаго влагалища бываеть у дътей узокъ и нъсколько гладокъ; сте есть такъ называемая дъвственность, какъ я еказаль уже прежде. Какъ скоро онъ (дъвицы) возмужають, и возвимьють мысячное очищение, то части дътородныя ньсколько пораздающся; и какъ маточное влагалище олять сжимается, то дълаются морщины, кои мало по малу увеличиваются. Но съ тъхъ порь, какв почувствують онъ склонность къ соитію, делаются у нихъ нъкотораго рода мясистые сосочки, изь коихь четыре всегда непремънно существують. Сїи мясистыя сосочка почишались прежде остаткомъ раставнной двественной плевы; быть такъ иногда можеть, но естьми заключать сте общественно, то булеть сте несправедливо, какь я уже поежде замъшиль. Я имъль случай осмащривать многих в женщинв, и нашель сїн части также сходными, какв и у другихъ; естьлибъ были онъ останкомв, то не вст были бы между собою сходны.

У незамужних в онв весьма малы; отв соит маточное влагалище распространяется, отв чего и должно получить болье морщинв. Онв опредълены, кажется, природою для того, чтобв препятствовать входу наружнаго воздуха; и я почитаю их в за зберегательныя складки, которыя служать маточному влагалищу, чтобв во время родовь болье разширяться.

Маточное влагалище внутри весьма неравно и крайне чувствительно. Оно наполнено морщинами, кои у молодых в дъвиць бывають нарочито велики, от частаго соит дълачотся онъ менъе, а от повторенных водовь совсъм почти заглаживаются. Большою частью состоять оно из мясистых волоконь, ком боевыми, крововозвратными, а особливо чувственными жилами перепутаны. Въ промежутках морщинь находятся маленькія железки, от дъляющія во время соит слизкую влагу, которая служить къ тому, чтобъ

сь обыхь сторонь кь соитю служащія части делать слизкими. Протоки сихь железь находятся всё болье или менье вы тайномы удь, а особливо около устья мочеваго канала; онь называются Косперовыми железами. Вы сихы протокахы бываеть мыстопребываніе гонорреи вы женскомы поль. Прежде почитали помянутую влагу женскимы сыменемы, но теперь таковое заблужденіе оставили.

Маточное влагалище снабдьно сжимательною мышкою, которая имъеть происхожденте свое въ женскомъ удъ, и окружаеть все влагалище маточное. Да и можно почесть оное совершеннымъ мускуломъ: ибо во время соиття оказываеть оно точно такоежъ дъйствте, какъ и прочтя всего тъла мышки. Оно соединено плотно съ заднепроходною кишкою; отъ сжимательной мышки оной получаеть оно другую мышку, которая съ прежнею соединяется и простирается даже до клитора, отъ чего и при-

числяють оную вообще кь мышкамь, принадлежащимь кь женскому члену.

Тако или промежность междупроходная отдъляеть срамоту отв отверстія заднепроходной кишки, н состоить изв одной части маточнаго влагалища и отверстія задняго прохода, и изъ находящихся промежду ими мышекъ. У женщинъ, которыя еще не родили, составляеть онь въ нижней части срамоты небольшой край, которой во время родовь легко разорвань быть можеть, особливо от в неискуснаго обхождентя повивальных бабокв; заживленте онаго можеть при будущихь родахь подашь поводь къ великимь запрудненіямь. Плотное соединеніе маточнаго влагалища съ заднепроходною кишкою, а наипаче сжимательных в мышекв, св сжимательною мышкою оной дълаеть то, что сія часть часто поражается венерическими яз-Bamu.

О маткв и смежных об оною кастяхв.

Мы приступаемь теперь кь описанію внутреннихь дітородныхь частей. Матка, вы которой получаемь мы первоначальное бытіе наше, занимаеть между оными первое місто. Она граничить сы маточнымь влагалищемь, сы коимь она вы шейкь сверьхы маточнаго устья плотно соединяется.

Образование матки у небеременной женщины есть грушеподобное и плоское. Она находится промежду мочеваго пузыря и заднепроходной кишки.

Касательно до ея величины и толщины, имфеть она вы семы удивительное свойство. Прежде зачатія имфеть она вы длину около трехь дюймовь, вы ширину два, а вы толщину полдюйма; по воспріятій же достигаеть она мало по малу такой величины, что вы состояній бываеть вмъщать вы себъ совершеннаго младенца и сь окружающими

купно съ величиною возрастаеть; прежде беременности составляеть она около полдюйма, во время оной почти два дюйма, особливо въ томъ мъсть, гдъ находится младенческое мъсто; еще болъе достойно удивленія то, что матка по разрышеніи въ нъсколько дней такъ сжимается, что получаеть почти паки прежнію величину свою. Сіе удивительное строеніе было для достиженія надлежащей цъли непремънно нужно.

Она имъетъ три оболочки. Первая изъ нихъ есть продолжение брюшины, которая служить очой и
мочевому пузырю общимъ покровомъ.
Однакожъ не льзя сказать, чтобъ
была она собственнымъ покровомъ
матки, потому что она паки оную
оставляетъ и соединяется опять съ
тою брюшины частью, которая заключаетъ кишки. Она служить также для образования широкихъ маточныхъ связокъ, по средствомъ кото-

вых в содержится матка в в надлежащемъ ея положении. Си окружають также помощію оной яичники, маточныя трубы и принадлежащие къ снымь сосуды, и служать онымь подпорою. Вторая оболочка принадлежить собственно маткв. Она весьма кръпка; волекна оной, кои по виду въ дъвической маткъ мясистыми и сухожильными быть кажутся, супь между собою сплешенны. Сін волокна, особливо сухожильныя, кажушся бышь шаковыми шольке прежде беременности: ибо во время оной бывають онъ совершенно кровавыми сосудами, коимъ мясистыя волокна, съ коими они смъшены, служать подкрыплениемь. Третья и внутренняя оболочка есть тувственножильна; въ основании или верхней части матки она нъжнъе, чъмъ въ других в мъстах в. Она снабдена повсюду отверзтіями маленьких в сосудновь, наплаче же около шейки оной; изъ оныхъ сочится кровь во время мъсячнаго очищенія; но онъ

не отдъляють ничего такого, чтобь замыкало во время беременности маточное устье, какь нъкоторые думали, ибо оное того никакь не требуеть.

Матогное рыльцо есть преддееріе сей внутренности. По причинъ силы его сжиматься и растягиваться достойно оно болъе примъчанія, нежели какая либо часть оной.

По воспріятій съмени оно совсъмъ замыкается, и такъ что кажется невозможнымъ, чтобъ могло оно паки разшириться; но не смотря на то, распространяется оно мало по малу въ исходъ беременности, и разширясь во время приближающихся родовъ совершенно, пропускаетъ младенца безъ всякаго поврежденія.

Оно висить въ маточном влагалищь и имъеть нъкоторое подобе съ головкою мужескаго дътороднаго уда; во время совокуплентя, а особливо во время изліянтя съмени, оно разверзясь нъсколько опускается къ мужескому члену, и всасывая воспртемлеть съмя; чрезь сте дъйствте до-

Оно состоить изь удивитель наго сплетентя боевых в, кровавых в и чувственных в жиль, плевь и железь; кровавые сосуды суть только малы, но многочисленны; железы находятся близь маточной впадины. Поелику оно во время совокуплентя непосредственное претерпъваеть прижосновенте, то можеть стя часть быть мъстопребывантемь гонорреи, и причинить чрезь то весьма многтя меудобства. Разслабленте сей части можеть подать причину къ безплодтю и другимъ бользнямь, коихъ причину ръдко усматривають.

По сторонамъ матки находятся жиски. Каждый изъ нихъ состоитъ изъ множества маленькихъ железокъ, заключенныхъ въ своихъ собственныхъ покровахъ, и окруженныхъ также продолжентемъ брюшины. Ихъ можно мочесть женскими яичками. Съменные окыхъ сосуды происходять отъ боль-

шой боевой жилы и выданвающих в сосудовв, а крововозвратныя жилы относять кровь вы пустую жилу, какы и у мужщинь. Онь вы половину менье мужских вичекь, да при томы и виды имьють ягцообразный. Величина оных в соотвытственна бываеты льтамы и обстоятельствамы особы. Во время возмужалости бывають оны больше, поды старость опять сморщиваются.

Каждый яичникъ вмъщаетъ въ себъ около дватцати маленькихъ яичекъ; сїн имъютъ величину съ ворошину и содержать прозрачную водянистую влагу, которая похожа на яичный бълокъ; естьли ихъ сварить, то она также загустветъ; она есть истиниое женское съмя, о чемъ въ послъдствіи будемъ имъть случай сказать болье.

Ошв каждой стороны маточнаго дна простираются двв трубы, называемыя маточными, или отв ихв изобрвтателя Фаллопіевыми трубами. Ихв можно почесть настоящимв

предолжениемъ машки: онъ лежащъ вь оболочкь широкихь маточных в связоки сверхи янчникови, съ коими онъ непосредственное имъють сообщеніе посредствомь сосудовь идущихь отв каждаго янца, и извъстныхв подъ именемъ относящих в сосудовъ. Каждая изв нихв имветь вв длину около прехв дюймовь и насколько выгнута; отверзите оной въ матку весьма мало и узко, такъ что едва пропускають тонкой щупь, но къ концу мало по малу разширяется шакъ, что можно засунуть маленьжой палець, а наконець паки сужасается. Въ свободномъ концъ раздвляется она на многія волокна или бахромки, получившія весьма несвойственное наввание чортова откуска. Фаллопій сравниль сію часть сь широкимъ концомъ музыкальной трубы, сь которой она, будучи наполнена влагою, имбешь сходешво; волокна ея подобны также цвъту бахромоч-Haro Maky.

Изъ встхъ родотворныхъ орудій подали онт болье причины къ разсужденіямъ; но не смотря на вст ученыя и замысловатыя ипотезы, каковыя имьемъ мы въ разсужденіи опредъленія оныхъ, мы еще въ томъ не удостовърены. Какъ человъки можемъ мы другъ другу изъявлять свои мысли, которыя кажутся для насъ разумнъйшими; надлежить только дълать сте въжливо и съ недовърчивостью, основывающеюся на слабости человъческаго разума.

По тщательномо разсмотръніи очыхо найдемо мы, что онъ для того опредълены, чтобо приносить во матку женское съмя; ибо яичники имъюто непосредственное сообщеніе со фаллопівыми трубами, а сій со маткою. Естьли разсмотримо оныхо строеніе, а особливо когда онъ наполнены чрезо искусное впрыскиваніе влагою, то найдемо ихо съткъ подобными и сходными со печуристыми тълами клитора; чего ради Ж 4

и не безосновашельно думають, что онъ пакже во время совокупленія напрягаются и растягиваются. Естьли налишь маточную трубу жидкостью, то накривляется она выгнутою частью кв яичникамь; и такв невъроятно ли, что оная давить яичникъ подобно какъ будто рукою, и приносишь женское съмя чрезь маточную трубу въ матку для будущаго совокупленія? Нъкоторые утверждають, что зародышь образуется вь Фаллопіевых в трубахв, и вв оныхв нъкоторое время пребываеть, пока не прикрапится къ машка; сте каженся для меня бышь противным вакону природы: а паче думаю я, что непосредственно послѣ воспріятія смѣшенте обоихъ съмень къ машкъ прилъпляется, и въ оной происходишь постепенно образование зародыша и его мъста. Я, правда, не отрицаю того, что находили женское яицо и мужеское съмя несмъщеннымв, а именно, у женщинъ лишившихся или ошь бользни или аругимь какимь

насильственнымъ образомъ скоромостижно жизни: но спращивается , не произошло ли сте от судорожных в движеній, которыя обыкновенно сопровождають таковыя скоропостижмыя смерши, и которыя весьма часто производять въ тьль ньчто противоестественное. Совстмъ тъмъ могу ушвердишь, что я имълъ случай находишь весьма малых вародышей укръпленных в кв машкв, и доколь не у мостовърюсь в противном в, буду думать, что они во оной со начала воспрімнія образующся. Подобные случаи встрвчаются рвдко , а когда они и встръчаются, то не достаетъ намъ часто дозволенія, или склонности воспользоваться оными.

На днъ машки происходять кругжых связки, по одной на каждой сшоронъ. Съ начала онъ широки, но скоро дълаются круглыми и въ существъ плотнъе; онъ проходять на конець, будучи окружены брюшаною, сквозъ кольцо брюшныхъ мышекъ въ пахи, разширяють свои волоти и кончатся въ женскомъ удъ и смеж-

Отв сего происходитв, что женщины столькожв подвержены паховымв грыжамв, какв и мужщины, только приключается имв сте не такв часто, и онв удобные отв оныхв освобождаются.

Сїй связки состоять изъ мясистыхь и сухожильныхь волоконь, смвшенныхь съ кровавыми сосудами. Всв въ томь согласны, что онь служать для содержанія матки въ ел ноложеніи. Но чтобъ приносили онь пользу при соитіи, зачатіи, беременности и родахь, сего, сколько мнъ извъстно, никакимь еще Авторомъ не показано; и такь да будеть мнъ позволено объявить здъсь мое о семь мнъніе.

Машка находится во время согокупленія во дойствительномо движеній, а во время изліянія (когда оно со объихо стороно во одно время послодуето) тянуто сій связки оную внизо и приводято ее чрезо то во

состояние штыв удобные возпринимань мужеское съмя. При родахв, кажется мнъ, поспъществують онъ много выходу младенца. Естьли бы о семь подумали и сппарались бы только слегка подкрвплять перехвашы, вмъсто того, что обыкли дълашь сїе сильнымъ образомъ, то многія женщины сохранили бы чрезъ сте жизнь свою. Мы имвемъ множество ученых в трактатовь о повивальномъ искусствъ, въ коихъ показуения употребление многих в орудій, и какимъ образомъ обращать младенцово во чревъ, и вынимань ихъ оттуда по кускамъ. Щастлива та женщина, которая находится въ отдаленности от Акушера, и принуждена остаться безв его вспоможенія и его орудій. (\*) Нъкоторыя жен-

<sup>(\*)</sup> Сочинитель говорит в зайсь вёрно только о неискусных в Акушерах в. Искусный Акушер вёрно оставит употребление инструментов в до тёх в порв., доколё можно, предпочтет в

щины, достойньйшія долье прожить, умершвлены по правиламы искусствай щастіе бы ихі было быть бъдными и ожидать помощи от благой Натуры, но онъ лишены счастія быть матерями многочисленнаго потомства. — Природа проста и неискусственна; благополучены тоть, кто идеть поедписывать ей законы, тоть обманется, равно какы и тоть, которой на него положится. Да бужеть сего довольно; вы другомы случать скажу о семы болье.

Я почитаю круглыя связки совершенными мускулами, и не понимаю, како можето кто во семо сомнъваться. Сверхо того, что сказано, мною о пользъ ихо, опасаюсья, что онъ во истерическихо бользняхо великое имъюто участе. А изоразцирентя ихо до клитора заклю-

всегда безвредных в младенцов вразорванным в и в в крайней только нужда. употребить последнее средство.

таю я, что онъ вы бъщенствъ матжи наисвиръпъйшія должны быть орудія.

Матка и принадлежащія ко оной части получають боевыя и крововозвратныя жилы частію ото начальственной боевой, или пустой кровавой жилы, гдъ съменные сосуды происходять, частію же ото подпревныхо и чечуйныхо кровавыхо сосудовь.

Боевыя жилы, происходящія от в начальственной боевой жилы идуть частію, какь и приго-товляющіе сосуды у мужщинь, кь личникамь, только суть нъсколько покороче; онъ снябжають также и маточныя трубы боевыми жилами, которыя удивительнымь образомы извиты. Частію распространяются онь и вы маточнымь связкамь, другія кы маточному влагалищу, а инныя вытьви очыхь разстилаются по дытородному уду.

Вътьви начальственной боевой жилы, идущія къ янчникамъ и маточнымь трубамь, сушь во всьхв мвстахь равной толщины, только тонки; разпространяющіяся же въ машкъ и машочномъ влагалишъ сушь толще: во время беременности толщина ихъ примъшно возрасмаеть, а особливо находящихся во машкъ, однакожЪ приращение толщины оныхъ не такь велико, какь тахь, о которых в я скоро упомяну: причина шому кажется быть та, что онъ служать оной пищею, вмъсто того что друтія приносять яичку и содержащимся вь ономь частямь кровь.

Подчревныя пульсовыя жилы раздъляются въ большемъ числъ въ маткъ и маточномъ влагалищъ, и окружаются двоякимъ числомъ крововозвратныхъ жилъ, которыя въ небеременной маткъ отъ зрънїя укрываются и получаютъ видъ волокомъ; но во время беременности представляются онъ взору совершенными кровавыми сосудами, и какъ въ длину, такъ и въ толщину разширяются. Сте есть причиною прибавлентя существа матки въ величинъ и толщинъ во время беременности; послъ родовъ источають отверзття сосудовъ, которыя прежде покрыты были младенческимъ мъстомъ; кровь, которая при родовомъ очищенти вытекаетъ, и пртемлетъ паки прежнтй свой видъ, отъ чего и матка получаетъ почти первую свою величину.

Съ преждепомянутыми кровавыми сосудами суть чечуйные сосуды разнымь образомъ переплетены, а именно такъ, какъ нигдъ въ Анатомїи, кромъ мясистой железы не встръчается; ибо боевыя жилы состоять съ боевыми жилами, а крововозвратныя съ крововозвратными жилами въ соединеніи, хотя взаимная связь послъднихъ и не такъ велика, какъ первыхъ.

Кровь мъсячнаго очищентя вышекаеть изв подгревных и тегуйных в крововозгратных в жиль; но которыя изв нихв болъе оной источають, еще не извъдано; я съ моей стороны думаю, что дълають сте чечуйные сосуды: но какъ доказательство моего миънтя отвлеклобы меня слишкомъ далеко от главной матерти, до которой оно не такъ много касается, то оставлю оное до другаго случая. Довольно для насъ въдать, что вародышь наипаче обязанъ питантемъ своимъ симъ сосудамъ, и что изъ оныхъ проистекаетъ у порожнихъ женщинъ мъсячное очищенте.


Нервы, которые во помянутых выбетах в и около оных в разстиламотея, происходять большою частью отв скитающейся пары и становой жилы: скитающаяся пара распространяется весьмя общирно, и ньтв, можеть быть, внутренней части, которая бы не имъла вътьви сей пары нервовь; почему и не удивительно, что между внутренностями царствуеть толикая симпата, особливо вы женскомы поль. Нервы становой жилы имъють множество вътьвей, происходящих от вкрестцовой кости,

почему и уподобляющся они лошадиному хвосту; они дають намь знать причину, для чего женщины особливо во время беременности и родовь толико страждуть болью вь поясниць.

Изъ сего описанія явствуєть, что женскій дътородный орудій не только въ строеній своемь болье сложны, чъмь мужескій, но что онь по нъжному и совсьмъ различному строенію ихъ должны подвержены быть такимъ бользнямъ, оть коихъ мужщины совершенно свободны, и даже о чувствованій оныхъ никакого не имъють понятія:

Каждый благоразумный мужь преисполнится чувствованія нѣжности и состраданія къженскому полу, который толикимъ подверженъ слабостямъ и немощамъ, и сильное желаніе возбудится въ груди его вспомоществовать имъ, какъ соучастницамъ его блаженства.

Здъсь кончу в спо Главу и прис ступлю къ слъдующей, въ которой часть І. потшусь начершать оттънокъ таинственнъйшаго изъ всъхъ дъяній человъческихъ.



## ГЛАВА III.

## О родотворении.

Между безчисленными благостьми, изліянными на насъ великимъ Виновникомъ бытія нашего, и споспъществующими нашему блаженству, есть безъ сомнънія размноженіе рода нашего наивеличайшая и преисполненная тайнства. Оно содълываетъ людей равными и показуеть имъ истинное и ложное блаженство, къкоему они шолико рачительно стремящся, въ настоящемъ видъ. Оно есть мать любви и дружбы, двухъ наивеличайшихъ украшеній человъчества, безъ которыхъ никакого счастія быть не можеть.

Родотворение есть совокупление мужескаго пола съ женскимъ, или орошеніе матернія утробы мужескимъ съменемь. Въ семъ случат есть мужеское съмя наипаче достойно нашего вниманія.

Оно есть полупрозрачное, бѣлосѣроватое, клейкое жидкое существо, отдѣляемое отб крови помощію въ яичкахъ находящихся сѣменныхъ сосудовъ. Изъ яичекъ переносится оно въ сѣменныя хранилища, гдѣ и сохраняется до употребленія.

Левенгекъ быль первый, который примътиль вы ономъ посредствомы микроскопа маленькихъ животныхъ; онъ и его послъдователи довели послъ до того, что почли сихъ животныхъ за человъчковъ, а нъкоторые увъряли уже, что будто могли различать даже и полъ ихъ.

Сколь сїе справедливо, оставлю на сужденїе читателю, а я не останавливаясь пойду далье и разсмотрю приготовленїе съмени, разныя его свойства и существенное различе онаго от в прочих влагв, в в тъль отдъляемых в.

Орудія ощавляющія мужеское съмя описали мы въ первой Главъ; а чтобъ имъть ясное о образъ дъйствія оныхь понятіе, то надлежить привесть ихв на память. Съменныя пульсовыя жилы получають именножровь от в начальственной боевой жилы. и выданвающих в сосудовь, и приносять оную для отпавленія вь янчки. Сін сосуды въ происхожденіи своемь уже, чымь вы другомы мысть; ибо кровь должна въ семь мъстъ имънь тихое движение. Какъ скоро достигнушь они до пирамиднаго шела , тогда начинается отделение, наитончайшія, частицы крови всасываются весьма перепушанными сосудами: яичекв, а грубъйшія относятся съменными крововозвратными жилами назаль. Вь янчкахь оно власно останавливается; во нихо получаеть оносърой цвъть. Послъ сего пробирается оно весьма шихо чрезъ Гигморовъ протокъ въ яичные барышки, гдъ еще болве выдълывается. Прошедши чрезъ яички, подымается оно потихоньку втерьх в по онтносящим в сосудам в, кот торые проходять часто сквозь сыменную железу, и собираются наконець мало помалу вы съменное хранилище, гдъ сохраняется вы готовности до употреблентя.

Не льзя сказать, чтобъ съмень ная железа ни мало не способствовала къ его усовершенствованію; новъ чемъ оное состоить, я и самъ не знаю: а думаю, что всъ орудія, съменные сосуды, ядра, относящіе сосуды, съменная железа и съменныя хранилища, нъчто къ плодотворному свойству онаго присовокупляють.

Нъть никакого отдъленія вы тъль человъческомь, которое бы такь обработано и такь тонко было, какь отдъленіе съмени. Естьли отвергнемь всякое излишество, то съмя не болье что будеть какь и всякая другая отдъленная влага, которая, такь какь оную употребляють, отдъляется. Чтобь находились вы ономь червячки, то нахожу я такое мнънте весьма нелъпымъ. Однако не сльдуеть изь сего, чтобь отрицаль я существование червей въ человъческом в шълъ: ибо мнъ случалось разрѣзывать желваки наполненные вшами; такожде не сомнъваюсь, что больщая часть закожных в сыпей и многих других вользней отв червей происходять и оными сопровождаются. Только отрицаю я существование червей въ съмени, крови и всякой другой жидкости, пока находится она въ здоровомъ состоянии и въ живомъ тълъ. Кто наблюдаеть природу, тоть знаеть, что черви раждаются от гнилости, то есть, что червь обязань бытіемь своимь иставнію другаго.

Границы, кои предписаль я себъ касательно до моего предмета, не дозволяють мнъ разсматривать всъ причины, служащія для защищенія помянутой ипотезы; да думаю, что то и не нужно, поелику ясно изъ послъдующаго увидимь, что плодомпвореніе вь таковыхь животныхъ

нужды не имъеть; и что образованіе и одушевленіе зародыша гораздо удобнье и натуральные представить себь можно, когда сравнимы ихы сы прозябающими растыніями.

Нъшь ни малой для нась нужды знашь, сколько соли, масла и пт. д. даеть мужеское съмя по химическимь испышаніямь; да еще вопрось: найденся ли при равном в количеств в съмени и при равномъ количествъ другой отдъленной влажности какое либо различие? Испышания наши должны бышь другаго рода; Химія ни мало не служить для объясненія экономіи живошныхв. Вь що время, когда испытуемъ мы съмя, оно лишено уже дъйствующей своей силы. Мы замъшили прежде существо онаго и цавить, но оба онв не сушь настоящія свойства: ибо оно можеть совсъмъ инаково быть при извержении вь матку, а именно можеть оно быть совершенно прозрачным и весьма лешучимь; естьли возмемь далье спиртованной сокъ живошныхъ, чрезъ

внутренное движение коего, оное, соединясь св женскимв съменемв, ввматкъ утверждается, и св того самаго миновения начинаетв разшираться и возрастать, и получаетв питание свое отв матки, которая длятого устроена до его усовершенствования, и потомв оную оставляетвможетв быть имъетв сей возраств ов прививаниемв растъний нъкоторое оходство.

Когда соки обращаются, то они совсьмы бываюты инаковы, нежели когда находятся выб тыла; дотольможно почесты ихы дъйствительно живущими и имбющими нъкотораго рода чувство: естыли возмемы вы разсуждение точное соединение, вы каковомы состояты плотныя и жидки части между собою вы тыль, то не покажется намы сие страннымы; да кто отвергнуть можеть, что и самая жизны зависить оны крови или что дъйствие и бездыствие одного навлекаеть дъйствие и бездыствие другаго?

Кровь, жирь, съмя и другіе сови сушь, пока обръшающся во шълв, жидки и совершенно прозрачны; но какЪ скоро коснушся воздука, мгновенно перемъняются. Отъ скораго ссъданія ихв оказывающся вв оныхв волоконцы; а сіи могуть также похожими быть на маленькіе червячки, какъ и лунныя пятна на корабль. Естьхи угодно кому имъть ихв непремънно живыми, то стоить только постановить их в латом в на день или на два на воздухъ и содержать их в жидкими; они явять глазамь и носу его довольную перемвну, а мы удостовъримся, что всякая степень тнилости произрождаеть собственных в червячковь.

Съмя по разнымъ тълосложентямь различно; толожде соотвътствуеть оно и лъшамь. Во время наступающей возмужалости оно чаще ощдъляется, бываеть сильнъе около зо лъть, а слабъе и менъе отдъляется въстарости: но есть також-

Часть І.

де случан, въ коихъ сте совстыть инаково бываетъ.

Крвпость двтородных выравія. есть ввривитій признак здравія. Когда начинаеть твло слабыть, то двтородныя части отказываются первыя от своей должности; однако есть и вь семь накоторыя извятія.

Ничто не разслабляеть такъ человъка, какъ упорное съменошеченіе; чъмв моложе больной, тъмв онв опасиће и тъмъ трудиће отъ онаго освобождается, а особливо когда произошло оно отъ малакін, такого порока, котораго научила Природа стыдишься, и который весьма не охопіно исповъдають, а хотя и признаются, однако втайнъ исполняють его нашеть здравія и душевнаго спокойствія. Болье о семь вы другомы мысть. Вы семъ случат съмя жидко и синевато; ибо отделяется весьма часто, ему не достаеть сваренія (сопсостіо), доставляющаго оному крѣпосмы.

Въ началъ влосвойственной го-

бужденіе къ любострастію, сопровождаемое частыми ночными изшеченіями съмени; въ таком в случат съмя довольно желто, такъ что краситъ и полошно. Есшьли нивешь онь купно встаниху (chorda priapismus), то имъеть и большее побуждение, нежели какъ желаеть; чрезъ сте боль его чувствительно увеличивается, и онъ становится внимательные къ жару, оною производимому. Свия опличается при семь отв онаго тъмв, что побуждается къ теченію сильнымь раздраженіемь, вмісто того, что изтечение другаго происходить от в слабости частей. Оба почитаю я безплодными; оное несовершеннаго ради сваренія, а сіе по причинъ жара и вакаго яда, который во ономо содержаться должень, хотя получило бы оный во время прохожденія сквозь мочевый каналь. Однако мы имвемъ вь обоихъ случаяхъ примъры, что онъ плодошворны были. Но каковы были шаковыя отрасли, довольно извъсшно.

Наилучшее съмя, отъ которато можемъ мы ожидать хорошихъ и здоровыхъ дътей, естьли посъяно оно на хорошемъ грунтъ, есть то, которое имъло по крайней мъръ 24 часа времени скопиться въ здоровомъ человъкъ, который сложение свое ни-какимъ родомъ распутства не ослабилъ, и которое съ удовольствиемъ испражняется.

Женское съмя отъ мужескаго нъсколько разнишся; а особливо которое называемъ мы собственно съменемъ, находишся въ меньшемъ количествь, чьмь мужеское; а именно то, котпорое идеть отв яичника чрезъ машочныя трубы въ машку. Оно подобно яичному бълку прозрачнаго и сукровичиаго свойства, и поставлено будучи на огонь, равно какЪ и оный, ссъдается. Сте подало поводь думать, что какь яичники имъють сходство св янцами, то и должны они содержать настоящія янцы, которыя также должны оплодошворяться какв и у несущих в янца

животных в. Единое вв семв затрудненйе есть то, какимв образомв зажодять сйи янца вв маточных трубы; ибо мы видимв, что кромь маленьких в протоковь, которые идуть отв каждаго янчка кв маточной трубь, никаких в других в отв личников в не происходять.

Сладующее еще болье объяснить еїе дъло: а именно, мы находимъ, что число сихв яиць у старыхь женщинь, которыя многихь дътей родили, также велико какв и у молодыхв, кои никогда не реждали, съ тою только разницею, что у тьхв онь засохли, а у сихв свыжи. Онъ похожи, правда, на яида, но сушь настоящія железы, которыя укрвилены двумя волошями препятствующимы имъщь имъ вверьхъ и внизъ движенїе. Съ одной стороны виспускаются съменные сссуды, от в коих в получають онъ отделение свое; а съ другой стороны выходять изъ них в испражняющее сосуды, кои сушь эчень шонки, и имьють весьма узкое

отверзте вы маточную трубу. Сверьхы того соединены онт плотнось оболочкою, вы которой заключаются, и оты которой безы раздранія отделены быть не могуть; а хотя бы сїе и можно было, то какы вошли бы онт вы маточную трубу, когда нёть вы оной довольнаго для нихь отверзтія?

Натура не обыкла дѣлать ни зла, ни чудесь; а вышепомянутое не можеть произойти безь одного изъ сихъ двухъ. И такъ представимъ себъ зачате легчайшимъ образомъ, которой, думаю, будетъ явственнъе и сообразиъе съ разумомъ.

Мы приступимы теперь кы разсмотрыйю согокупления, какы кы такому дыйствию, вы коемы Природа учинила всыхы животныхы равными, сдылавы разпложение рода ихы приятнымы; однако сы тымы различиемы, что всымы животнымы назначила ныкоторое время для ихы желания, только человыку предоставила свободное наслаждение сихъ удовольствия преисполненныхъ минутъ.

Доколь вольность сія не будеть употреблена во зло, бываеть она соотвътственна законамь Бога и человъковь; но какь скоро учинится она необузданною, тогда низвергается человъкь къ скотамъ безсмысленнымь, и угрызенія совъсти, немощи и презръніе къ самому себъ будуть неотступными его сопутниками.

Любовь человъчеству врожденна; она есть источникь всъхъ прочихъ добродътелей; чрезъ нее дълаемся мы Богу угодными, для насъ самихъ счастливыми и для человъческаго общества полезными. Сей божественный огнь возбуждаетъ въ обоихъ полахъ желанте къ взаимному обладантю, чрезъ которое дълаются онъ участниками такихъ благъ, которыя не описать, но только съ небесными сравнить можно. Естьли будетъ любовь чистая, то доставляеть она намъ высочайшее блаженство, какого

только смертный желать можеть. Но (вамь особливо юноши говорю сте) да путеводительствуется стя благородная страсть всегда здравымь разсудкомь, а иначе привлечеть она вась кь чувственности; тогда минуется любовь и всякая другая общественная доброта, и вы навсегда потеряны.

Естественное побуждение прежде всего воспламеняеть зоирный огонь; когда найдутся ть, коихь склонности соотвытствують, то обнаруживають желание свое обладать другь другомь различнымь образомь. Естьли оно божественнымь и человыческимь законамь не противно, то ничего болье не достаеть кь достижению ихь благополучия, кромь наслаждения.

Когда сїє время наступить, що дълаеть Натура нъкоторые перевороты, и всъ мысли устремлены на сей предметь; обращеніе крови дълается живъе; подобно магниту прилъпляются онъ при прикосновеніи другъ къ другу. Дътородныя огудія дълаются от в притеченія жизненныхь духовь жаждущими соединенія; мод емлющія дътороднаго мужескаго члена мышки сокращаются и притиятають оный къ лобковымъ костямь; петомъ придавляють онъ съ поперечными и съ поспъществующею мышками кровавую мужескаго члена жилу, от в чего кровь удерживается въ обратномъ теченіи, и принуждена бываеть остаться въ печуристыхъ тълахъ и мочетомъ каналъ; такимъ образомъ происходить возстаніе или напряженіе сей части.

Такимъ же точно образомъ сокращають и подъемлющія мышки дътороднаго женскаго уда (рязыть только боязливость будеть слишкомъ велика) крововозвратную жилу онаго, отъ чего кровь останавливается въ печуристомъ тълъ и въ окружающихъ частяхъ; отъ сего части сїн припухають и получають цвътущій видъ. Въ мышечныхъ частяхъ тайныхъ губъ и около лежащихъ частей авлается не большое перемежаю ющееся движение, которое маточному влагалищу сообщается; отв сеговь складкахв находящися железы придавляются, и сообщають всему тайному мъсту слизкую мокроту.

Какъ скоро находится мужескій членъ въ отверзийи маточнаго влагалища, то миртообразные сосочки потихоньку уступають; слизь, отдыленная от железв, орошаеть оный и содблываеть ему чрезь то легкой и свободной путь. Чувствование бываеть вь семь случат чрезвычайно сильно; оно приводить почти непроизвольно всв мышки вв движение. Наипаче же: способствують тренію мужескаго члена: мышки брюшныя, спинныя и нижнихъ конечностей. Сему споспъществуется со стороны женщины равными движениеми : въ особенности же дълается сте маточнымъ влагалищемъ и прочими шайными частями; напряженныя тайныя губы и нимфы сжимающь слекка тайный мужескій удь; но маточаное влагалище наипаче сужается и разширяется, и умножаеть тъмъ съ объихъ сторонъ любострасте. Въ семь пріятномь чувствованіи женскій удь не малое пріемлеть участіе, и сообщаеть оное круглымь связкамь. кои перемежающимся движениемъ своимъ приводять равномърно матку; маточныя трубы и яичники въ движение. Всь, кажешся, сжимаюшся купно съ брюшными мышками. Маточныя трубы наполнены кровью и накривляются, а именно такв, что вогнутая часть оных в придавляеть, кажется, яичники.

Соите достигаеть теперь до высочайтей степени. Мужескій члень вдругь ньсколько болье напрягается, и дрожащія движенія дьлаются скорье, сильнье и почти судорожными; сіе увеличиваеть чувствованія женскихь орудій; оба пола дьлаются внь себя и изліяніе съмени посльдуеть. Мышки мужескаго тайнаго члена, сжимательная мышка моче-

ваго пузыря и заднепроходной кишки, а особливо съменныя вмъсшилища вдругъ судорожно сжимаются, и сообщають сте судорожное сожатте прочимъ мышкамъ; отъ сего съмя съ примътною скоросттю впрыскивается въ матку, которая пртемлетъ оное какъ будто всасывая, и увеличиваетъ чрезъ то скорость онаго.

Во время изліянія съмени притягивается матка посредством в круглых в связок в внизв, и маточное рыльцо развервается, между тьм в как в маточное влагалище суживается. Вогнутая часть маточных в труб придавляет в сильно янчники, от вчего женское съмя выдавливается сквозь маленькіе сосуды оных в вы маточныя трубы, кои прогоняют в оное судорожным в образом в вы матку к в съмени мужескому, гд в оныя мгновенно соединяются.

Какъ скоро пройдетъ сїя минута высочайшаго вождельнія, то части съ объихъ сторонъ приходятъ оть восхищенія вь себя; мускулы славы жилахы начинаеты паки свое шеченіе; мужескій уды опускается, шулята сокращаются и во всемы тыль ощущиется нъкотораго реда слабость, сопровождаемая нъкоторымы редомы насыщенія, подобнаго тому, которое чувствуется посль хорошаго объда, когда для насы и самая вкусньйшая пища болье не нравится. Женщина чувствуеть посль плодотворнаго соитія легкое содроганіе, равную причину основаніемь имъющее.

Теперь слъдуеть описать постепенное совръвание зародыща до вступления онаго вы свыть. Сие описание будеть только слабое, однако столько полно, сколько дозболить опредъленное для того мъсто.

Положимъ, что женщина зачала, и мы имъемъ первоначальные пункты человъка.

Я сказаль уже прежде и еще здъсь повторю, что въроятным в образом в укореняется смъщенте обоихв съмень въ отверятияхь подчревных и чечуйных в кровавых сосудовь; сте принимаю я за испинну: но чтобъ мужеское съмя входило въ маточныя трубы, кажется для меня столько же невъроятнымъ, какъ и ученте о червечкахъ.

Принявь вышепомянутое за истинну, поелику разумь не показуеть намь ничего въроятнъйшато, то вообразимь себъ, что мужеское съмя, изверженное изь съменнаго хранилища вы матку съ великою скоростью, помянутыми отверзтіями мгновенно всасывается, и съ той минуты начнется соединенте онато съ сими сосудами, и посредствомь обращентя крови получить соединенте со всъмь тъломь.

Послъ сего слъдуеть образование: первоначально образуется кожица, заключающая всъ прочия части; посредствомы младенческаго мъста происходить зародышь, который выпускаеть прежде пуповину; наконець толучаеть на конць оной находящее ся безобразное существо мало по малу мозгь, спинной мозжечекь и внутренности, однако все сте весьма не явственно. Высь зародышь имыеть вы первомы мысяцы не болые, можеть быть, двухь драхмы высу. Оть чего и выроятно, что первая капля сымени при изліяній истекшая для зачатія достаточна.

Зародышь болье и болье созръваеть; показываются глаза, роть и нось; туловище, составлявшее едва величину головы, начинаеть образоваться и оказываеть знаки пола; наконець выростають изь онато руки и ноги, и младенець начинаеть шевелитьс».

Сте есть первый пертодъ быття его; онъ простирается от зачаття до третьяго и четвертаго мъсяцовъ; пока малое сте творенте не одущевленно, то называется зародышемъ (Етьго). Въ сте время женщина въ существъ ея совсъмъ перемънна; она не носить болъе кровей и чувству-

еть, особливо по ушрамь, тошноту, а часто имтеть и самую рвоту. Она имтеть разныя воображентя и бываеть боязливье обыкновеннаго. Вы семь случать настоить ей нужда вы уговариванти наилучшиго друга своего, которой имтеть способь окавать ей любовь свою и попеченте.

Съ сего времени являеть зародышь знаки жизни; сердце его приведено въ движенте; соки обращаются. Онъ не только мало по малу возрастаеть въ величинъ, но части его получають между собою и надлежащее соединенте. Около седьмаго мъсяца получаеть онъ волосы и ногти; дълается живымъ, но наконець очень безпокойнымъ; чрезъ что оказываеть неудовольствте противъ своего заключентя.


Сей есть вторый періодь; малое твореніе уже одушевленно или оживотворено. Мать сильнье ощущаеть движеніе младенца; чрево ел примытно увеличивается; наружный

видъ не только показываеть ел бремя, но и умножаеть почтенте друзей ел. На осьмомъ и въ началъ девятаго мъсяца бываеть она иногда тосклива, и плодъ любви ел становится ей въ тягость. Наконецъ Натура начинаеть облегчать ел обстоятельства. Младенецъ опускается мало но малу въ тазъ; тайное мъсто не много опухаеть; маточное рыльво отверзается и дълается примътно нъжнъе и слизистъе; равнымъ образомъ и въ маткъ от дълается болъе мокроты, нежели прежде.

Части пригошовляются кв пропущенію маленькаго гостя; роды начинаются. Мать чувствуеть вв поясниць и маточномь рыльць перемежающуюся боль, которая побуждаеть всь мышки кв вспоможенію. Боль
дълается жесточав, и часто возобновляется, и ощущается наипаче около
крестцовой, хвостцовой и лобковыхы
костей; круглыя связки и матка
сжимаются; перехваты усиливантся
плевы раздираются, и мляденеця
Часть І.

открываеть себь путь посредствомы головы. Наконець при продолжительной и сотрясающей боли выходить онь на свыть, и причиняеть матери неизъяснимую радость, которая тыми только ощущаема бываеть, кои претерпыли предшествующее оному мученёс.

Такимъ образомъ происходимъ мы на свътъ, на мъсто собранія добра и зла, премудрости и невъжества, добродътели и порока, блаженства и плача. И едва познаемъ цъну человъческой жизни, какъ и долженствуемъ уже паки оную оставить.



### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.


0.

Источникт, возрождении, натурт, заражении и разпространении

## венерическихъ болѣзнеи

BOOB ILL E.

4>000000



О пстотникъ, возрожденій, натуръ, зараженіи и разпространеніи

# венерическихъ болѣзнеи вообще.

### ВВЕДЕНІЕ.

В первой Части разсматривали мы дътородныя орудія обоего пола вы разсужденіи ихы натуры и дыйствія. Сіе было для уразумынія бользни, или паче сплетенія многихы бользней непремыно нужно, кои суть слыдствіемы злоупотребленія сихы орудій.

Говорять обыкновенно, что познаніе бользни есть уже половина изцьленія оной. По ма-

Yacms II. I 3

лой мфрф прилично здравому разсудку познавань прежде бользнь, а пономь стараться обь отвращени оной. Сіе есть намфреніе мое вь настоящей Части, до котораго постараюсь достигнуть разумомь и наблюденіями.



#### ГЛАВА І.

О источникъ Венеригеских в бользией.

Пътв, думаю, такой бользни, которой бы источникъ болье между Врачами причинилъ преній и несогласія, какъ источникъ бользни
Венерической. Но не смотря на то,
находимъ мы, что ръшеніе онаго
не такъ трудно, естьли только возьмемъ себъ время о томъ помыслить.

Люди во всякое время прельщены были утверждать наинесообразнъйшія истинны, по тому, что очень скоро принимали мнѣнія друтихь, либо по тому, что рѣшились защищать непостоянную мысль, которую прежде сего утверждали. Таковая гордость не только нарушала согласіе Богослововь, но и Философовь, хотя сій мудрецы и болъе всъхъ поносили сію слабость естества человъческаго.

Желаніе казаться ученымь, было всегда величайшимь препятствіемь истинной учености; мужи искусньй-шіе доводили себя чрезь то даже до того, что въроятнымь образомь должны были втайнь стыдиться своихь мньній: но мысль быть нетраву была для нихь столь несносна, что они не смотря на то, что сами вь противномь увърены были, все еще защищали свои заблужденія.

Я не имъю намърентя объявлять ихъ по имянно, ибо желаю со вслкимъ жить въ дружествъ. Но столь же мало могу одобрить и другое мнъте, противное собственнымъ момы умозаключентямъ. Я изыскиваю истинну, и гдъ ее нахожу, съ радосттю пртемлю.

Вопрось, стараго или новаго происхожденія суть Венерическія бользни? который столь мало касается до излъченія оныхь, подаль Врачамь поводь ко многимь преніямь. Разсудокь и оныты увъряють нась, что онъ столько же древни какъ и необузданность.

По мъръ того, какъ государство усиливалось, предовалось оно и большимъ распушсивом в споспъществовавшим в его паденію. По мъръ шого, как в Гудейской народь размножался, умножались и пороки; а как в скоро сделался онь порочиве, то получиль и болье бользней. Кто прочтеть книги Моисеевы, тотъ не будеть сомнъващься, что наивеличайшіе пороки и бол взни царствовали въ ономъ: ибо естьлибы сего не было, то нужны ли бы были законы и преданія? Естьли разсмотримъ безпристрастно разные роды бользней, проказу, желваки, разъъденныя кости и т. д. которыя находимь вь разных выстахь Священнаго Писанія означенными, то увидимъ, что начало, продолжение и припадка оных в точно сходствують св началомъ, продолжениемъ и припадками закосивлой Венерической бользии.

Названія гонорреа, фимозись, пара фимозись и п. д. произошли Часть II.

оть Грековь. Какихь ужасных подобнаго рода бользней не находимъ мы ими и Египпанами описанными? Какъ скоро Римляне предались сладострастію, то было и имъ не лучше, хотя цвлительные ихв источники и предохраняли ихв отв того долгое время. Самый Лондонъ удостовъряеть нась, что сіи бользни прежде открытія Америки существовали; ибо мы находимь вы ихв актахъ писанныхъ въ 1375 и 1390 годахъ, что публичныя бордели (какъ и въ Италіи) съ нъкоторымъ ограничениемъ въ Сутваркъ терпимы были; такожде видимъ въ нъкоторыхъ других в узаконеніяхв, что женщины, имъвшія сженіе (Burning) от в прочихъ отдъляемы были, и запрещено было допускань къ нимъ мужщинь до штхв порв, пока онаго освобождались. Сіи узаконенія сходствовали св данными вв 1347 году вв Авигнонъ Иналіанскою Королевою Іоанною.

Нъкоторые писатели старались доказать, что вышепомянутыя бользни не были рода Венерическаго; но чьмь болье прилагали они старанія, тьмь болье утвердили противную стерену: ибо они никакь не могли не признаться, что помянутыя бользни от неумъренности вы любострасти происходили, и что происходили, и что происходили, и что происходящія от то слъдствія столько же злосвойственны были какь и вы новьйшей бользни; вы чэмы же состоить различіе?

Я не спорю, что возвращающёся съ Колумбомъ Гишпанцы принесли оную изъ Весть Индіи; и что оная въ то время у Индъйцовъ весьма сильно свиръпствовала, а можетъ быть и теперь свиръпствуетъ. Есть-либы сіи кровожаждущіе разбойники только одни оною заразились, и отъ оной пегибли, то наказаніе сіе было бы еще мало за всъ жестокости, оказанныя ими сему народу. Положимъ, что они дъйствительно оттуда принесли оную съ собою, то думаю я,

что въ семъ случат произошелъ только обминъ.

Другіе утверждають, что она перевезена къ намь съ Гвинейскихъ береговъ, и что она обязана происхождентемъ своимъ Гавсу (\*). Съ симъ также я согласенъ, и утверждаю даже, что Гавсы часто бывають Венерическаго рода; от в чего они ничъмъ не разнятся, какъ только въ разсужденій народа и образа заразы. Ничто не показываеть намь близкое сихЪ двухЪ бользней сродство, какЪ способь авченія. Сіе заставляеть меня думать, что Гавсь, Венерическія бользни и проказа древних в весьма сходствують между собою, и что онв разнятся только именами и образомЪ зараженія.

<sup>(\*)</sup> Гавсъ бользнь свойственная однимъ Неграмь, которой обстоящельное описание находится въ книгъ подъ заглавимь: Hillary's observations on the changes of the airand the concomitant epidemical Diseases in the Island of Barbadoes. 8. London 1766 стран. 339.

Но съ чего взяли искать начало оной во Франціи и почему назвали оную Французскою? Не большая исторія бользни ръшить вопрось сей; а посль оной постараемся мы изыскать настоящую сей бользни причину.

Христофорь Колумбь отправился изъ Гишпаніи з Августа 1492 года съ тремя кораблями, на которыхъ находились 120 человъкъ, и прибылъ б Декабря того же года на островь Испаніолу, называемый теперь ст. Деминго. Оставя на ономъ 38 человъкъ, отправился онъ б Января 1493 года обратно въ Гишпанію, куда и прибылъ по претерпъніи многихъ безпокойствъ б Марта того же года съ 82 человъками своихъ и 9 Индъйцами.

Влагополучный успѣхъ прїобрѣль ему любовь Королевскую, кошорой ввѣриль ему послѣ сего 17 кораблей съ 1500 человѣкъ, съ коими и выступиль онъ въ море 5 Сентября; а 27 Ноября того же года прибыль въ Весть - Индію.

жадность къ золоту учинила ихъ безчеловъчными; они не довольны были однимъ грабежемъ, но выдумывали еще не слыханныя жестокости для бъднаго сего народа. Любострасте содълало ихъ даже звърообразными; множество сихъ безчеловъчныхъ искали утолить похоть свою иадъ одною несчастною, и по исполменти сей мерзости отдавали ихъ на разтерзанте собакамъ. Удивительно ли тутъ было, что они не избъгли заразы?

Въ слъдующій годъ послаль онь четырнатцать богато нагруженныхъ кораблей обратно въ Гишпанію.

При их возвращени пришла вся Гишпанія благополучнаго ради успъха въ движеніе; бордели наполнились сими сластолюбцами; ни о чемъ болье не говорили, как о золоть новаго свъта и о числъ убіенных верных върных вида ежем всячно корабли; всегдашнее сообщеніе учреждено между сими разстояніемь от

даленными землями; корабли при всяком возвращени нагружены были богатствами, а люди поражены Венерическою заразою.

ВЪ сте время произонню нъкоторое смящение въ Неаполъ; Гишпанской Король Фердинандь послаль туда тайно нъсколько войска, въ числ'в котпораго находились многіе и изь бывшихь вь Америкъ. Царсшковавшій шогда Король Французской, Карль осьмый, послаль шуда шакже войско подв предлогом в наслъдственнаго права. Война между Францією и Гишпанією возгорѣлась; Французы, къ которымъ фортуна казалась св начала благосклонною, и которые овладъли было уже нъкоторыми мъстами, были наконецъ побъждены и прогнаны. Неаполь былЪ мъстомъ сраженія; объ партіи надълены были развращенными людьми.

Въ концъ 1496 года армія Французская возвращилась, и Венерическая зараза весьма сильно въ оной свиръпствуя болъе и болъе вкоренялась. Парижскіе жители обратили на то вниманіе свое. Врачи, не хотъвшіе оказать своего невъжства, объявили оную особеннаго рода заразою, посредствомъ соитія распространяющеюся.

А какъ всъ съ симъ миъніемъ согласовались, то учредили въ пар-ламентъ въ разсуждени сей новой заразы актъ, которой и объявленъ при звукъ трубъ по улицамъ Парижа; а именно: чтобъ всъ нностранцы, зараженные сею болъзнію, чрезъ 24 часа изъ Парижа удалились подъ опасеніемъ смертной казни; что для находящихся въ Парижъ больныхъ учреждены больницы, куда должны оми немедленно отправиться. Иждивенія опредълены были для содержанія оныхъ, и служители для наблюденія порядка приставлены, и т. д.

Вся Европа обратила на сте вниманте свое; ни о чемъ болъе не говорили, какъ о Французской заразъ; всъ убъгали Французовъ, опасаясъ отъ нихъ заразиться; въ нъкоторыхъ мъстахъ Германіи запрещено даже было впускать ихъ въ свои границы. Но не смотря на то, распространилась сія зараза въ разныхъ степеняхъ до отдаленнъйтихъ отъ Франціи и Гишпаніи предъловъ: сія бользнь удержала названіе Французской заразы, и они одни понесли отъ того поношеніе.

Французы, негодуя на то, что дали оной ихв наименование, и почитали ихв однихв распространителями оной, старались отв того освободиться, и назвали оную по тому народу, отв коего ее получили, Неаполитанскою, Неаполитанцы своротили вину на Гишпанцовв, а си опять на Индъйцовь.

Вь сте время прилагали Врачи болье старантя извъдать первоначальный сей бользни источникъ, чтобъ найти средство могущее противоборствовать оной. Всякъ старался

познать сію тайну. Астрономы приписывали сте особенному дъйствтю нъкоморых в созявздій; Богословы гнвву Божію; Философы гнилому состоянію воздуха; Историки производили сїе от в ядънія нъкоторых Индъйских в животных в, и т. д. Врачи начали наконецъ спыдипься своего нерадънія во льченіи, и согласились вь одномь способъ, который признали сообразныйшимъ разуму, хотя больные и чувствовали тому противное, ибо бользив ошь онаго усиливалась. Они приближались болье и болье къ настоящему методу, и опыть показаль наконець, что ртуть есть единое надежное противь оной средство.

Изъ многихъ догадокъ, какія имъли о началъ сей бользни, есть наивъроятнъйшая та, что она про-исходить от укутенія скорпіоновь. Ибо утверждають, что первые при-падки, оказывающіеся посль таковато укутенія, состоять въ томь, что уязвленные ищуть только удовлетворять мщеніе свое и любостра-

стіе. Соитіе подаеть таковымь скорое облегчение; но женщина, съ которой имьль онь дьло, заражается и сообщаеть оный ядь другимь. Я не могу, правда, утвердить истинну сего дъла, потому что не быль самоличнымъ онаго свидъщелемъ; со встмь тъмь естьли подумаемь, какія странныя дъйствія происходять оть укушенія собаки и тарантулы, то покажется мизніе сіе не такъ спраннымв. - Я имвав нъкогда случай быть въ собрании съ корабельнымь Капишаномь, который только что возвратился изъ Гондурасбая, и который увъряль меня, что прикосновение или допрогивание головкою мужескаго члена есшь надежнъйшее оть укушенія тарантулы средство; что оная мгновенно вышагиваеть ядь, прикосновение можеть быть плѣшкою больнаго или посторонняго; и онь увъряль, что онь самь испыталь хорошее от в того дъйствие (\*).

<sup>(\*)</sup> Конечно произошла шушь ошибка.

Что касается до мивийя твхв, кои приписывають стю бользиь ядьно гуаны, Индвискаго зввря, то не нахожу я другой причины кромв той, что мясо всвхв плотоядных взврей, какв и свиное, есть кутанье нездоровое. Сте было по моему мивию главною причиною; для чего Моисей запретиль Израильтянамь употреблять вы пищу мясоядущих взврей, и для чего почитаются они во многих вемлях в нечистыми или погаными.

Я не хочу дол е занимать читателя такими догадками, которым в и сам вало върю; но приступлю к таким в причинам в, которыя на опыть и разсудкъ основанными быть кажутся.

Изв 13, 15 и 20 Главы третей и изв пятой Главы четвертой книгв Моисеовыхв явствуетв, что Іудеи не только очень распутны и любострастны были, но что распутства ихв навлекали имв и мерзостныя бользни. Многіе законы и заповъ-

данія их в доказывают в такожде, что он в происходили от в нечистоты и любод вянія, так в как в всякому безпристрастному читателю должно быть явственно.

Мъсячное очищение, которое въ здоровомъ состояніи мало разнится отв крови, но иногда бываетв ъдко и жгуще, обращило шакже на себя вниманіе Врачей и испытателей естества. Да будеть мнъ дозволено помъстить завсь одно мысто изв Плинія, находящееся въ 13 Главъ седьмой книги Естественной Исторїи. ,, Мало таких вещей, которыя ,, бы являли столь удивительныя ,, дъйствія, как в мысячное очищеніе: " молодыя вина киснуть отв при-,, ближенія онаго; рожь ділается "безплодною; трава засыхаеть; мо-, лодая капуста увядаеть и плоды , спадають сь деревь; зеркала и ,, сталь тускивють, а слоновая кость , лишается гладкости; пчелы поги-,, баюшь вь ихь ульяхь; мёдь и "жельзо мгновенно ржавьють и возу, духъ испареніями онаго поврежу, дается. Естьми польжуть онаго у, собаки, то приходять вы бъщену, ство, и укушеніе ихъ сопровождау, емо бываеть неизцълимымь ядомь. у, Самые даже муравьи ощущають у, дъйствіе онаго, и отбрасывають у, омоченныя онымь зерна. у,

Хотя увъдомление Плиниево нъсколько и излишно; но принявъ въ разсуждение климатъ, въ коемъ онъ обиталъ, и предположивъ особенно, что женщина изобиловала купно ъдкими соками: то найдемъ, что мнотое въ ономъ справедливо, хотя то другимъ причинамъ, нежели какъ каженся онъ думалъ, приписать должно.

Женщины являють въ семъ великое различе; даже у одной и той же особы можеть мъсячное очищенте быть различно, такъ что можеть оно быть для обонянтя весьма противнымъ, и имъть вредныя свойства. Нѣтъ нужды упоминать о многихъ дурныхъ слѣдствїяхъ, коимъ подвержена нечистоплотная женщина, и что развратныя въ такомъ состоянїи находятся. Женщины болѣе или менѣе подвержены теченїю бѣли, особливо распутныя. Естьли въ сїе время совокупится она съ разными мужщинами, то не удивительно, когда послѣдуетъ воспаленїе въ маточномъ влагалищѣ, и отдѣленная железами мокрота и бѣли сдѣлаются острыми; не довольно ли уже сего для возрожденїя Венерическаго яда?

Нѣкоторые припасали сте смѣшентю разных в сѣменв; быть можетв, однако думаю, что оно очень мало тому способствуетв. Можно принять в в сравненте суку, допускающую к в себъ многих в кобелей, и оно будет равныя имъть слъдствтя. Что собаки могуть имъть гоноррею, много разв примъчено, как в и то, что онъ послъ того бъсятся, не смотря на то, что многтя худыя

слъдствія отвращають своимь лиза-

Въ сокахъ живошныхъ находяшся два рода поврежденій: первый можеть произойти при жизни нашей, а другой савдуень посав смерши; что оный весьма много от псследдняго -отличается, тому научаеть насъ онышь: ибо сукровица исшекающая изв язвь такихь не шолько для обонянія противнье, но и болье вака, нежели какая либо часть въ величайшей тнилости находящагося тъла; сверьхв того издаеть она отв себя нъкое испареніе, склонное къ зараженію, однако лишается болье или менње сего свойства, какъ скоро прервется вообщение съ живымъ тъломъ. Сте и въ Венерическихъ и других варазишельных бользнях в имветь мьсто, какь мы потщимся сїе болье объяснить.

Сїя заразишельная остроша подобна нъкоторымъ образомъ опаръ или кислому тъсту: ибо она приводитъ не только всю кровь того тъла, въ которомъ находится, въ брожение и производить многихъ себъ подобныхъ, но и дълаеть сте такъ часто, какъ скоро найдетъ новый предметъ, надъ которымъ можеть оказать свое дъйствие.

Естьми разсудимъ, что собака взбъситься можетъ, не заразясь отъ укушенїя другой, и что она бользнь свою безчисленно многимъ другимъ сообщаетъ, то можемъ, по моему мнънїю, легко удостовъриться, что Венерическая бользнь можетъ произойти отъ одного излишняго любострастія. Сїє не есть догадка, но дъло основанное на опытъ.

Между блудодъями есть обыкновенте, что собравшись по нъскольку ходять они кь одной безпутной женщинь, а особливо вы такихы мъстахы, гдъ ихы мало. Вскоръ послътого приходить одинь изы нихы кылькарю, жалуется на свою бользны и негодуеть на женщину, причинивщую ему гоноррею; а при томы удивляется, что другте, имъвште сы насть Пл.

нею прежде его дело, остались отв

Вышепомянущое часто мною замъчено; да думаю, что и другимъ, кои много имъли въ рукахъ подобныхъ больныхъ, таковыя наблюдентя учинились извъстными, изъ коихъ могли они равныя сдълать заключентя.

Сего мивнія держались и древніе, хотя имі бользнь сія и менье была извъстна, нежели намь. И когда разсмотримь безь всяких в предразсудковь распространеніе проказы и разные оной припадки, то совершенно увъримся, что онъ отв подобных в причинъ происходили, и что съ припадками вкоренившейся Венерической заразы совершенно сходствують.

Я долженъ только здъсь замътить, что я не почитаю, чтобъ всъ роды проказы происходили отъ любострастія; но что разные роды оной между собою перемъщаны.

Бывають больяни, кои происходять отвиспортившихся соковь, которые болъе и болъе умножаясь принимають наконець на себя видь вкоренившейся Венерической бользни, оть которой разнятся только началомъ происхожденія. Скитающіеся нищёе сёе довольно доказывающь; они ни въ чемъ не наблюдають чистошы, и подвержены от в того чесоткв, шелудямь и другимь зловоннымь чирьямь, отв чего и дълаются часто предметами презрънія. Таковые примъры находятся во всъх в почти націяхь. Особливо есть нечистота характеристической признак В Жидов в, наипаче бъдныхъ, которые почти съъдаются червями.

Къ бользнямъ, которыя по внъшнему виду и натурою ихъ между собою сходствують, хотя образомъ происхождентя одна отъ другой и разнятся, можно справедливо причислить Гавсь, бользнь, которой Негры подвержены бывають. Хотя Африка кромъ береговъ и мало намъ извъстна, однако мы знаемъ, что жители, обитающіе далье на твердой земль, суть весьма жестоки, и вдять въ нъкоторыхъ мъстахъ человьское мясо; далье, что они подвержены мерзительнымъ бользнямъ, которыя частію отъ неумъренности къ любострастію, частію и отъ друтихъ безпорядковъ происходять. Не смотря на то, извъстно намъ, что бользнь Іавсъ произотла у Негровъ въ Весть Индъйскихъ селеніяхь, и что они прежде въ отечествъ своемъ оною заражены не были.

Сїя бользнь причинила Весть-Индскимъ Врачамъ много труда; сїе инаково и быть не могло: ибо они принаравливали способъ льченїя болье къ наименованїю, нежели къ естеству бользни; почему измучивъ тщетно сихъ бъдняковъ, признавали оную неизлъчимою, и отсылали ихъ на необитаемые острова, гдъ ихъ Нашура иногда совершенно возстановляла. Отъ сего произошло заблужденїе, что начали думать, будто нвкоторые изд сихв малыхв острововов имвють особенное неизвъстное свойство издълять бользнь Іавсь. Но бользнь сїя можетв, какв я уже сказаль, быть Венерическою или не Венерическою; естьли имветв она мьстопребыванїе свое въдътородныхв орудіяхь, какв то по больтой части случается, то сообщается она посредствомь соитія дьтороднымь частямь такв, какв и Венерическая, и тогда бывають послъдствія обоихв совершенно равны.

Но не желаль бы я, чтобь подумали, что я сказаннымь мною хочу доказать, что Индъйцы вь разпространени Венерической заразы не виновны были; ибо почти не возможно, чтобь толико многочисленный народь, каковымь быль онь во время прибыта Гишпанцовь, освобождень быль оть сей бользни. Правда и то, что они въ жаркихь климатахь сильные, нежели въ холодныхь; также не сомнываюсь я въ томь, что Гишпанские солдаты спостытествовали распространенію оной вы Европъ.

Величайшее зло произошло шогда от в неискуснаго способа лъчентя; ибо тъ, кои менье лъкарство принимали, удобнъе от в того освобождались.

Такожде въроятно, что ядъ къ намъ перенесенный сильнъе быль, чъмъ собственнаго нашего завода. Да оный и никогда не будеть слабъе, развъ отъ разумнаго образа лъченїя. Мы находимъ теперь столькожь изувъченныхъ оною больныхъ, какъ и прежде, или отъ непристойнаго способа лъченія, или отъ собственнаго нерадънія больныхъ.

Словомъ, пока народъ предавался любострастію и оному предавашься будеть, дотоль были Венерическій бользни въ разныхъ степеняхъ слъдствіемъ онаго, да и навсегда слъдствіемъ онаго пребудуть, въ Европъли будеть сїе или въ Азіи, въ Африкъ или Америкъ. Всъ прочія Эпидеми

ческія заразы и противоестествен-

Естьли сїе такв, какв мнт то очень въроятнымв быть кажется, то явствуетв отсюда, что Натура не хотта, чтобь люди безв всякаго разбору смъщивались между собою: ибо сїе необузданное смъщеніе не только вредно для разпложенія народа, но оно нарушаетв здравіе, и изгоняетв изв сердца человъческато любовь, дружество и всякую другую добродътель.



## ГЛАВА ІІ.

О зарождении Венеригеского яда.

Мы приближаемся мало по малу къ настоящему дълу. Будучи побуждаемы предыдущею Главою, стануть ожидать отъ меня, чтобъ показаль я, какимь образомъ ядъ Венерической зарождается. Я осмъ-

люсь испытать сїе, хотя и вижу предъ собою великія затрудненія.

Вообразить себъ вещь есть совсъмъ инаково, нежели сдълать оную понятною другимъ. Идеи, въ насъ рождающіяся, какъбы далеко ни заблуждались, представляются дуть нашей явственными; но изустныя язъясненія наши не всегда достаточны выразить оныя, понеже ограничены суть.

Я утверждаль, что оть смешаннаго совокуплентя рождается Венерическая зараза, и не только вы семы совершенно уверены, но постараюсь и доказать сте. Сметенное совокупленте двоякимы производится образомы, а именно: во первыхы, когда женщина предается разнымы мужщинамы, а во вторыхы, когда мужщина обращается сы разными женщинами. Какы то, такы и другое противно иравственнымы и естественнымы законамы. Хотя вы разсужденти страстолюбцовы и можно привесть нѣчто въ оправдание мужеской невоздержности, но въ разсуждени женщинъ сказать сего не можно; онъ суть и пребудутъ по законамъ естественнымъ виновными.

Для нравственности было бы открыто здъсь цълое поле; но испытанїя наши относятся къ Натуръ, гдъ найдемъ мы еще довольно много дъла. И такъ обратимся къ нашему предмету и замътимъ:

Что между мужемь и женою великая находится разность вы разсуждени естественныхы ихы обязанностей: мужы болые покровитель, жена болые другы; мужы созданы для плодотворения, жена для зачатия; мужы для попечения, жена для кормления. Внутреннее побуждение дылаеты то, что они находять вы любви кы дытямы своимы общее удовольствие. На тоты конецы сотворены мужы душею и тыломы храбрымы и сильнымы, а жена получила на свою часть ныжное тыло и ныжную душу.

Часть II.

Мужь любить детей своихь, истому что увърень въ добродътели жены своей, и почитаеть ихв своими собственными. Жена любить напрошивь того своего мужа ради дътей, ими обще рожденныхЪ, почишая ихъ частію самой себя. Сій сушь узы взаимныя любви и обязанности обоего пола; онъ налагають купно особенныя должности, опредъливъ мужу бышь храбрымъ, разумнымъ, здоровымъ и трудолюбивымъ отцемъ, и научая жену быть цъломудренною, разумною и нъжною машерью. Здёсь является Природа въ первомъ своемъ величествъ! Но дабы удержать человъка на пути сего блаженства, то содълала она всякое отдаление отв онаго труднымв и непріятнымЪ, и показала ему чрезъ то, какъ легко быть добрымъ и счастливымъ, и что одни невъжи отв онаго отдаляются.

Жена не для удовлетворенія прихотей сотворена; но Природа опредълила оную для зачатія. Сїє явствуеть во первыхь изь всего строентя маточнаго влагалища, у ксего внутренняя оболочка весьма тонка, и отв частаго соиття удобно изранена быть можеть; а во вторыхь изь того, что излашнее любострасте дълаеть какъ мужа, такъ и жену безплодными: сте есть обыкновенною причиною, для чего разпутныя женщины такъ ръдко бывають беременны; ибо часто повторенное соитте препятствуеть прилъплентю воспртятаго.

Женщина находится во время совокупленія страждущею, мужщина напрошивь того дъйствующимь. И оть того можно сь женщиною имъть дъло безь всякаго для нея удовольствія, безь ея склонности и безь ея согласія; но мужщинь дяла Природа волю его вь его власть, дабы могь онь разполагать по своимь собственнымь силамь. Отсюду явствуеть различіе, находящееся вь излишнемь любострастіи. Ибо хотя любострастіе, имъющееся между му-

жемь и женою, и вредно, однако не имъеть оно такихь слъдствій, какь то, которое оть совокупленія сь разными мужщинами происходить: поелику мужщина не вь состояніи повторять оное сь равною дъятельностію, ибо сила его мало по малу слабъеть, и онь дълается подь конець неспособнымь, оть чего женщина получаеть время отдохнуть; когда напротивь того совокупленіе сь разными мужщинами, которые равно сильнымь разжены побужденіемь, совсьмь другія должно имъть слъдствія.

Любовь и цъломудріе суть неразлучные спутники. Женщина, которая любить, есть купно и цъломудренна. Она не можеть любить болье одного мужа; а какь она купно цъломудренна, то и не удостоить никого своимь вниманїемь. Но какь скоро дасть она сей добродътели отставку, то прекратится и любовь; а потерявь честное свое имя, будеть сама себь вы тягость и станеть сама себя презирать. Она болье не любить, но презираеть мужеской поль ради того, который ввергнуль ее вы несчасте, и видя себя оставленною, предается большему разпутству. Въдая сама, что не имъеть требовантя на дружбу и покровительство другихь, дышить она вы отчаяти своемы одною злобою и мщентемы. Естьли присовокупится кы тому бъдность, то находить она себя принужденною предаться на посрамленте всякаго.

Можеть ли таксвая женщина при такогомь обрать жизни быль здоровою? Конечно не можеть; она дълается добычею немощей и бользней. Видя наконець, что красотою тьла своего никого болье прельстить не можеть, прибъгаеть она къ хитрости и обману, и старается чрезь сте уловить неосторожнаго въ съти свои и содержать его до тъхъ порь, пока не заплатить онь за свое безумте имънтемъ своимъ, здравтемъ, спокойствтемъ души и

самою даже жизнію. Вь шакомь состояніи находится публичная любодъйка. Кь сему присовркупляется еще, что она принуждена иногда претерпъвать величайтія недостатки вь жизненныхь надобностяхь; иногда терпъть голодь, жажду, морозь и печаль; а иногда предаваться для своего прокормленія величайтимь разпутствамь, кои подвергають ее мерзостньйтимь порокамь, несчастіямь и бользиямь.

Таковая несчастливица способна по моему мнънію возродить Венерической ядь. Естьли будеть она довольствоваться однимь, то сіе не такь легко произвесть можеть. Но какь скоро найдеть себя изь интерессу принужденною предаваться мнотимь, то дълаются оть частаго соитія въ дътородных частях вязвины, и она находить оныя на другой день разпухлыми и воспаленными, а себя оть слабости изнеможенною и пораженною болью, которая совокупясь сь упреками совъсти

заставляеть ее проклинать быте свое. Наружныя части суть не одкъ, которыя страждуть; ибо и самая матка и маточное влагалище, изъ коихъ изтекаеть ъдкая и зловонная матерія, онымъ состраждуть.

Можеть быть спросять, точно ли женщина заражена теперь? Долодлинно я, правда, не знаю, но только могу увърить, что тоть, который съ ней въ такомъ состояни совокупится, почувствуеть скоро оть того слъдствия, и положить основание къ такой же точно истинной Венерической бользни, каковая только перенесена къ намъ Колумбомъ и его товарищами.

Возраженія, какія противу сего учинены быть могуть, мить очень извъстны, только должень я еще испросить нъсколько терпънія.

Естьли спросять меня, не моженьли излишество въ любострасти между одною четою, а именно между слабою женою и кръпкимъ здоровымъ мужемъ, равное имъть дъйствте? то отвътствую, что сте, можеть быть, произойти можеть, хотя я и очень склонень къ противному мнънто, и сте не по прежденомянутой причинъ, естественной неспособности къ таковому невоздержанто со стороны мужа, согласнаго образа мыслей, откровенности и чистоты, но по причинъ особеннаго рода, а именно: по согластю членовь, кои мало по малу одинъ къ другому привыкають и совершенно одинъ для другаго пртуготовляются.

Что бы ни думали о особенных в свойствах венерическаго яда, однако я болье и болье вы мный своемы утверждаюсь, что оный обязаны начальнымы происхождениемы своимы маленькимы язвинамы; а особливо происходить оты порчи соковы вы дытородных частях в. Я охотно согласуюсь, что венерической яды оты сукровицы всякой другой язвы отличается; а особливо когда зараза или бользны есть частная. Сте сообразно сы разумомы: ибо онь имьють нача-

ло их в отв особливых в соковв, которые въ дътородныхъ частяхъ обоего пола имъющь вь себъ нъчто отмънное. Ни Натура, ни Искусство не производила влажности, которая бы имъла такой особенной запахъ, какъ внутри женских дътородных частей находящаяся; который, естьли оть чистой и здоровой женщины происходить, бываеть для влюбленных прежде соишія пріятнымь, но послв онаго двлается отвратительнымь. Сте учинила Природа для возбужденія естественнаго влеченія, которое однако на других в животных в большее имфеть вліяніе, чьмь на человъка. Посредствомъ онаго приманиваеть самка самца своего къ совокупленію, и отпускаеть его паки по удовлетворении естественнаго побужденія; а особливо происходить сіе у безпорядочно между собою смъшивающихся звърей. Сей способъ употребляль знатный собачій ворь Бампсилде Мооре Каревь, когда ходиль на собачью кражу. Сей запахъ

находится без сомнания в слизи, отдаляемой железами маточнаго влагалица, которой наиначе принисываю я произведению Венерическаго яда. Во всей экономии животных в не находится, может быть, такой влаги, которая бы так скорой подвержена была порча, как сія самая; почему и должны женщины наблюдать великую чистоту: ибо и самое естественное побужденіе далает в нась к сему замачательными и рождает в в нась отвращеніе к в нечистой женщинь.

Изв сего можно вывесть одну изв твхв причинь, для чего Природа поселила двтородныя орудія св орудіями моченспускательными. А именно, ввроятнымв кажется, что моча служить для смыванія остроты сея влаги, дабы сохранять ее свыжею; ибо посредствомв оной находимся мы вв состояніи избъгать многихв непріятностей.

Я не могу пропустить здъсь, чтобь не замъщить, что въ уринъ

болье имъется силы, нежели какъ мы думаемь; бъдные люди употребляють оную изъ нужды съ хорошимъ успъхомъ, особливо въ сыпяхъ на кожъ, когда другія дорогія наружныя средства никакой не принесли пользы. Она похваляется даже какъ нарочитое средство отъ укушенія бъщеной собаки и отъ другихъ заразительныхъ бользней, да по моему мнънію и нъсколько основательно.

Примъчанія достойно то, что собаки великую имьють склонность испускать мочу у каждаго угла, гдъ ощутять чрезь обоняніе нъчто собственное, ихъкь тому побуждающее.

Вообще ничто не благопріятствуеть толико здравію, какь наблюденіе чистоты, а особливо вы тьхы частяхь, о которыхь здъсь говорится. Чистота есть одна изы превссходньйшихь добродьтелей и украшеній женщины. Она увеличиваеть постоянство и цьломудріе; ибо оть сего происходить, что поступаеть она воздержно, и что отв острых соков востается свободною, которые сильны возбудить вв душ любострастныя желанія. Но отв неопрятности происходить совство другое: ибо невоздержность и бользни суть сопутники оной, так что мы вв состояній даже отв наружной опрятности женщины заключить о состояніи ея мыслей.

Въ разныхъ родахъ любострастія древнихъ были ихъ бани върно цълительны и достойны похвалы; исо хотя они всякаго рода развратностямъ также преданы были, какъ и современники наши, однако помощію оныхъ избъгали они чаще, нежели мы, тъхъ слъдствій, кои обыкновенно влекуть онъ за собою. Такожде не невъроятно есть и то, что они, особливо Римляне, по сей причинъ здоровъе и кръпче были, чъмъ мы. Удивительно, что спасительное сїе обыкновеніе во времена наши оставлено въ забвеніи. Когда Прич

рода и разсудокъ столь много добраго представляють въ его пользу.

Досель говориль я о причинахь Венерическаго яда, кои говоря ясные не составляють еще самаго яда; ибо вы семы находится еще примытное различе. Я описалы влажность, происходящую оты язвы вы маточномы влагалищь и другихы дытородныхы частяхы, безмырно часто повтореннымы смышеннымы совокупленіемы причиненной, однако безы предшествующаго зараженія.

Въ таковыхъ обстоятельствахъ думаю я, что женщина способна заразить всякаго, съ ней совокупляющагося, наипаче же молодаго пылкаго человъка; особливо когда онъ совсъмъ совершитъ совокупленте, хотя объ ней въ совершенномъ смыслъ и не льзя сказать, чтобъ она сама имъла ту болъзнь, которую сообщаетъ. Таковой случай бываетъ по моему мнънтю весьма часто. Отсюду далъе явствуетъ, отъ чего пылкая юность чаще подвержена заразъ, чъмъ

престарълые люди, и отв чего женщина одного заражаеть, а другаго ньть; дьло, которое весьма часто приключается и подаеть поводь къ разнымъ несогласіямъ, гдъ честность женщины остается безь подозрънія.

Какимъ образомъ причиняется зараза, удобно уразумъть можно, когда разсудимь о томь, что происходить во время соитія. Безъ напряженія члена не ві состояніи мужщина совокупиться, а оное не что иное есть, какъ вступление кроги въ печуристыя тьла онаго, которое тъмь сильнъе бываеть, чъмь здоровье мужщина, и чьмъ болье наполнены съменныя хранилища. Похоть, удовольствіе и сильныя движенія тьла приводять весь составь крови вь движение. Всякая часть тъла разтагивается, когда достигнеть соите до высочайшей своей степени. В с с с время потовыя всего тьла поры сколько можно отверзаются и нъсколько испаряють, а особливо орудія дътородныя.

Но какъ скоро послъдуетъ излілніе съмени, то сцена перемъняется и ни одна часть во всемь тълъ не остается по прежнему; часть, которая прежде растянута была, стягивается теперь, и тъмъ паче, чъмъ болъе прежде была растянута: однако скоропостижная сія перемъна примътнье гораздо въ мужескомъ членъ.

Теперь же въроятно, что сїя часть во время стягиванія всасываеть нъсколько изв окружающих в влагь; а когда сїн испорчены и остры, то инаково быть не можеть, какъ что ему должно от того заразиться. Ядъ раздъляется послъ сего различнымь образомь; но дълается сте не случайно, какъ можеть быть подумають, а частію по обращенію соковь, отчасти же по тому, чъмь болве части подвержены яду и отв пренія растерты, отв чего непосредственное прикосновсийе плотиве бываеть и ядь сильные втягивается.

Естьли случится всасываніе во внѣшних визастях визастях визастивнов во передней кожицъ, во уздочкъ, во плѣшкъ и ея зарубкъ и т. д., то появятся мало по малу незалупа (фимозись), неотлупа (парафимозись) и ранки или шанкеры и т. п. Естьли же ядъ проникнеть въ мочевый каналь, какъ то обыкновенно случается, когда совокупленіе до конца совершится, то будеть слъдствіемъ гоноррея.

Съ сего времени дълается ядъ совершенно заразительнымъ, когда прежде сего быль онъ таковымъ только случайнымъ образомъ, и то особливо по причинъ испорченнаго его свойства, чъмъ и отличается отъ влажностей, происходящихъ отъ другихъ ранокъ, только въ разсуждени непосредственнаго прикосновения, и тъмъ, что подобныя находитъ влаги.

Нъкоторые приписывають начальное происхождение Венерическаго яда Содомскому гръхопадению; но какъ сама Природа стыдится сего порока, и причины онаго съ преждепомянутыми сходствують, то я оныя изъ предосторожности обойду.

Сколь справедливо или несправедливо судиль я о происхождении Венерическаго яда, оставляю на судь моимь Читателямь. Есть еще и другія причины, могущія произвесть ядь Венерической; но поелику я вы послъдствій моихь испытаній коснусь купно и оныхь, то обращаюсь теперь кь изслъдованію натуры сего тонкаго и пагубнаго яда.



## ГЛАВА III.

О натуръ Венеритеского яда.

Отв соитія ли разныхв особв, или отв излишества вв любострастій отв неестественнаго любострастія, или отв нечистоты и язвинв Венерической ядв происходить; или пренесень кв намв прежде изв Вест-Индіт, или св Гвинейскихв береговв, или изв другой какой либо части Часть ІІ.

свъта, пусть судять изв предмествующаго, гдъ старались мы утвердить, что каждое по себъ въ состояни произвесть стю бользнь. Мы обратимся къ изслъдовантю натуры сея бользни и къ изслъдовантю того, чъмъ различествуеть оная отъ другихъ заразительныхъ бользней.

Я должень только напередь замътить, что я дълаю различте между причиною и дъйствтемь Венерическаго яда; то есть, между остротою, которая можеть произвесть бользнь, и между самою бользнтю; ибо зараза первой есть только случайная, а послъдней непремънно послъдующая.

При изслъдовани нашемъ должны мы при наблюденияхъ и замъчанияхъ, чувствамъ нашимъ ясными представляющихся, останавливаться; ибо безъ нихъ не знаемъ мы никакой вещи, да и знать не можемъ. Какъ скоро мы оныя оставимъ, то уподобимся кораблю, предающемуся морскимъ волнамъ безъ компаса.

Относительно кв сущности, образованйю и величинъ частиць, Венерической ядь составляющихв, мы ничего не знаемв. Испытания о семв сущь какв глупы, такв и безполезны.

Что сказано о угловатых и острых в оных в концах в, и что остроту их в надлежить притуплять и сдвлать их в напретивы того четвероугольными, круглыми, продолговатыми и т. д., почитаю я также непонятным в.

Между минеральными и прозябаемыми шълами и шълами живошных веснь примътное различіе; оно примътно как въ бракъ ихъ произхожденія, шакъ и въ ихъ унцутоженіи. Такожде находимъ мы великое различіе между остротою порчи живошных ви между производимою минераломъ.

Вообще принято, что Венерической ядь есть рода ъдкаго, и опыть доказаль сте. Но по моему мнънто не имъемъ мы права давать ему наименованіе соленой или кислой остроты; ибо что то оному явно противно, доказываеть то, что посредствомь обоихь можно ему воспрелятствовать, какь покажемь сіе посль при способномь случаь.

Равнымъ образомъ пріобыкли мы приписывать нарывное свойство Шпанскихъ мухъ, съ которыми Венерической ядь много имѣеть сходства, нѣкоторымъ солянымъ частицамъ, не смотря на то, что посредствомъ Химическихъ опытовь изъ сихъ несъкомыхъ не болѣе соли извлечь можно, какъ и изъ равнаго количества несъкомыхъ другаго рода.

Всякая прилипчивая зараза имъеть остроту, которая рано или поздно являеть вредительное свойство, и имъеть вы семь сы разрушительнымы свойствомы бакихы минеральныхы средствы нъкоторое сходство, хотя онъ по своему состоянію между собою такы противоположны, что мы никакы не можемы дать имы одинакое названіе.

Обще принятая истинна есть, что соли и кислоты всякаго рода суть величайт предохранительныя средства гнилости и слъдовательно зарождентю глистов сопротивляющіяся; но также обще принято и то, что испорченная влажность животных совсът противное являет дъйстве. Бдкая язва не только имъет испорченное свойство, но и дурно пахнет ; а когда оставлена будет в в небреженти, то зарождаются в ней маленьк червячки: сти уничтожаются минеральным составом в.

Шпанскія мухи, когда оставишь их ва воздухв, и положишь на такое мвсто, гдв могутв онв втягивать вв себя нвкоторую влажность, закишать вскорв червечками и почти всв вв оные претворятся; но когда смвшаешь их в св камфорою, солями и другими гнили сопротивляющимися вещьми, то отв таковаго возрожденія животных втакже предохранены будутв, какв

H 3

и всякое другое существо животных в. Но примъчания достойно то, что такозыя предохранительныя средства притупляють нъсколько нарывное их в свойство.

Чымь болые разсуждаемь мы о разнообразных в недугах в, коим в што наше подвержено бываеть, и о разнородных в способах в коими извявляють они вредную свою силу, тъмь болъе находимъ себя неспособными дать о какомъ либо изъ оных в надлежащій отчеть. Одинь впадаеть оть безпутства, оть погръшности въ діэть, или отв гнъва, вь желчную гнилообразную лихорад. ку и сообщаеть бользнь свою другимь; другой получаеть оть нехорошаго состоянія соковь часотку и заражаеть другихь, къ нему прикасающихся; собака бъсишся и сообщаеть посредствомь укушентя бользнь свою людямь и звърямь; заразится кию Венерическою бользнію, заражающся и шь, кои непосредственно къ оному прикасаются. Всв

помянутыя бользни вредны, но каждая особливымо образомо; и все, что можемо мы о томо судить, есть, что зараза каждой изо оныхо есть отмъннаго рода, и только такую часть тъла заражаето, во которой первоначально произошля, надо которою болье имъето силы, и что слъдовательно часть сїя есть неспособныйтая сопротивляться вредительному свойству оной.

Одной ядъ дъйствуетъ на внутренности, и натура старается освободиться отъ онаго частыми испражненіями безъ причиненія наружной сыпи. Ядъ другой оставляєть ихъ свободными и объемлеть только наружныя части пъла. Одна болъзнь дъйствуеть на железы; другая на нервы. Одна поражаеть жидкія, другая плотныя части, и т. д.

Но ядь Венерической заражаеть вст части и способствуеть мало по малу разрушенію всей машины. Все различіе онаго состоить вы разных степеняхь, и вы томь, что оны или

новопроизшедшій или давно вкоренившейся, или одну шолько часть или все тьло объемлеть. Ядь, которой чрезь непосредственное соите сообщается, есть начальный с которому прочіе одолжены бытіем в своим в; подв симв разумвемь мы наипаче тошь, который имъетъ язвотворное свойство. Всякая часть тьла нашего подвержена особенному роду поврежденїю; оть чего тогда, когда Венерической ядь по всему тьлу распространится, столько же разных бользней происходить, сколько разных в соковь въ твлв заражены и испорчены; почему и великое находишся различіе между новопроизшедшею и мъсшною бользнію, и тою, которая все тело объемлеть: оныя ограничивающся шолько на шехъ частяхъ, кои ядь прежде воспріяли, а сіи бывають сльдствіемъ нъсколько разъ новополученнаго яда.

Всъ заражентя сходствують въ томъ, что оказываются воспалентемъ и нагноентемъ той части, кото-

рая ядь напередь получаеть; развы произойдеть зараза снаружи или внутри. Накоторые только случаи изь сего изключаются. Такимь образомь воспаляеть привитая оспа ту часть, гдъ оная запускается; то происходить и отв укушенія бышеной собаки. Когда бэльные натуральною осною заражаются, и ядь чрезь вдыханіе втягивается, то садится оный въ воздушномъ каналъ и въ легкихв, и тогда бывають охриплость и кашель первыми припадками, онымъ производимыми; а естьли будеть заражение чрезь потовыя поры, пто оказывается рожв подобная опухоль.


Вь зараженіяхь надлежить замьтить еще ньчто, чьмь отличаются онь отв такихь порчей, кои минеральными вакими средствами причиняемы бывають. А именно: ядь ихь кроется нькоторое время вь тыль, не причиняя никакого больному безпокойства; минеральныя же такости авйствують напротивь того Часть «П. тотчась на ть части, къ коимъ прикасаются. Оныя дъйствують медленно и вредное свойство ихъ мало по малу усиливается. Сти напрошивь того дъйствують сначала сильно, но мало по малу теряють разрушительную свою силу.

Изъ встхъ сихъ наблюдений явствуеть, что Венерическому яду ни соленаго, ни кислаго свойства принисать не можно, и что оный совстмъ другія на шъло наше оказываеть двиствія, нежели мы прежде ві состояній были избяснить сіе словами. Прежде сего думали, что оный происходишь отв маленькихв червячковь, какое мнвние еще и по нынъ нъкоторые имъють. Знатный Боале старался утвердить, что всъ бользни происходять оть червей; вь чемь онь также счастливь быль какъ и Левенгекъ. Хотя и оба они заблуждались, однакож в имълв тотв болъе доказательствь, нежели сей.

Не льзя оспоривань того, что всв почти язвы и закожныя бользни, когда сами себъ оставлены будуть, червячками разнаго рода наполняются, кои не шолько помощію увеличишельнаго сшекла, но часто и одними глазами видеть можно. Но мы находимъ, что сій червячки рождаются уже от частиць заразою поврежденных в; того ради ни сїе, ни произшествіе гноеватой, сукровичной и зловонной машеріи не есть характерическимъ признакомъ прилипчивой заразы: ибо сія есть особенное существо летучее, а оныя суть полько грубъйшія испорченныя части.

Но дабы испытанія наши не пожазались слишкомь продолжительными, що замьчу только то, что я Венерической ядь почитаю остротою, которая не есть ни соленаго, ни кислаго рода, ниже происходить оть червей, которая и вь отношеніи ея дъйствія оть оныхь различествуеть: ибо она имьеть свойство спиртоватое, сь нько-

ппорыми жидкими и плотными частями плотно соединяющееся, такожде отличается и шъмъ, что она способна нарушинь порядокъ натуры въ тъхъ частяхъ, кои она поражаеть, раздражаеть и воспаляеть, маленькія частицы отв оныхв отдаляеть, существо ихъ разрущаеть и причиняеть язвы. Но сїє Венерическаго яда свойство не могу я никоимь образомь инаково изтяснить, какъ сказавь: что оный есть тонкая спиртоватая острота, на лимфатическія жидкости и железы наипаче дъйствующая. А сія острота состоинь болье вы летучей и дъйствующей заразъ, нежели въ острыхъ частицахь, кои можеть быта имъеть она обще съ минеральными солями и кислошами. Придинчивость и распространение сего яда въ шълъ познаются наилучше изв разумьнія Анатоміи.



## TAABA IV.

О заразъ Венерисеской бользни.

Мы приступаемь теперь кь описанію разныхь родовь заразы, коей подвергаеть нась бользнь сія. Не несправедливо будеть, естьли возмемь напередь вь разсужденіе свойства заразы вообще. Приращеніе и уменьшеніе спорять во всей природь между собою; какь то, такь и другое нужно по порядку неисповъдимаго оныхь источника для сохраненія всей цьпи сотворенныхь вещей.

Всякое тьло минеральнаго прозябаемаго или животнаго рода есть здорово, пока находится въ предписанныхъ ему предълахъ; но какъ скоро выдеть изъ оныхъ, по какъй бы то причинъ ни было, то начнеть тотчасъ убавляться; оно сообщило бы ущербъ сей и другому подобнаго рода тълу, естьлибъ къ оному непосредственно прикасалось, развъ только сдълана будеть таковой порчъ остановка.

Сїя способность сообщать разрушенїе свое другому, есть зараза въ общемъ смыслъ, которой столько же много родовь бываеть, сколько тьль и бользней. Въ разсуждении тълъ животных в находятся два рода зараженія, а именно: первое и второе. Первое можеть двоякимь произойти образомъ, а именно: во первыхъ отъ непосредственнаго частей прикосновенія, а во вторых в отв находящихся въ воздухъ заразительныхъ испареній, кои въ нъкошоромь разсшояніи всасывающся. Сін раздъленія сдъланы не безъ разбору, какъ нъкоторые кажется думають: ибо всякая болѣзнь, чрезъ непосредственное прикосновение заражающая, дълаеть сте болье или менье въ нъкошоромъ разстояніи. Сіе можно заключить по тому, что воздухв, вв которомв находятся больные, должень болье или менъе наполненъ бышь исправленіями заразительной бользни. Но способность здороваго человька притягивынь сйю заразу соотвытствуеть не только состоянию тыла его, вы какомы оно находится, но и тому, какы ты части, которыя тымы повреждены быть могуть, заразы подвержены. Чрезы сйе будемы мы вы состояния явственно усмотрыть явления, оказывающияся вы заразахы разныхы степеней Венерической бользни.

Первый родъ зараженія, кошорый по моему мнѣнію есть первоначальною причиною (caufa primaria) сей бользни, производится наипаче язвинами въ мокропныхъ железахъ машочнаго влагалища и шайных в обоего пола частяхъ. А именно: могушь машочное влагалище и дъщородныя женскія часши имъшь язвины или отв нечистоты, отв которой мокрошныя влаги получили нѣкоторую остроту, или отв вдкаго теченія бъли, или худаго состоянія мъсячнаго очищентя, или отъ излишества въ любострасти. Женщина можеть вь семь случав заразить,

хотя она сама нъкоторымъ образомъ и не заражена; но сте дълается только случайным в образом в: ибо она не заразить можеть быть по вышеобъявленной причинъ того, который пріобыкь сь нею сосбщаться; но когда сообщится она съ молодымъ, горячимъ, постороннимъ человъкомъ, то въ заражении по крайней мъръ по моему мнанію сомнаваться не должно. Равнымъ образомъ можешъ и мужщина заразишь женщину; а именно: маленькія железки, лежащія позади плішки, могупів извязилены быть и въ нихъ возродиться, безъ предшествующаго зараженія, родъ шанкера, который у людей, имъющих в длинную переднию кожицу, происходить текмо отв упущеннаго омовенія мужескаго члена, или и малакти, какъ то часто случается. Въ семъ случав можеть такожде острота удобно сообщена быть мекроннымв маточнаго влагалища железамв, и штмв наппаче, чтмв нъжнте женщина и чъмъ пламениъе будетъ

соите. Однако послѣднее зараженте не такъ часто происходить, какъ первое: ибо во первыхь мужщины сему роду язвъ не столько подвержены, какъ женщины; а во вторыхъ, когда они заражены оными, то къ соитто не такъ бываютъ способны, какъ другтй полъ.

Вторый родь зараженія есть нарочито сильный. Оный приключается во время сонтія от самаго Венерическаго яда. Никто не сомнъвается въсей истиннъ; однако имъются въразсужденіи сего нъкоторые вопросы, заслуживающіе точное испытаніе.

Первое: от учего то проискодить, что человькы, токмо мало сею бользнію зараженный, другаго очень сильно заражаеть, когда напротивы того сильно зараженный другаго слегка токмо заражаеть, а тречій и совсьмы того избытаеть? Подобные случан не только Врачамы, но и больнымы довольно извыстны. На сіє отвытствую я, что зараза не столько зависить от количества и остроты яда, какь от расположентя пото человъка, который онымь заражается. Мы видимь сте равномърно въ ость, гдъ разные люди от одного больнаго, имъющаго хорошую оспу, заражаются, и каждый изънихь претериъваеть различную участь, а именю: одинь получаеть хорошую оспу, другой напротивь того сливную, и умираеть.

Второе: для чего заражаеть инный другаго чрезвычайно сильно, не
чувствуя вь сте время ни мальйшаго
вь себь сей бользни знака? Здьсь
замышть должно, что тоть человыкь прежде уже заражень быль,
но приступиль кь соиттю прежде, нежели оказались знаки бользненные; почему и могла оная
сообщить ее здоровому человыку, хотя еще примытно и не оказалась,
какь сте весьма часто приключалось;
или произотло совокупленте вь такое время, когда зараженный человыкь почти выздоровыль, и бользнь

такъ легка быда, что никакихъ уже худыхъ не оказывала знаковъ; въ обоихъ случаяхъ здоровый человъкъ, коего потовыя поры отверзты, и который по нъжному раздражительному сложентю способень воспріять заразу, также легко заражается, какъ и отъ сильно зараженнаго человъка.

Треште: въ которое время совокупленія прилипаеть зараза в Забсь надлежить замътить, что сонте совстмь и не совстмь совершено быть можеть. Вь обоихь случаяхь существуеть плотне частей прикосновеніе; но вь ономь импется купно настоящее соединение. Изліяние съ обвихъ сторонъ свмени есть переломъ сего соединеннаго прикосновентя и перемвняеть обращение соковь, такь что когда прежде отдъление влагъ въ сихъ частяхъ происходило, то происходишь тогда всасываніе. Изь сего слъдуеть, что заражение во все время соитія происходить можеть,

но что дълается сте наипаче по изліянти съмени.

Четвертое: естьли какія предохранишельныя прошиву оной средсшва? Онъ точно есть; но онъ бывающь таковыми тогда только, когда уничтожають вошедшій ядь з ибо омовеніе, прежде и послѣ соипія чинимое, хошя хорошее есть обыкновеніе, могущее нѣсколько способствовать предохраненію отв заразы, есть для сего недостаточно; понеже зараза глубочайшее въ частяхъ имъещь гнъздо, нежели чтобъ можно смышь оную одною водою. Предложенныя для предохраненія ошь заразы и въ употреблении сущия машины не соотвътст ують сей цьли, понеже не могуть онь воспренятствовать входу ядовитых в испареній; а хошя бы сіе и ділали, однако все не отвратили бы з разы от в других в непокровенных в ими частей.

Третій родь зараженія приключается другимь образомь, кромь сонтія. Что сів точно происходить

ньть никакого сомньнія; но вы такомь случать должна бользнь не мьстною только, но всеобщею быть: вы семь состояній бывають заражены вст части и соки такь, что ни кы которой части зараженнаго тыла безь наказанія прикоснушься не можно. Таковый родь зараженія происходить или оть непосредственнаго прикосновенія, или оть находящихся вы воздухть испареній.

Что надлежить до зараженія непосредственнымь прикосновеніемь причиненнаго, то находимь, что оное произойти можеть і) отв цьлованія; при семь заражаются губы, языкь и горло, и раждаются вь оныхь небольшія язвины 2) Отв сосанія; туть можеть кормилица заразить дитя, или дитя кормилицу, вь обоихь случаяхь оказывается зараза напередь на сосцахь или вь роту.

3) Оть спанья на одной постель, вь которой лежить или лежаль зараженный человікь, страдавшій или Венерическими язвами и Венериче-

скою чесошкою, или сильный пошь пролившій. 4) Случайнымь образомь, когда опоръжется кто или поранить себя шты же инструментомь, который употреблень для зараженнаго человтка, какь сь великимь прискорбіемь испытывають сїє часто Хирурги, или попадзеть ядь другимь образомь изь раны Венерической вь не Венерическую.

Но когда окружающій больнаго воздухь учинишся заразишельнымь, то должень онь находишься вы крайне худомы положеній: ибо шогда имьешь онь не шолько вкоренившуюся Венерическую бользнь, но и всь его какы плошныя, шакы и жидкія часши испорчены. Таковое состояніе называли древніе проказою, не шолько Іудеи, но даже и новыйшіе народы. О послядствій будемы мы имыть случай говорить о семы болье.

Не излишне, думаю, будеть разсмотръть здъсь вопрось: отв чего то произходить, что тоть, который заразительной бользни страшится, скорье оною заражается, нежели тоть, который оной не опасается. Въ истиннъ дъла сего сомнъваться не должно; наипаче же не сомнительна она въ оспъ дътей, хотя то нъкоторые и осноривали. Во всей экономій животных в находится побуж денїе къ сохраненїю себя; почему всякая часнь онаго стремится при насшупающей опасности отступить; всь наружные сосуды принимающь участие вы общемы сожатии и тонять кровь назадь. Оть сего произходить, что кровь вь страхв и боявни вивжнія части оставляєть и удаляется во внутреннія; побліднъвшія губы и щеки и весь наружный видь вы томы нась увъряють. Опісюду явствуеть, что вь то время, какв што находишся вв семв состояній, должно от удаленія влажностей воспослъдовать всасыван ї е окружающаго его воздуха, а слъдовательно и находящагося вв ономв яда посредствомь потовыхь отверзтій. Естьли же кто напротивь тото не боязливь, то пребывають соки его въ надлежащемъ теченти, а тъло въ легкомъ испаренти, отъ чето онъ и не столько способенъ къ воспртятто заразы. Сте вкупъ показуетъ намъ пользу обыкновентя принимать прежде посъщентя заразительныхъ больныхъ для предохранентя сердцекръпительныя и пряныя вещи: ибо отъ сего остаются соки наши въ надлежащемъ ихъ теченти, а тъло въ испаренти, отъ чего и способны бываемъ воспротивляться заразъ.

Но дабы возвратиться паки къ вкоренившейся Венерической бользни, то скажемъ, что какъ скоро разсвется она по всему тълу, то дълается атмосфера больнаго заразительною; естьли же находится онъ въ то время въ надлежащемъ лъчении, то лъкарственные пары заразу уничтожають, какъ испытали мы сте щастливымъ образомъ чрезъ употребленте ртути, единаго противу оной средства, на которое въ сей б лъзни надъяться можно, и которое летучимъ своимъ свойствомъ

такъ совершенно уничтожаетъ Венерическую заразу, и предохраняетъ тъмь отъ подобнаго рода заражентя. Сте побудило разныхъ Писателей сомнъваться въ семь родъ заражентя, но они нашли бы себя въ семъ случат обманутыми, естьли бы отвъдали истребить Венерическую болъзнь безъ ртути.

Досель трактоваль я только о первоначальных в заражения родах в, кои довольно уже дають знать, что продолжение и образь бользии должны быть различны. Вы послъдстви упомянемы мы о второмы или продолжающемся заражени, которое происходить у самаго больнаго и разнымы образомы оказаться можеть.

Изь встх в прежденомянутых взаражен продов в есть обыкновенный и и върный полученный во время соитія. Вы семы случать бываеть больянь всегда мыстная, то есть, она ограничивается на ныкоторыя особливыя части, и причиняеть вы Часть 11.

оных вазвины. Доколь пребываеть она въ семъ состояни, старается натура воспрепянствовать вступленію непріятеля и піцится извергнуть бользненное существо. А естьли сіе дъйствіе натуры воспрепятсшвовано или оное преодольно будеть тымь, что ядь оть нерадьнія или безпорядка больнаго усилишся, или что въ лъчении произойдеть погръщность, то входять Венерическія частицы во кровь, со которою обращаются и причиняють столько же бользней, сколько находишся жидких и плошных в частей, кои онъ заражають и портять.

Заражение, от совокупления произшедшее, можеть разнымь оказываться образомь; однако наиболбе причиняеть оно гоноррею. Ръдко имъеть она сначала гнъздо свое такь глубоко, чтобь объяла части съмя содержащия; но когда оной тъмь или другимь образомь воспрепятствовано будеть, то заражаются смежныя части и ядь распространяется по

другимъ частямъ, кромъ тъхъ, кон оный прежде воспріяли, и причиняеть паховики, опухоль ядерь и т. д. Естьли ядь изь сихь частей выгнанъ будешь прежде, нежели совсьмь истребится, то должень непремънно пасть на другія части и войти въ кровь, отъ чего дълается бользнь общею. Въ послъдующихъ Главахъ буду я пространные говорить о разных в причинах в, кои в в состоянїи произвесть таковое общее зараженіе; а теперь упомяну только, что продолжение таковой заразы столь. кожь бываеть различно, какь и расположение больныхв, сею бользнию одержимыхь: ибо у нъкоторыхь она скора и крайне злосвойственна, у других в медлишельна и сокровенна, у инных удобно истребляется, у другихъ напрошивъ того бываетъ упорна и глубоко вкореняется.

Чтобь изследовать здесь причины разныхь сего яда действій, показалось бы можеть быть слишкомь скучно; чего ради да будеть довольно въдать, что главнъйшая онаго причина состоить въ расположении тъла самаго больнаго.

Бывають бользни, которыя по натуръ своей одна другой совсъмъ противны и одна другую уничтожають; другія напрошивь того поправляють испорченное ихь свойство. Т влочеловъческое въ одно время такъ расположено, что отвергаеть бользив, кошорую оно въ другое время охошно пріемленів, хотя человьків во время зараженія по внъшнему виду и наслаждается, кажется, непремъннымъ здравія состояніемь. Но вообще, хотя и вр семь имъются изключента. страдають Венерическою бользнію наиначе молодые, горячее и крыпкое сложение имвющие люди, и продолжение оной оказывается вы нихы скорте, нежели вы слабых и мокрошныхв. Почему и бывають женщины вообще менъе сей болъзни подвержены, нежели мужщины: ибо кромъ того, что имьють онь слабыйная волоши, сушь и соки ихв изобильны

и не такъ остры, тъло ихъ способнъе ко врачевантю, и слъдственно онъ удобнъе отъ оной освобождаются.

Все, что причиняеть жарь, страсти ли, горячительные ли напитки или другіе безпорядки, то увеличиваеть и сей вредный огонь и споспътествуеть разпространенію онаго по всему тьлу.


Между продолжением втораго и перваго заражения есть примътное различие. Зараза, причиняющая гоноррею, есть примътна и удобнъе отвращается; ибо она тотчась изъявляеть свое существование, и понуждаеть болящаго искать помощи. Оная же, которая впускаеть миновенно ядь свой вы кровь и тихо вы оной обращается, дъйствуеть тъмы тайноубивственные и незапно поражаеть больнаго смертоноснымы ударомы, оты котораго оны оты дремоты своей пробуждается, но уже поздно.

Весьма сожальнія достойно, что невинные равной сь виновными подвержены участи, а именно: когда дитя отв своей кормилицы, а кормилица от дитяти ея заражаются; сколько вреда навлекло сте нъкоторымъ фамиліямъ, Врачамъ довольно извъстино. От в подобных в невинных в зараженій нарушалось здравіе, мпрв и довъренность между мужемь и женою. Таковыя кормилицы, пишавшія грудью своею зараженных в млаценцевь, сообщали бользнь стю во время соитія мужьямь своимь злосвойственно. Накоторые сомнавались ві истиннъ дъла сего, хотя по зрълом в разсуждени и ничего въ томъ невврояшнаго не вришся: ибо, понеже бользнь сія наипаче дътородныя части объемлеть, то по чему не можешь ядь вы семь родь заразы равномърно броситься на сіи части, какь и на другія? Вь самой даже общей Венерической бользни, когда ядь все штьло испортиль, являются ранки прежде вь дътородных в частиях в, по том в двиствует в оный на железы и на плотныя части твла; однакож в опустотенте не всегда берет в стю дорогу.

Изь встх в родовь заразы есть насладственная для излаченія неудобивищая, и я крайне сомивваюсь, чтобь руки человъческія въ состояніи были изкоренишь ядовишыя частицы, сь бы штемь купно произшедштя. Ръдко бывають шаковыя дъши долговъчны; ибо ядь, повсюду въ шълъ их в распространенный, дълаеть скорой конець краткой и бъдственной жизни их в, и плакимъ именно образомъ, что о причинъ долго сомнъваться не можно : поелику по смерши ихъ оказывается повреждение во внушреннихъ и наружныхъ частахъ. А естьли онв и состарьются, то препроведушъ только плачевную и немощами преисполненную жизнь, не вкусивь сладости здравія. Сколько должны родишели отвъчать за таковых в дъшей, скажеть имв собственная ихь совъсшь.

Однимъ словомъ, нъшъ заразительной бользни, которая бы столько къ разрушентю всего тъла способствовала, какъ Венерическая; есть, правда, нъкоторыя, кои сначала съ большимъ свиръпствомъ дъйствуютъ на тъло, нежели оная, однако разрушительная сила ихъ болъе ограничена; и не льзя почти ни одной именовать болъзни, которой бы стя болъзнь не въ состоянти была произвесть или принять по крайности видъ оныхъ.

Наконецъ долженъ я еще страстолюбцамь напомнить, что не вь томь еще состоить весь вредь, сею бользнію причиняемый; она не только повреждаеть тьло, но и душу; всякое доброе свойство оной премвняется въ мерзостный порокь, и споспъществуеть не токмо собственному ихъ паденію, но и учиняеть ихъ вредными членами человъческаго общества.



## TAABA V.

## О первой заразъ.

Гроложивь прежде къ тому путь, разсмотримь теперь продолженїе и савдствія сей бользни. Что разумъемъ мы подъ названиемъ заравы, явствуеть изв предследующей Главы; и такъ станемъ говорить о сабденивіяхь и дъйствіяхь оной.

Первая зараза можеть разнымь произойши образомь: 1) чрезь соите; 2) от в плотнаго частей прикосновенія; 3) ошь вшягиванія зараженнаго воздуха; 4) от в наследства. О каждой изв нихв буду я трактовать по порядку, и упоминать о тъхъ припадкахв, кои онв оказывають.

Зараза, от соит произмедшая, есть наивърнъйшая; и я осмълюсь утвердить, что не одна Венерическая бользнь посредствомь онаго разпложается, но что всякая другая

Часть II.

прилипчивая бользнь посредствомы онаго распространяется: но сте весьма мало въ жизни примычають, понеже мало находится таких варазь, которыя бы столь сильное оказывали дыстве, как венерическая; а ныкоторые случаи от замычанти наших ускользають, потому что вредь, ими причиняемый, не добольно примытень.

Первый припадокь, послъ нечиство соиття оказывающійся, есть злосвойственная гоноррея; отв оной произходять почти всъ другіе Венерическіе припадки, когда оная или не правильно врачуема, или отв нерадънія запущена будеть. Отв хорошаго познанія, какв св оною поступать надлежить, зависить и благополучное излъченіе почти всъхъ Венерических вользней.

## О гонорреи.

Два сущь рода гонорреи: одна злокатественная, другая добросвойственная. Первая произходить отв нечистаго соитія; въ такомъ случав обвемлются некоторыя части вь мочевомь каналь и испускають тноеватую матерію. Сія состоинь токмо въ изтечении съмени, отъ разслабленія съменных в хранилиць произходящаго. Злосвойственная гоноррея от Венерических в причинъ произходить, добросвойственная же другія причины основаніемь имѣть можеть. Различныя злосвойственной тонорреи перемѣны дадутъ намъ ясное объ ономъ понятіе. И такъ разсмотримъ оную въ разсужденти ея начала, продолженія, созрѣнія или достиженія высочайшей степени и умаленія до совершеннаго прекращенія оной.

Хошя оба пола оной подвержены, однако бывають признаки діагностическіе или разпознательные, и прогностическіе или предсказательные весьма вь оной различны; таковое различіе для благополучнаго уврачеванія непремънно въдать довлъеть.

Ибо-повеже строеніе дітородных в частей ві обоих различествуєть, то и припадки у объих в должны быть различны; почему и должны нікоторые из оных в быть общими, а другіе каждому из в оных в одному свойственными; далье из в сего явствуєть, что как в страждущія части болье или менье обнаженны, такожде и лікарственным средства могуть болье или менье не посредственно на оныя употреблены быть. И так в разсмотрим в напередь гоноррею, у мужщинь быть вающую.

О злосвойственной гонорреи лужщинб.

Протекаеть несколько времени послъ нечистаго соита прежде, нежели оная появляется. Иногда оказывается она ранье, иногда поэжь. Ръдко появляется прежде 24 часовь, и ръдко по прошестви 12 дней. Случается сте обыкновенно вы продолжени четырехь или шести дней.

Вь началь чувствуется вь двтородных в частях в пріятное щекотаніе; человько имбето необыкновенное къ соиштю побужденте; въ ядрахъ ощущается червообразное и пресмыкающееся движение, которое не непріяшно есть, и похоть къ совокупленію возбуждаеть: соитіе соверціаепіся съ необыкновенною силою и сь чрезвычайнымь удовольствиемь. Но удовольстве сте токмо кратковременно бываеть: ибо щекотаніе превращается мало по малу во ръзв; въ мочевомъ каналъ начинаетъ по малу изтекать влага, которая сперва воданиста бываеть, потомъ примътно густветь, и превращается наконець вь острую, вловонную, гною под бную матерію; отверзите мочеваго канала разверзается, дълается краснымъ и воспаленнымъ; моча причиняеть сперва при изтечении острое раздражение, но скоро послъ того дълается жгущею: теперь вы существовании гонорреи болье сомчьваться не можно. Сте есль токмо начало еной, которое в сравнени с тьмъ что слъдуеть, есть ничто, особливо когда больной молодь, горячь и кръпокь, и когда больные с в в первый разъ приключится.

Послъ сего плъшка воспаляется; моча чаще обыкновеннаго отдъляется и причиняеть въ мочевомъ стволъ жгущій жарь, а особливо вскорь по испущеніи оной. Сей жгущій ръзы такь усиливается, что больной начинаеть измънять черты лица своего; ръзь препятствуеть ему испускать свободно мочу, развътолько сы остановкою, что боль его чувствительно умножаеть. Таковый мочеръзь причиняеть обыкновенно лихорадку, которая, когда тъло хотя нъсколько кь остроть склонно, совершенный запорь мочи причиняеть.

Приключающаяся въ сте время встаниха недугъ увеличиваеть; мужескти члень часто напрягается, и сте не только противъ воли болящаго произходитъ; но и непртятнъйшимъ образомъ онъ накривляется внизъ, и

оте накривление чрезвычайно сильною болью сопровождаемо бываеть, которая оть плъшки до така простирается, и около уздочки наипаче ощущается.

Незалупа или неотплупа и шанкерЪ такожде обыкновенно присовомупляются. Невалипа дълается у тъхъ, кои длинную крайнюю кожицу имъють; сія вь семь случав такь воспаляется и опухаеть, что не шолько павшки обнажить не можно, но даже препятствуеть иногда и изтечению мочи. Неотлупа дълается у тьхь, кои короткую крайнюю кожицу имфють; оная заворачивается позадь плѣшки, будучи воспалена и опухла; она от воспалентя сужается и скрываетъ обыкновенно часть Венерическаго яда; стя передней кожицы опухоль и вожжение плъшки причиняють не токмо весьма сильныя боли, но угрожають иногда лишеніемъ мужескаго члена, и подвергають даже самую жизнь болящаго опасности. Что касается до шанкеровь,

то суть они обыкновенно вдийя влевредныя язвы, возжением в причиненныя.

ВЬ такомъ случать достигла гоноррея до высочайтей своей степеки; и больной борющійся съ вловонными и гноеподобными изтеченіями, со жгущею мочею, со встанихою, съ воспаленіемъ, танкерами и ш. д. имъетъ довольный случай къ разкаяийю о своемъ безуміи.

Доколь продолжится таковое состояние, именуется гоноррея новою; и доколь изтечение свободно будеть, язва не глубоко пребываеть и изтечение до истребления яда прекращено не будеть, то воспаление и другие припадки мало по малу уменьшатся, и бользнь сдълается легче; но естьли ядь вы другия мыста прогнаны и изтечение матери остановлено будеть прежде поправления яда, то послыдуеть то, что оный преселится вы смежныя части, какы сие часто оть простуды и т. д. и оть худаго сы бользнію обхожденія происходить. Оть сего рождаются паховики (bubones), или опухоль ядрь, или и то в другое вкупь, и тогда настоить время обезонасить кровь оть общаго уязвленія заразы. Совсьмы тьмы бываеть однакожь изключеніе, какь сіе посльяснье истолковано будеть.

КакЪ скоро сильные припадки нъсколько уменьшатся, а именно рано и поздно, смотря по твлосложенію больнаго и употребленному способу лъченія, що оказывается мъсто, гонорреею занимаемое, ясиће, и тогда можно предсказать: легкое, трудное или продолжительное потребно будеть лъчение; иногда бользны такъ легка бываеть, что изтечение матеріи безь употребленія цълитель. ныхв средствв уничтожается. Хотя сте иногда и случаения, однако не могу я не напомнишь, чтобъ въ такомв случав не совсымв полагалясь на натуру, но лучше, чтобъ быть совершенно увърену, что никакого болье яда вы шьль не осшалось,

продолжать нъкоторое время упот требление лъкарствъ; ибо никакаж болъзнь столько не обманчива, какъ сия.

Когда время уменьшенія идеть вы злосвойственной гонорреи надлежащимь образомь, то не долго остается до совершеннаго больнаго возстановленія. Лихорадка, возженіе и острое изтечение мочи по малу прекращаются; больной мочится свободнье и съ меньшею болью; изшекающая машерія, бывшая прежде острою, зловонною, съ кровью и сукровицею смішанною, становится гноеватою; она теряеть водянистый, кровавый, зеленый и темный видь, и получаеть бабдножеатой цвъть и большую густоту; дълается послъ того волокнистою, а наконець водянистою из мало по малу совстмъ изчезаеть.

Однако не всякая гоноррея оканчивается такь благополучно, хотя быона такь и окончилась, естьлибь употреблено было въ томь надлежажее стараніе и попеченіе. Безпорядки, меистовства, огорченія, страхв, сильныя работы, простуды и т. д. дълають вь семь великое различіе; но ни что не причиняеть столько вреда, какЪ неискусное съ бользнію обращеніе. Естьли мочертво, станиха или напряженіе члена и т. д. долве продолжаться будуть, шо дълается бользнь трудною и мажкою. Больной не можеть иногла ни мочиться, ни мочи вь себъ удерживать; а какь оная по каплямъ выходить, то причиняеть всякая капля жгущую боль. Напряжение мужескаго члена, на подобіе струны, воспаленною станихою сопровождается, а особливо приключается сте около ночи, когда больной начнешь въ посправ сограваться, и причиняеть иносда наисильнъйшія боли, кои ночными изліяніями съмени не мало увеличивающся.

Промежность междупроходная часто въ семь случав воспаляется и

покрывается язвами; шанкеры ужеличиваются и развъдають близь. лежащія части, наипаче около крайней плоши, плъшки, вънчика и уздочки находящіяся; крайняя плошь дълается иногда твердою, такв, что плышку обнажить, ни кв развыдаюшимъ язвамъ приступить не можно. Наконець случается, что весь мужескій члень покрывается язвами, и есть примъры, что совершенное помертвънје и отпаденје онаго послъдовало, и больной лишился отв того жизни. Однако во времена наши рѣдко шаковые примъры случающея; шъмъ болье находимь мы напрошивь того такіе, въ которых в изтеченіе машеріи долго продолжаешся, кошорое хотя обыкновенно добросвойственнымъ именуешся, однако оказываешся часто какь застарьлая злосвой твенная гоноррея, которая не токмо для больнаго шягосшна, но имвешь, когда запущена будеть, и вредныя послъдствія.

Теперь приступимь къ изъясневію причинь сихь припадковь. О обравъ происхожденія злосвойственной гонорреи имвли различныя мнвнія; мое мивніе обілявиль я уже выше сего, утверждая именко, что Венерической ядь вь мочевомь сиволь по изліяніи съмени, во время опаденія мужескаго члена, всасываешся. Но сїє не есть общее мивите, а думаютив, что ядв прежде снаружи прилъпляется, и послъ уже входить вь мочевый каналь; но я не могу повърить, чтобь сте всегда такъ случалось, хотя иногда и произойши можеть: ибо изв встхв, коихъ находиль я оною зараженными, не быль ни одинь, который бы не до конца совершилъ совокупленіе. Одинь увъряль меня, правда, что онв, опасаясь быть зараженну, пошому что женщина, съ которою онь имваю дваю, показалась ему подозришельною, вышащиль двшородный члень при приближающемся изліяній съмени, и пролиль оное вь довольномь уже оть женщины

разстояній, и не смотря на то получиль весьма злосвойственную гоноррею: я не хочу оспорявать истинны дьла сего, однако въроятнымы кажется, что оный допустиль вы первый разы вышечь съмени вы маточномы влагалиць, и оты того заразился, и что облъпление яда около мужескато члена довольно было подкръпить заразу.

Какимъ бы образомъ зараза ни происходила, от настоящаго ли мочеваго ствола всасыванія, или проходить ядь сквозь внётнюю кожицу въ печуристыя тела, а оттуда уже въ мочевый каналь, однако то вёрно, что какъ скоро ядъ прилънеть къ мочевому стволу, то послёдуетъ гоноррея, которая смотря по занимаемому оной мъсту съ большимъ или меньшимъ трудомъ отвращается.

Гоноррея имфеть обыкновенно гнъздо свое не болъе двухь дюймовь отв плъшки, и находится по больтей части въ нижней поверхности мочеваго канала: но иногда имбетв она тнбздо свое выше, хотя сте и редко случается. Но отв чего происходитв то, что иногда весь мочевый стволь бываетв изранень? Сте очень редко или и никогда отв первой заразы или вв началь гонорреи не происходить, но рождается или отв распространентя яда отв частых напряжентй, изліянти съмени и отв последовавшаго отв того ослабънтя мужескаго члена, или отв вредных вв мочевый стволь впрыскиванти.

Не излишне будеть вдъсь повторить нъчто о натуръ яда. Нъкоторые сравняли оный съ соляными частями Шпанскихъ мухъ; сколь сте основательно, о томъ сказаль я уже выше, а теперь прибавлю еще только то, что съ равною основательносттю утвердить можно, что ень имъеть нъкоторое сходство съ остротою Каянскаго перца. Но какъ могли приписать Венерическому яду и Шпанскимъ мухамъ соляное свойство, я не понимаю, развъ употребдено здъсь слово соль вмъсто остроты.

Лукв и ховнь двиствують сильно на обоняшельные нервы, и единыя испаренія оных визвлекають слезы и причиняють особенное раздражение вь свіжей рань; естьли разсмотримь далье всв острыя раздражительныя вещи: соли, кислоты, щелочныя, ъдкія, нарывныя, чихательныя и т. д. то найдемь, что онв всв вообще оказывають мгновенно дъйствіе свое при прикосновеній кв нервамв и другимъ частямь, и чию дъйствіе оных в мало по малу слабъеть; когда напрошивь того Венерической ядь авиствуеть сначала медленно, а послъ раздражение свое увеличиваетъ. И такъ естьми котимъ сдълать съ нимъ какое либо сравнение, то есть сіе сравненіе дъйствія, какое имъеть онь на железы мочеваго канала, съ дыйствиемь, оказываемымь риутью на слиноточивыя железы; ибо такъ какъ отуть, въ тъло посредствомъ тренія запущенная, находить путь кь слиноточивымь железамь, то можеть и снаружи вдохновенный ядь найти дорогу кь железамь мочеваго канала. Обратимся теперь кь продолженію гонорреи.

Изъ ощущенія пресмыкающагося вь ядрахь движенія заключили, что онъ и прочія съменныя орудія съ самаго начала поражаются; хотя сїе иногда произойши можешь, однако я далеко удалень от в того, чтобь въришь, что сте навсегда такъ бываеть. Напротивь того думаю я, что таковое опущение единсивенно отв плотнаго встхв сихв частей соединенія происходить. Равнымь обс разомь происходить и возбуждение кь частому соитію: сїе тьмь истолковать можно, что поелику ядь начнеть большее причинять раздраженіе, то и съменныя орудія кЪ частому отделению возбуждаются.

Съ сего времени начинаетъ ядъ дъйствовать на волокна; онв разрушаеть маленькіе сосудцы, которые побуждающся отв того отделять болъе мокропы; мочевый сшволь дълаешся мокрымь; сперва ошдъляешь оный водянистую влагу и гоноррея вь самомь дыль появляется. Части болье воспаляющся и объявящся язвами, ядь усиливается и распространяется по лежащимь частямь; стесостояние сходствуеть сь уязвлениями, огнемь, Шланскими мухами и Вакими средствами причиненными. Распространение возжения и рань происходить не столько оть количества воспріятаго яда, какв паче отво раздраженія, онымъ причиненнаго. Разные завалы, кои онв произвесть. вь состояни, распространяють инотда воспаление по другимъ частямъ; сте приключается часто въ первой степени гонорреи; от в чего начина. ють железы опухать; подвемлющіх мышки раздражаются и причиняють напряжение мужескаго члена; судорожное дъйствие сихъ мускуловъ рожа даеть приапизмъ, о которомъ будемъ имъть случай говорить болъе.

Вообще бывает в первое раздраженте, дъйствующее на тъло наше, сильнъе, нежели въ послъдствти бывающее; отсюду явствует в, для чего люди, первый разъ гонорреею одержимые, сильнъйшую претерпъвають боль, нежели тъ, кои уже нъсколько разъ оную имъли; такожде не въроятно есть и то, что упругость волоконъ у таковыхъ сильнъе бываетъ, и что оныя не такъ легко уступаютъ.

Когда гоноррея имбеть мъстопребывание свое впереди мочеваго
канала, по ясно видно, что оная
удобнье отвращена быть можеть,
нежели когда оная далье къ корню
находится. Чъмъ ближе оная къ
шейкъ мочеваго пузыря, тъмъ она
опаснъе, и сте не токмо по тому,
что она благороднъйшую часть объем-

леть, но по тому, что тогда страждущія части далеко отдалены, и слъдственно абкарственныя средства не такъ удобно достигають. Того ради гоноррея, имъющая гивздо свое близь съменной железы и сжимательных почеваго пузыря мышекв, не только труднве отвращается, но и шяжчайшими сопровождаема бываешь припадками; а особливо, которая близь пътушей головки и съменных в хранилиць находишся, которая обыкновенно великую слабосны въ сихъ частяхь оставляеть, и подаеть чрезъ то поводъ къ продолжительному теченію семени. Ръдко гивздишся гоноррея, как в я уже сказаль, очень высоко; но от распространенія язлинь дълаются иногда по всему стволу язвы, от чего рождаются разныя бородавки или норы и окръплыя язвы, кои могушь подать случай къ продолжительному лъченію, и даже ко неизлачимому злосвойственному изтеченію.

Доколь гивздо гонорреи находишся промежду плѣшки и шака, и оная надлежащимь образомь лачима будеть, чтобь далве не распространалась, то припадки вь скоромь времени прекратится: ибо натура всегда печется о изверженій вреднаго существа. И такъ какъ скоро маленькія мокротныя мочеваго канала железки извергнушь ядь или нагное ніемь, наи авшишся оный ошь употребленных в средствь своей злосвой ственности, то вознаграждаются раздранные сосуды сихв железокв, и часть стя получаеть паки прежнее свое состояніе.

Естьли ядь напрошивь того глубоко вы мочевомы стволь вкоренится, такы, что маленькие сосудцы существа онаго воспалить и причинить опухоль, то, дыствуя на чувственныя жилы, сокращаеть оны купно и ть части; а какы оныя во время востания мужескаго члена болье прежняго напрягаются, то должны онь причинить судорожную боль, кото-

C 3

рая отв напряженія частей на подобіє натянутой струны, струного или хордого именуется. Естьли объемлеть ядь сукровичные сосуды внышней кожи, и раздражаеть чувственныя жилы и мясистыя волокна, то послъдують незалупа и неотлупа.

Естьми пречесется ядь многими сукровичными сосудами вы паховыя железы, то сдылается вы одной изы оныхы или вы обыхы бубонь или паховикы. А естьми направить яды путь свой по относящимы съменнымы сосудамы, то произойдеть hernia husmoralis, или опухоль вы ядрахы. А естьми найдеть оны наконець дорогу вы кровь или поселится вы другой части, то суть слыдствия того явны.

Ядъ устремляется въ гоноррен часто вверьхъ къ шейкъ мочеваго пувыря и объемлеть орудія, непосредственно къ родотворенію служащи, и оть того дълается случай важнье. Ковперовы железы, лежа-

щія не подалеку от съменной железы, очень часто оным в заражаются; а какъ онъ для отдъленія своего болье имьють времени, нежели маленькія мочеваго сшвола железки, то и матерія капаеть изв оныхв медленнее и болте портится. Естьли же возгивадишся гоноррея во съменной железь, которая наипревосходнь шую часть дьтородных в орудій составляеть, то бывають следствія пого еще хуже, и я опасаюсь, что съмя потеряеть тогда плодел ворную свою силу. Ибо, понеже относящие съменные сосуды проходять частію сквозь стю железу и понеже во оной безъ сомивнія ньчто получають, то легко статься можеть, что получать они и нъсколько яду, который сообщать посль съменным в хранилищам в.

Гоноррея сего рода пребуеть есторожнаго врачеванія: ибо оканчивается она весьма часто не полько упорнымъ съменошеченіемъ, которато часто и наискуснъйшіе отвратить не въ состояніи, но причиняеть иногда и язву въ шакъ; сколь трудно шаковую залъчить, знають наилучше тъ, кои подобные случан имъли: а какъ я въ семъ весьма счастливъ былъ, то объявлю въ своемъ мъстъ способъ, мною въ семъ случаъ употребленный.

Столько же трудная и неудобоврачуемая происходить гоноррея, когла ядь объемлеть пътушью голову, коея строечте описано вы первой Части: ибо легко понять можно, что когда ста часть замыкающая съменныя хранилища разрушится, то неизлъчимое съменотеченте должно быть того слъдствтемь даже и тогда, когда ядь силу свою потеряеть.

Естьми объемленть ядь сжимательную мочеваго пузыря мышку, то будеть сте для сей части очень вредно: ибо причиняеть тогда не только запорь мочи, но оставляеть по себь обыкновенно неудерживанте мочи, которое по кратней мерь до твяь порь продолжается, пока мучать волокна прежнюю ихь силу, Ньть боли, которая бы столь сильна была, какь воспалентемь шейки мочеваго пузыря причиненная, особливо когда бываеть оно Венерическаго рода.

Я описаль продолжение гонорреи ясности ради нъсколько обстоятельно; но, дабы не причинить скужи, поспъщу къ окончанию.

## оглеэтѣ,

## или

О изтегении влажности, послъ злуч свойственной гонорреи оставшейся.

Подъ именемъ gleet разумъють въ Ангаїи обыкновенно измеченіе влажности, которая остается посль злосьойственной гонорреи, и которая отъ слабости бывшихъ зараженныхъ частей происходить. Естьли то такъ, то не имъсть она худыхъ слъдствій: ибо тогда происходить она единственно отъ маленькихъ сосудчасть 11.

цовь, такь какь сте во встхв язвахь бываеть, пока не замкнутся совершенно устья оныхв. Когда гоноррея тибздилась шолько въ мокрошныхъ мочеваго ствола железахв, то печеніе сіе скоро прекратишся: ибо, когда онъ не будушь раздражаемы, то дадушь ошь себя шекмо мало влажности; но сте теченте долье продолжишся, когда гнъздо гонореи далте въ мочевомъ каналъ находилось, а именно: въ ковперовыхъ железахв, въ съменной железъ, а особливо около пътушей головки; наипродолжительнъе же когда въ оной съменныя хранилища и ш. д. прешерпъради.

Но когда бы при семь изшечении всегда таковый быль случай, то не произошло бы от того никакихы худыхь слъдстви. Я говорю здъсь не о съменотечени, но о оставшемся течени злосвойственной гонорреи, которое не причиняеть больному особенной боли, и которое вы самомы дъль от новопроизшедшей гонорреи

ничьмы какы только припадками воспаленія разнится, и тьмы, что яды лишился раздражительной своей силы и частямы сообразные учинился. Вы такомы положеній находится изтеченіе, пока имыеты оно нычто гноеподобное.

Завсь можно савлань вопрось, есть ли сего рода измечение, которое никакими злыми припаджами, ни сжентемь во время испущентя мочи, ни різомі ві мочевомі стволі, ня паховиками и ш. д. не сопровождается, естьли оно заразительно? Я отвътствую на сїе, то оно точно заразительно, св штыв только различиемв, что какь ядь вь сте время не сполько уже злосвойствень, то и заражение не столько бываеть общественно. Естьли же со всъмъ шьмь человьки, шаковымь шеченіемь одержимый, совокупится св женщиною, къ которой онъ не привыкъ, и у которой детородныя части узки и нъжны, и от в того изранению

получить злосвойственную гоноррею. Женщина, кь объятиямь его привыкшая, не такь скоро заразится, поелику части ихь однъ кь другимы привычны суть. Однако ни поды какимы видомы не льзя положиться на изтечение, которое хотя наимальйте гноевато, и больной не можеть ни вы разсуждени себя, ни заражения совершенно увържны быть.

Истинное остальное течение можно назвать совершенно невинным в когда оно прозрачно, слизко и волокнисто; оное искусным в пользованием в скоро истребить ножно: но когда оно запущено будет в, удобно может в учиниться опять злосвойственным в.

Вь разсуждени остальнаго течения, а наиначе гноеватого, должно еще замътить, что оное за источникь или фонтанель почитать надлежить. Извъстно, что фонтанели сь осторожности зальчивать должног ибо какъ нашура пріобыкла испражняшь в семь мъсть матерію, то ньшь никакого сомньнія, что и вь семь случав отделяется некоторая острота, которая, естьли не будеть прежде залъчения поправлена, можеть для крови или другихь частей, въ которыя она кинется, быть вредишельною. Я весьма удаленъ ошь того, чтобь выхвалянь источники, какого бы рода они ни были и вь какомь бы случав учинены не были, поелику швердо увърень, что состояніе тъла лучше бываеть безь оныхь, чъмь съ оными. Но естьли они или отъ Наптуры или чрезъ Искусство уже существують, а особливо когда уже нъкоторое время существовали, то думаю, что лучше оставить ихв отверятыми, нежели оныя зальчить, развъ когда ъдкје соки ихъ прежде исправлены будуть и кровь отв дъйствія ихв обезопасится. Что сів есть весьма важное правило въ разсуждении здравія и самой даже жизни, въ шомь увбрили меня худыя след-

T 3

ствія, кой видьав я ств худаго св оными обхожденія произмедшими.

Больной, одержимый остальным в течентемь, очень мало печется обвономь и ръдко требуеть вы семь влучат помощи Врача. Но что надлежить до меня, то лучте соглатусь я взять на себя лъчете десяти новопроизтедтих в злоскойственных в гоноррей, чъмы пользовать долго продолжавшееся остальное теченте. Оно происходить иногда отв такой причины, которой не опасаеться Хотя и можно оное прекратить, однако надлежить взять тогда осторожность, чтобь уняттемь онаго не причинить еще больших взоль.

Объявивши мивиїе свое о нашуръ злосвойственной и доброкачественной гонорреи, или продолжительнаго остальнаго теченїя, разсмотрю я теперь вопросъ, о которомъ естествословы еще и по сїє время спорять, а именно: на плотныя или на жидкїя части дъйствуеть Венерической ядь?

Но дабы учинишь сїє надлежащимъ образомъ, то довлъетъ знать, что плотныя и жидкія части такв между собою сплешены, что сосшавляють, кажется, продолжение одно другаго; сїє наипаче примъщно въ человькъ въ то время, когда онъ или очень худь, или очень жирень. Вь одно время находимъ мы, что ядь на одномь мысть находится, и что посредствомъ яззотворнаго его свойства дъйствуеть на плотныя части. Вь другое время находимъ оный въ другомъ мъснів міновенно поселившимся, гдв онв св великою жестокостью свиръпствуеть. Вообще думающь, что сіе скорое преселеніе чрезь сукровичные или кровавые сосуды происходишь: но можно напро. шивь того возразить, что ломошная и простудная острота скоръе изъ одной части вь другую переселишься можеть, нежели какь то чрезь круговращение крови возможно; сіе и со вкоренившеюся Венерическою боавзнію часто случается. Того радя

1 4

думаю я, что таковому переселентю нервы содъйствують. Далье извъстно, что острота раздражает в плотныя части, и что въ движение приведенныя плошныя часши сообщають остроту находящимся во оныхо сокамв, такв, что онъ равную другв надь другомь имъюшь силу, такь какь и дъйствіе и противодъйствіе оных в находится въ равновъсти. Изъ сего заключаю я, что ядь способень и на ть и на другія части оказывать свое дъйствіе, что однъ других варазить могуть, и что оный изъ одной части тъла въ другую не токмо жидкими, но и плотными частями, а особливо нервами перенесень бышь можеть.

Но заражено ли мужеское сѣмя въ злосвойственной гоннореи? сте зависитъ отъ степени бользни. Въ первой степени, когда воспалительные припадки сильнъе бываютъ, опасаюсь я, что не полько сѣмя, но и все тѣло болъе или менъе заражено ядомъ: ибо отъ чего бы инаково

произошли лихорадка, трудное испряженіе мочи и другіе припадки? Но как в скоро послъдует в теченте, по ядъ мало по малу купно выходишь и припадки уменьшаются. То върно, что съмя въ высочаншей гонорреи степени цвъть свой перемъняеть и желтоватый видь имъеть; почему и не сомнъваюсь я, что оное заражено, что хотя оно и удерживаеть плодотворную силу и кв зачатію способно, но младенець принесеть на свыть купно сь собою и Венерическую бользнь. Равнымъ образомь происходить сїе, когда гоноррея гивадится вы съменной железв, или вь съменных в хранилищахъ. Но когда пребываеть она впереди мочеваго сшвола, що остается съмя невараженным в. Хотя и есть сте такое невоздержаніе, котпорому разумный мужъ не долженъ бы подвергать себя, однако есть примъры, что отцы, одержимые чрезъ нъсколько лъшь остальнымъ шеченіемъ, и даже гноевашымь, производили на свыть здо-

ровых дъщей. Но должно сказащь . что такозые примъры обаки, и что чаще случается, что таковые разпространяють бользнь на дътей своих1: ибо во время изліянія, какь бы съмя чисто ни было, инаково не возможно, какъ должно оно захвашишь ивсполько гноя ошь гивада гонорреи; а когда гной имветь еще вы себь насколько злосвойственности, що сущь сабдешвія онаго явны; естьли же онв менье дыйствителень, то можеть натура, которая всегда старается удалить отв себя вредное, одержать верьхв и возпротивишься входу онаго.

Не нужно почти напоминать, когда уже самый разумь нась научаеть, что испражнение мочи прежде соитя дълаеть съмя чище, нежели бы оно безь того было; и естьли тогда остальное течение не злосвойственно и мужь и жена другь къ другу привыкли, то менье имъется опасности. Однакожь всего лучте будеть повоздержаться до совершеннаго изцъления.

Весьма ошибаются тв, кои утверждають, что изпечение вь гон орреи и остальное изпечение не что иное есшь, какЪ зараженное съмя: ибо, когда ядь не вь съменныхъ орудіяхь, то есть не въ съменной железь, не вы относящихы съменных в сосудах в не в в съменных в хранилищахь водворяемся, то имъетъ съмя столь же мало участія въ изтекающей шатеріи, какв и слина. А что матерія часто изпражняется, тому также дивиться не должно, какъ и не трудно понять: ибо гоноррея не что иное есть, какЪ чирей или язва, Венерическимъ ядомъ въ мочевомь стволь произведенная; а всякая язва ощубляеть болбе или менье влажности, смотря по раздраженію одержимой части, и по железистому роду оной. Какимъ образомь сте происходишь, покажу въ другомъ случав.

При остальном изтечени остается еще замътить одно обстоятельство, а именно: поелику молодой человъкъ скоръе получаетъ гоноррею и бол ве припадками онсй страдаеть, нежели старой, имъвшій оную уже нъсколько разв, то имъется и вв разсужденій пользованія великое различіе : ибо у того удобнъе отвращается, естьли только хорошо пользована будеть, нежели у сего; сте происходить по той же причинь, по какой лъчение застарълых в язв , снова открывшихся, бываеть трудно. Примѣчанія достойно то, что гоноррея всегда занимаеть опять то мъсто, гдъ была прежде; и чъмъ чаще язва открывается, тъмъ труднъе должно быть излъчение оной: къ сему присовокупляется еще, что гоноррея занимаеть кромъ стараго еще новое мъсто, и причиняеть чрезь то новые соединенные припадки. Однако имъются и вы семы случат изключенія: ибо ничто такъ не споспъщ ствуеть скорому излъченію, какв хорошее твлосложение, естьли только въ пользованіи надлежащимь образомь поступлено будеть.

Накоторые писатели, особливо Аструкь, упоминають еще о другихь родахь гонорреи, кои называюшь они ложными, на пр. изпеченія матеріи на внішней части пльшки; но которое по моему мизнію принадлежишь къ шанкерамь, о коих в будем в мы говорить в в своем в мысть. Такожде упоминающь и о сухой гонорреи, то есть, когда по прекращеніи матеріи останется при мочеиспусканіи разв; но сіе есть явственно дизурія или задержаніе мочи. Но тогда можемъ мы почесть оную нъкоторым в родом в сухой гонорреи, когда она, будучи въ течении своемъ воспренятствована, переселишся или въ паховыя железы или вь ядра и въ другія какія либо части, и по нъкоторомъ времени новое окажения шечение. Однако при сей остановкъ совсъмъ не нужно старапься поддерживать теченіе, какЪ нъкоторые тщательно присовътывають: ибо изв опытовь извъстно, что сте не всегда удобно произвесни

можно, и что больной часто безъ подобнаго возврату выздоравливаеть; а какъ скоро заживуть части въ мочевомь стволь, то и ядь равномърно испражняется. Произтедтй въ сихъ обстоятельствахъ паховикъ довольно еще скоро излъчивается; но когда ядъ воспрепятствованной течи переселится въ ядра, то бываеть лъчене иногда добольно упорно, а иногда переселяется задерженной ядъ въ самые глаза, какъ я самъ видълъ таковый опыть.

Естьли остановленная течь сопровождаема будеть мочерьзомы или пріапизмомь, то будеть сіє въроятнымь знакомь, что язвы вы мочеточномь стволь еще отверзты суть, и что ядь единственно по причинь вогнанной внутрь матеріи ненадлежащ й воспріяль путь Вы таковомы случаь надлежить стараться о произведеніи новаго изтеченія. А естьли остановленію оной никакихы не послъдуеть припадковь, то въроятно, что язвы оныя зажили, и тогда должно стараться разбивать ядь инымъ образомъ.

Я не думаю, чтобъ нашлось еще такое, о котором в бы въ разсужденій гоноррей и последующей шечи достойно было здесь упомянуть; почему и приступаю къ описанію добросвойственной гонорови, не смонгря на то, что оное при объяснении Венерических вользней обыкновенно оставляется. Но поелику влоснойственная гоноррея можеть нодать и къ произшествію оной поводь; и почеже оная есть такая бользнь, которая не менье труднаго. какь и оная, эпребуенть врачевантя: то я не только оную, здъсь опишу, но и объяваю во своемь месть для уврачеванія оной основанный на опывів и благополучнымі успахомі уванный способь авченія.

RESOLUTION

О простой или добросвойственной гоноррен.

Слъдуя первоначальному означенію слова, гоноррея, легко можетъ пришти всякому на мысль, что сначала подв симв названјемв стменотетение разумъли; на сте опираются тъ, кои ушверждають, что Венерической ядь перевезень кь намь оть иностранных в. Но когда новъйшие Врачи приняли злосвойственную течь за испорченное съмя, которая однакожь не что иное есть, какъ влосвойственная гноеватая матерія, то не должно удивляться, что древніе, кои еще менте нась вы семь даль разумъли, вы семь заблуждении пребывали.

Добросвойственная гоноррея можеть произойти или отв гонорреи злосвойственной, или безмърнаго любострастія, или отв онаніи или и отв другихь бользней. Ощь кажой бы она ни произошла причины,

однако нътъ такой бользни, которая бы столько и так' постепенно извлекала жизченную эссенцію и силу изъ штла нашего, какъ сія самая, когда сна долго продолжится. Что надлежить до гонорреи, Венерическимь ядомь причиненной, то мы уже прежде довольно объ оной говорили, а именно: когда ядо съменную железу, пъщушью головку, относящіе сосуды и съменныя хранилища объемлеть, а сверьхв того и любострастная опухоль янчекъ можентъ подобную произвесть течь. Какая бы ни была тому причина, однако дълаюшся въ сихъ частяхъ или язвы или родв онвивнія; почему и свареніе съмени происходишь не надле-жащимь образомь, равно не надлежащимъ образомъ сохраняется, и сь ненадлежащею силою выпрыски. вается.

Истинное съменотечение от гонорреи злосвойственной и въ обыкновение пришедшей послъдующей Часть II. У

шечи удобно отличить можно. Она ни съ какою не сопряжена болью, выключая непріяшной слабосши и нъкоторой чувствищельности въ шейкъ мочеваго пузыоя и въ нахахъ; съмя выходить непримъшно и по малу, а особливо при испражненти отв употребляемой для изверженія нечистоты силы. Стволь часто напрягается, но сте дълается не съ шакимь огнемь, какь обыкновенно; съмя скоро выпрыскиваенися, но не сь такою силою, каковая петребна для оплодошворенія; будучи прежде бъло, полупрозрачно и густовато, становится оно теперь воданистымь, жидкимъ и синевашымъ.

Вь началь бользии дълается сильное побужденте къ напряжентю члена, и изліянте съмени бываеть, кажется, нъкоторымъ удовольствтемъ послъдуемо; но мало по малу мужескти членъ власно какъ нъмъеть, такъ что онъ ни слабъ, ни нанряженъ бываетъ и висить внизъ

безчувственно; ядра опускаются ниже обыкновеннаго и бывають тому человъку вь тягость, естьли не будушь поддержены удобною подвязкою; мало по малу появляется боль въ бедрахь и въ поясницъ около съдальной кости, которая вь скоромь времени простирается далье вверьхв; икры примъшно тоньють; глаза впадають и далаются шажкими; все шьло изсыхаешь; человькь начинаешь имъть къ женщинамъ и ко всъмъ вещамь омеравніе, вы коихы находиль онь пржде свое удовольствие; медленная лихорадка появляения, которая сначала продолжительною болью вь поясниць, которая вь посабденвій голову, грудь и внутренности объемлеть, и изсущентемь и повсем встною слабостью твла сопровождаема бываеть и наконець чахотною дълзется.

Естьли больной съ самаго начала будеть искать помощи и послъдуеть предписаніямъ Врача, мо еще не трудно помочь ему; но естьми онъ бользнь свою ими отъ стыдливости ими отъ нерадънія запустить, то часто не въ нашихъ уже состоить силахъ поправить разслабленное его тълосложеніе.

Что сія бользнь бываеть иногда слъдствіемь злоскойственной гонорреи, о томъ уже выше сего упомянуто; но чаще всего приключается она от излишняго любострастія, когда сверьх в натуры великое усиліе употреблено было. Однакожь излишество въ соитіи не столько спсобно причинить сте зло, как самопроизводныя изліянія съмени. Я почитаю за излишнее говоришь много о семь противоестественномь двав, поелику самая уже совћешь довольно таковых в людей укоряеть. Но какв пемогать намь вы томь случав. когда больной преступленія сего стыдишся и исповъдащь не дерзаешь; а естьли наконець и признается, однако никакими представленіями отвращить его от того не можно?

Бывають такожде въкоторыя и случайныя причины, кои вы состояніи произвесть саменошеченіе, какъ на примърв: скорое подвати бремени или и другаго рода усилія; слишкомъ сильное потвыте, сильное жиленье во время испражненія, горячія промывательныя, крыпкія мочегонительныя, испорченные бродящіе напишки, конвульсти, пьянство, наипаче же оныя споспъществують оныя къ тому, когда съменныя хранилища съменемъ преисполненны, произведя вь оныхь грыжу. Ночныя изліянія, кои или съ грезой сопряженны или и безь оной, могуть подать поводь къ съменошеченію. Наступающее изліяніе, будучи или во снв или во время бавнія воспрепятствовано, столько же способно причинить съменотеченіе, какв и всв изв преждепомянушых в причинь.

Отв чего таковыя съменотечение имъеть слъдствия, можно удобно понять изв слъдующаго: пселику съмя есть сокв, заключающий вв себъ наи

тончайшія части крови и наилучшее питаніе, то сл'ядовательно должно оно поминушно, истощаясь, дополнять количество свое наитончайшими питательного сока частирами, и что отв того безпорядокь вы неовахь произойши должень, пошому что оные мало питанія получающь. А понеже вь семь случав наппервыя двшородныя часни страждуть, которыя нервы свои от в слиннаго мозжечка, отв надвершлюжнаго нерва, отв скитающейся двоицы и лошадинаго хвоста, оть креспиовой кости происходящаго получають, то удобно изъ сего явствуеть, что бываеть причиною боли и слабости въ бедрахъ, и ошв чего изсучийе слины tabes dorfales) и на конець ловсемъстная сухотка должны воспоследовать.

Возмемъ теперь въ разсужденте продолженте съменотечентя. Дътородо ныя части находятся въ точномъ и симпатическомъ между собою соединенти, такъ, что когда одна частъ

стражденть, то и прочія берунть вы том участіе; одчако орудія, къ приготовленію съмени служащія, большую предв другими имвють силу: ядра, кои источникомъ съмени почесться могуть, суть наипревосходнъйшія изв оныхв; и такв естьли оныя отв прочихв отделены будушв, то и судорожныя отделенія, сжатія, удовольствіе и желаніе изчезнуть; почему и бывають кастраты къ любострастію и другимь мужественнымь страстямь не способны супь: ибо они не имъюшъ съмени, и съменныя хранилища хотя и существують, но онь будучи безь упопребленія изсохли. Когда же напрстивь того съменныя хранилища наполнены, то дътородный члень всегда готовь кь напряженію; а какь скоро напряжение онаго будешь происходишь часто, що легко вообразить можно, что мышечныя волокна лишатся мало по малу своей упругости. Понеже съменныя хранилища безпрестанно лишающся съмени, то

и имъется въ оныхъ наклонность снова наполняться; от в безпрестаннаго оных в опустошения происходишт и безпрестанное всасывание другими словами: гдв находишся изпражненіе, тамв и отделеніе (вестей) существовать долженствуеть. Отв чего отделяющія семенныя орудія, съменные сосуды, яичные барышки и оосуды яичные от в безпрерывнаго къ рабошъ побуждения теряють свою силу, становятся слабыми и длиннъе прежняго; а отъ разслабленія съменных в п отдъляющих в сосудовь, служащих в поддержанію ядов, и отв слабости подвемлющей мышки, ядра опускающся и становятся тому человьку въ шагосив. Опдвляющие сосуды, пътушья головка и ш. д. также разслабляются, и будучи не въ состояніи держать во себв съмя, выпускають оное прежде, нежели наполняшся, въ мочевой каналь. Мышки детпороднаго члена также лишаются сьоей силы, отв чего следуетв весьма слабое члена напряженіе; а жакь въ слъдствіе сей же причины сила печуристыхъ тъль онаго весьма уменьшается, то произходить, что мужескій члечь ни совершенно слабъеть, ни надлежащимъ образомы напрягается.

Наконець когда наилучшёе соки изъ прочихъ жидкостей тъла вытянуты будуть: то повсюдная слабость во всемъ тълъ разпространится, и лихорадка, послъднее усилёе натуры, сёе зрълище окончитъ.

Изъ сего описанія явствуєть основательность льченія, которое объявлено будеть вь своемь мьсть, и которое имья великое от злосвойственной гонорреи различіе, также и въ льченіи онаго имьть долженствуєть отличность. Разсмотря различныя степени гонорреи, у мужщинъ случающейся, разсмотримь теперь различныя степени гонорреи женской.

Часть II.

O злосвойственной гонорреи, слугающейся у женщинд.

Что между гивздомв и припадками гонорреи мужеской и женской примътное имвешся различіе, довольно извъсшно; а въ чемъ именно состоить сте различте, теперь разсмотримь. Такь какь у мужщинь мочевый каналь бываешь главнъйшимъ гнъздомъ сей болъзни, то бываеть сте у женщинь мат чное влагалище, которое въ скоромъ времени сообщаеть оную всей срамоть. Начальные припадки сходствують съ тъми, кои бывають у мужщинь, съ шемь только различиемь, что они скорбе оказывающся, и воспаление ръдко до такъ высокой степени достигаеть. Сте удобно изъяснить можно: ибо вопервых всупь волокна ихъ нъжнъе, ошъ чего и припадки скоръе появляются; а вовторых в суть волокна ихв слабъе, и отв того скоове уступають и воспаление скорве проходить; но напрошивь того бываеть изтечение по помянутымь причинамь сплынье.

Я замьшиль выше, что припадки гонорреи у особы, оною вы
первый разы страждущей, сильные
бывають, а сте замычанте еще болые
относится кы женскому полу: ибо
молодая женщина, оную вы первый
разы получившая, весьма много претерпываеть; напротивы того уже сы
сею болынтю знакомая особа едва оную
примычаеть, и то по другимы припадкамы и по сообщентю яда другимы.

Вообще оказывается сія бользнь следующимь образомь: на другой, третій или четвертый день после заразы чувствуєть больная отв раздраженія яда побужденіе къ сонтію, но сіе раздраженіе скоро пременяется въ боль; она ощущаєть въ маточномь влагалищь колючую и вяжущую боль, такъ что при сонтіи великое претерпъваєть неудобство: ибо маточное влагалище изранено, оть воспаленія сжато и обьято опу-

Ф 2

холью. Отв сего раздраженія женскій члень также напрягается, и дътороднаго уда губы, нимфы и миртообразныя мясца опухають, и суть также какь вь пріапизмъ у мужщино язвинами и болью объящы. Моча дълается жигучею и причиняеть рьзь, особливо по испущении оной, такъ что больная страшится мочиться, но не смотгря на то, принуждена бываеть дълать оное чаще обыкновеннаго. Она чувствуеть вяжущее и бользненное ощущенте въ подчревіи, которое от Венериной торы вверьх в простирается, и червообразными движеніями въ лонныхъ частяхь и нъкоторою непріятною болью въ поясницъ поперегъ крестцовой кости сопровождается, которая отв раздраженія ядомв женскаго уда, сообщактаго оное широкимъ перевязкамь, и отв раздраженных матки и яичниковъ происходить. Изтеченіе бываеть вь началь сукровично или слизисто; вскоръ послъ того становишся оно водянистымв, ъдкимв, эловонным в и кровавым в за наконецв из текает в темножелтый, эловонный, во многом в количеств в испражняемый гной, который иногда зеленовать бываеть.

Ежели гоноррея есть обыкновеннаго рода и изтечению оной не будеть воспрепятствовано, то сіи
сильные припадки вскорь уменьшаются; воспаленіе, сжатіе маточнаго
влагалища, мочерьзь, опухоль срамоты и судорожныя напряженія женскаго уда и маточныхь связокь мало
по малу прекращаются; и естьли
надлежащія средства употреблены
будуть, то гноеватое изтеченіе
сдълается по малу бълымь и слизистымь, по томь прозрачнымь и
волокнистымь и наконець изчезнеть.

Гоноррея имветь обыкновенно пребывание свое вы мокротных в железахы маточнаго рукава, а иногда садится яды около сжимательной мочеваго пузыря мышки, или вы желемахы, женской уды окружающихы;

Ф 3

въ иное время объемлетъ ядъ Ковперовы железы, около така лежащія. Гивадо оной не причиняеть особеннаго различія, естьли можно достигнуть до онаго безь препатствія; а естьми водворится сный вЪ матночномъ рыльнь и анупри онаго, то есть сте наинеудобивищее мъсто, посляку вы шаком случав достать оное не можно и сабдовательно истребить сный не удобно. А что гоноррея имветь мъстопребывание свое во внуптренносити машки, можно узнать по сильному сженію и колотью, въ оной ощущаемому, и по эловонному, сукровичному и кровавому необыкновенно сильному изшеченію, оное сопровождающему.

Женщины бывають обыкновенно болье подвержены шанкерамь, нежели мужщины; понеже изтечение бываєть у нихь гораздо сильные, а особливо когда не наблюдають чисты: однако ихь при надлежащемь врачевании удобно зальчить

можно. Напрошивъ того дълаетъ пребывание оных в в семь примътное различие. Язвы на женском удъ, въ маточномъ рыльцъ, въ миртообразных в мясцах в и в в сжимательной мочеваго пузыря мышкъ сушь чувствительные и неудобоизлычимые штьхв, кои вв срамошт и на нимфахъ находятся: чбо оныя части болье имьють чувственных жиль и сушь болье напряженны, а сти снабавны напрошивь того большимь количеством в сосудовь и суть слабе, почему и не столько подвержены судорогамъ, скорве уступають дъйстейю авкарство и скорве заживають. Но поелику сти мягктя части менъе сопрошивляющся, що по сей самой причинъ бывають онъ наипаче подвержены мясистым в ноздреватым вырощеніямі, коихі сущность разсмотримъ ищательнъе въ другомъ мъсшъ.

Въ какой бы части женской срамоты мъстопребывание начальнаго заражения ни было, то можетъ ядъ

Ф 4

такимъ же образомъ разпространиться и от в таковой же причины вы течени своемь воспрепинствовань быть, какъ и у мужщинъ; почему и также удобно происходять у женщинъ паховики, какъ и у оных в. Смъшно бы было ушверждать, что онв такожде и опухоли яичекъ подвержены; однакожъ, что почти на тоже выдеть, не обдко страждуть въ сей бользни яичники; и я ошнюдь не сомнаваюсь, чтобь и въ нихъ не было иногда споль же сильной захряслости, какъ и въ ядрахь мужескихь, какь изв сильныхв на сій части жалобв и соединенных в св оными припадков в заключишь можно.

Что ядь можеть поселиться вы маткь, вы томь, думаю, никто не усомнится; однако опасаюсь, что о семь не такь часто помнять, какь бы по настоящему надлежало: ибо оть пренебрежентя сего обстоятельства не только принуждены бывають многтя женщины во всю жизнь


ижъ страдать злосвойственнымъ изтечентемъ подъ именемъ бъли, но и содъловались отъ того безплодными, или рождали нездоровыхъ и бъдственныхъ дътей.

Женщины подвержены нъкошои в пох выдотом в бивнестьод бина бывають для нихь иногда полезны, но въ самомъ дълъ приносять болье вреда; отв чего часто происходить, что и опышнвишему Врачу трудно бываеть изв жалобь или изв припадковъ имъть справедливое объ оныхъ суждение. Они часто бывають обманушы; но напрошивь того бывають изь нихь такія искусницы, которыя и наискуснъйшаго Врача обмануть умъють. Сколь не трудно уговерить невинную и добродътельную женщину , получившую по несчастію злосвойственную гоноррею, въ томъ, что то суть острыя были, знають наилучше невтрные мужья; и что иногда застарвлую гоноррею отв бълей, даже и по точнъйшемь изслъдованіи, естьми женщина захочеть

Ф 5

обмануть, различить не можно, Врачамъ допольно извъстно.

Припадки начинающейся гонорреи скорће уменьшаюшся у женщинь, чемь у мужщинь; напудобнъе же освобождается отв оной женщина молодая, не имьющая остатковь предшествующей гонорреи, непрешеравымая безвременных в родовь или другихъ женскихъ бользней, инаково бываеть иногда изцъленте несовершенное, а основательное авченіе бываешь тогда съ большими сопряжено запрудненіями, нежели какЪ обыкновенно думають. Воть то, что намфрены мы были сказать о новопроизшедшей гонорреи женщинъ; теперь приступимь къ вкоренившейся или въ обыкновение вошедшей, которая гораздо важнъе и до познанія которой не такъ удобно достигнуть можно.



О во обыкновение вошедшей теси во женскомо поль.

Чтобь саблать надлежащее различте между злосвойственною гоноррезю, особливо когда оная вошла въ обыкногеніе, и между бълью, то надлежить о объихь имъть хорошее познание. Что касается до оной, то состоить она въ продолжении любострастных взв св тамь различтемъ, что опухоль срамоты, мочеръзь, бользненное соиште, и пт. д. описанныя прежде, прекратились, а шолько гноеващое изшечение по прежнему продолжается. Въль надишь от разных причинь, но сопровождаема бываеть нъкоторыми ошмвиными припадками и пріемлеть на себя различные виды, такъ что весьма мало характеристических в признаковь остается, которые бы отличали оную от вакосивлой гноеватой шечи.

Для изслъдованія различных в причинь и существа бъли потребная бы была цълая книга; и такв я постараюсь, сколько можно будетв, ограничить себя, не приступая при томваконовь ясности.

Подъ именемъ бъли разумъется изтечение бълой влаги изъ маточнаго влагалища; таковый видъ имъеть она тогда, когда бываетъ легкая; но впрочемъ соотвътствуеть оная не только въ цвъть, но и въ существъ различнымъ причинамъ, оную причиняющимъ и сложению тъла.

Причины, кои вы состоянии произвести оную, суть многоразличны; однако могуть оныя удобно на два класса раздълены быть: вопервыхы происходить оная оть слабости волоконы и сосудовь, оную испражняющихы; а вовторыхы оть насилия, какого бы рода оное не было, оть коего помянутые сосуды повреждаются и вы израненномы состояни остаются. Для познания надлежащимы образомъ первато рода непремънно нужно имъть свъдение о мъсячныхъ кровяхъ, ибо бъль шъмижъ самыми сосудами отдъляется.

Подв названиемъ мъсячного очищенія разумъется ежемъсячное испражнение крози изв тайнаго уда жебеременной женщины. Оно начинается обыкновенно около 14 льтв, а прекращается между 40 и 50; сте междувременіе опредълила Натура женскому полу для зачатія. Между отищентями протекаеть обыкновенно мъсяцъ времени; продолжение теченія, такъ какъ и количество онато сушь различны: обыкновенно продолжается оно отв трехв до четырехв дней, и вышекаетв вв оные оть 8 до 12 унцій. Нъкоторыя женщины имъють предв тъмв нъкоторые предевстники, какв на прим. боль вь головь, вь лядвыхь и грудяхь, краткое дыханіе и т. д. У другихъ появляется оно безь наимальйщихь припадковь, и точно вь опредъленное время. У нъкоторых в изтекаеть вдоровая кровь; а у иных вываеть измечение водянистое, вдкое, разноцавиное, а иногда весьма зловонное: однако не смотря на то, наслаждаются, кажется, женщины при всемь томь добрымь здоровьемь.

Здъсь надлежало бы изслъдовать нъкоторыя Физическія задачи, ко-торыя еще по сіе время не ръшены; но какъ сіе удалило бы нась отъ предпріятой нами цъли, то мы оное оставимъ. На пр. для чего таковое очищеніе однимъ только людямъ свойственно? что онаго причиною? и т. д. Для нашей цъли довольно знать и того, что оное въ опредъленное Натурою время изъ устьевъ подчревныхъ и чечуйныхъ кровавыхъ сосудовъ, въ маткъ и ея влагалищъ разширяющихся, изтекаетъ.

Что оное не имбеть никакого къ полнокровію отношенія, какь нъкоторые утверждають, можно, кажется, увъриться по тому, что слабыя, нъжныя и худощавыя женщи-

ны имъють обыкновенно большее изтеченіе, нежели сильныя и полнокровныя. Такожде заблуждающся по моему мнѣнїю и тъ, кои приписывають оное внутреннему броженію; ибо ничто не бываеть для онаго шакъ вредно, какъ худое пищеварение, сильныя душевныя движенія, и другія причины, производящія лихорадочное въ крови волнение. Женщины, отправляющія тяжелую работу, наималъйшее имъють течение; а иногда не имћешъ оное даже и кроваваго вида, однако пребывающь онъ совершенно здоровыми. Что луна ни малаго вліянія на оное не оказываеть, можно заключинь изв того, что каждая женщина имъеть опредъленное для того время, не соображаясь ни мало съ перемънами луны. Мнънје, что оное свойственно одному только человѣку, также не основательно; ибо обезьяны, коих дътородныя орудія въ разсужденій ихъ строенія сЪ человъческими нъкоторымъ образомь сходствують, оное также имъ

ють; сверьхь того примъчено во всякомь родь животныхь, а особливо у ручныхь четвероногихь, что во время ихь похоти отдъляется у самокь изь дътородныхь ихь частей нькоторая влага, и что оная по прошестви нькотораго времени паки появляется, пока не почувствуеть она себя беременною; при томь же замьчено, что чьмь менье имьють онь движентя, тьмь сильные отдъляется влага.

Вообще кажется мнв, что Натура опредвлила мвсячное очищение для пріуготовления женских в двтородных в частей кв зачатию; а особливо для того, дабы маточные сосуды учинились чрез в то способнийшими удерживать в в себв зачате: ибо неоспоримый опыть доказываеть, что женщина вскор посль онаго скорве зачинаеть, нежели в в другое время.

Приближение мъсячнато очищения обнаруживается обыкновенно слъдующимь образомь: за день или за

два предъ шъмъ увлажается тайный удь болье прежняго сукровичною мокротою; сте происходить оть притеченія къ симъ частямь соковь, отв чего устья сукровичных в сосудовъ машки, а особливо мокрошныя железы вь маточномь влагалиць къ сильнъйшему побуждающся отдъленію. Вь тожь время чувствуется вь п.ясниць боль, или паче и вкоторое неприятное ощущение, какв будто что давить, что происходить оть накопленія вь сихь частяхь соковь, причиняемаго давленіемь нервовь, оть крестцовой кости происходящихь. Но томъ появляется теченіе, которое и продолжается до тъхъ порв, пока волокна сосудовъ получать опять силу по прежнему сжиматься; въ то время течение мало по малу уменьшается, спрановится по томъ сукровичнымъ и наконецъ изчезаешь.

Таким в образом в происходить оное у здоровой особы; но естьми изоби-

луеть женщина острыми соками, естьли сосудистыя волокна от в притеченія слишкомъ напряженны и течение чрезв то удержано будетв, то боль въ поясницъ и въ дътородномъ удъ, въ головъ и ш. д. нарочито увеличивается; а понеже въ семь случав соки, такь сказать, захрясли, и сначала въ маломъ токмо жоличествь изтекають, то настоящая густота крови пропадаеть, почему и течение от чистой крови весьма оптличается: ежели оное или оть худаго пищеваренія или оть душевных движеній, коимь женщины болбе подвержены, чемв мужщины, смвшано будешь св желчью, шо изтекающее болье наклонно будеть кь гнилой остроть, почему мъсячное у таковых в изтечение и пріемлеть иногда на себя злое свойство; сте подало, можеть быть, древнимъ поводъ къ утвержденію, что имбеть оно ядовитое свой-C III BO.

И такъ естьли при помянутыхъ обстоятельствах в или и безв оных в сосудистыя дътородных удов волокна разслаблены, пто мъсячное очищение долбе продолжается; а понеже при такой слабости не спопын собны бывають отправлять надлежащимъ образомъ ощавление, ни препятствовать до надлежащаго времени сожащіемь своимь вліянію соковъ: то испускають устья сосудовь еще нъсколько времени послъ мъсячнаго изтеченія нъкоторую влажность, и сїя-то влажность называется по настоящему бъль или бъли.

Пока сте теченте безъ всякаго бользненнаго ощущентя пребываеть, то бываеть оно бълое подобно молоку и разслабляеть только тъло. Но естьли будеть оно сопровождаемо продолжительного остротою, то лищается густоты своей и дълается водянистымь, острымь и зловоннымь; разъъдаеть не только части, изъ коихъ вытекаеть, причиняеть вь оныхь язвы и получаеть от того гноеватый видь, но и портить, естьли вь изтечении воспренятствовано будеть, всю кровяную массу, и подаеть поводь ко многимь бользнямь.

Пока пребудеть быль простою, то рыдко слыдуеть она послы мысячнаго очищенїя: ибо побужденїе соковь кь симь частямь на нъсколько времени утоляется, но вскоръ паки рождается. Такожде и вытекаетъ оная не во время мъсячнаго очищенія: ибо измеченіе вышекаеть при шомъ слишкомъ скоро, чтобъ цвътъ оной могь въ млекообразный преврашень бышь. Различные писашели сушь шого мивнія, что быль происходить от нькошорых млечных в сосудовь; но по моему мнвнию таковых в млечных в сосудовь в дъщородных в частях в не находится, а имъють только существование свое въ ихъ воображении: ибо что кровь въ состояни принять на себя бълый

видії, видимії мы ежедневно при нагноеній; почему думаю я, что бъльрождается от гноеватаго сваренія, естьли позволено мні будеть употребить сїє выраженіе.

Какъ бы то ни было, но то върно, что бъль есть такая бользнь, которой наиболье подвержены сущь нъжныя и мало движентя имъкщія женщины, когда напротивь того кръпкія и дълающія себъ умъренное движеніе особы оть онаго по большой части освобождены.

СЪ начала бъль обыкновенно удобно отвращается, и то не столько лъкарствами, какъ наипаче умъреннымъ движентемъ и порядочнымъ образомъ жизни; а естьли оная продолжится долъе, то количество оной прибавляется: отъ сего тъло слабъеть, жизненные духи умаляются, кровь лишается своей консистенцти и уменьшается, и женщина становится худокровною; душа впадаетъ въ смъшныя воображентя, дълается угрюмою

и оказываеть, такь какь и беременная женщина, сильное желанте кв необыкновеннымь вещамь; глаза становятся слабы, лице опухаеть и двлаются по немь ночью пятна; наконець опухоль увеличивается, распространяется далье, и сухотка или водяная бользнь часто прекращають жизнь.

Мъсячное очищение бываеть обыкновенно безпорядочно, пока не достигнеть опредъленнаго своего времени; равнымь образомь происходить и съ бълью, пока не придеть оная вы обыкновение: у иныхъ течеть оная счень порядочно; у другихъ напротивъ того безпорядочно, а у нъкоторыхъ течеть безпрестанно, даже и во время мъсячнаго очищения.

Естьли изтечение или от из ліянія желчи, как то говорять обыкновенно, или от другаго чего получить нъкоторую остроту, то причиняеть оно непріятныя ощущенія не только въ маткъ, но и въ

прочихъ къ срамотъ принадлежащихъ частяхъ, особливо сженте мочи, боль въ поясницъ и давленте въ дътородномъ удъ; однакожъ оная не безпрестанно продолжается, а бываетъ съ перемежкою. Изтеченте пртемлетъ на себя иногда гноеватый видъ, и бываетъ иногда добровидно, а иногда бываетъ желтое, зеленоватое и темнаго, а иногда даже и чернаго цвъта.

Больная чувствуеть при семь часто вы разныхы частяхы тыла ревматическую переходящую боль; иногда сильной зуды вы кожь, который пятнами и угрями, особливо вы лиць, сопровождается; на передней части головы появляются желтые струпья, а иногда распространяется острота даже по всей головь. Наконець впадаеть больная, естьли не будуть употреблены лыкарства, мало по малу вы сухотку, пока водяная бользны не сдылаеть печальному сему состояные конець.

Сти суть слъдствия, могущим произойти от женской слабости и моторыя задержанному мъсячному очищентю, мокротному тълосложентю, блъдной немочи, истерикъ и т. д. и самому даже сидячему роду жизни приписаны быть могуть, и которымь всъ женщины, старыя и молодыя, замужния и не замужния, добродътельныя и порочныя и подвержены бывають.

Но кром' сих имъются еще другія причины, кои во состояніи произвесть изтеченіе подо именемо бъли, хотя оное по свойству его и заслуживало бы другое наименованіе, а именно: естьли изтеченіе гноевато и происходито или ото разодранія сплетенныхо между собою маточныхо сосудово, или мокротныхо маточнаго влагалища железо и прочихо дътородных частей, то возрождается изтеченіе явнымо образомо ото язвино, оной източающихо, и оное ничъмо ото закосньлой гонор-

реи не разнишся, какъ шолько родомъ происхождения своего.

Причиною таковаго гноеватаго течентя могуть быть необузданное любострасте, безвременные и трулные роды и другія матки и маточнаго влагалища повреждентя, безь наимальйшаго при томь Венерическаго яда участія.

Ч по касается до неумъренности вв любострасти, по имвав я уже выше сего случай гозорить о семь; а шенерь скажу шолько що, что ничто такь не способно разслабиль и раз ушишь наикръпчайшее шълосложение, какъ самая сіл необузданность. Въ такомъ случат бываетъ изтечение обыкновенно общественнымь; не шолько машка, но и ма--точное влагалище и прочія дѣтородосудныя части при семь сострадають. Наимскуснъйшій Врачь не въ состояній будеть отличить таковый родь из анентя от вакосивлой гонорреи, развъ шолько, что больная откроеть ему исшинну.

Yacms II.

Безвременные роды въ состояни причинишь великое вло; и я осмвлюсь даже утвердить, что женшина от одних в преждевременных в родовь болье подвергается опасности, нежели отв десяти естественныхв: ибо понеже между машкою и яичком в находишся весьма плошное шочное соединение посредствомь сосудовь, служащихъ къ обращению крови между оными, то разлучение прежде надлежащаго времени должно причинишь разодрание существа машки, а особливо естьли неискусная Вабка будеть стараться насильственнымь образомъ вынушь последь, и давать послъ того очень сильныя кровигонящія средства. Сабдотвіемь таковых в безвременных в родов в, наипаче же такогаго худаго съ больною поступка бываеть обыкновенно прсдолжительное гноетечение, которое часто и во всю жизнь продолжается.

Трудные розы имъющь обыкновенно равныя слъдствія, но которыя ръдко родамъ, а паче худымъ поступкамъ неискусныхъ Бабокъ и Аккутеровъ приписать должно.

То же самое произойти можеть и отв упадентя матки, отв неосторожного употреблентя вяжущихв и крови тонящихь средствв, ъдкихв впрыскиванти и т. л.

Однимъ словомъ, все, что повреждаешь существо машки, машочнаго влагалища и всей срамошы, то причиняеть также и язвы, кои по опыту столькожь вредны быть могушь, какь и причиняемыя Венерическимъ ядомъ, съ щою щолько разницею, что Генерической ядь действуеть скоропостижно и причиняеть вы накоторых вастях воспаленіе, от коихь оное напослідскь далье распространяется; напринвъ того происходить сте гноетеченте мало по малу и достигаеть медленно до высокой своей степени. Но когда воспалишельные припадки злосвойственной гонорреи поотд дутв, то становятся онв между собою такв

сходны, что следствія, разпознавательные и предсказательные признаки и пользованіе оных советтенно между собою сходствують, и что теченіе были, от взынь вы маточномы влагалиць и вы прочих дыпородоудных вастях произтедте, от вкоренившейся злосвоественни гоннорей ни поды какимы видомы отличить не можно.

Стекду явствуеть, что въ подобных в изследованиях в надлежить поступать осторожно, мы научаемся изъ сего далъе познавать причины различных бользней , коимь не только бывають подвержены добродъщельныя метери, но которыя и на потометво их враспространиться мотушь, и кои, хошя и не Венерической ядъ тому причиною, имънтъ иногда столь много сход тва св таковыми бользнями, что - боль ыя обвиняющся частю въ нъкоторыхъ порокахв, коимв онв не причастны. И такь Врачу надлежить ві семь случав вр суждени свсемь быть осторожну; пользование же его должно устремлено быть противу большаго зла, а меньшее уступить и само собою.

Гоноррея не давно произшедшая жегко познается; въ раз ужденіи же застарьлой должны мы для пользы больной зчать, добросвойственно или злокачественно есть изтечение, сукровично оно или гиоеващо и ш. д. , снаружи или внушри имъе пъ гиъздосвое, далве количество очаго и разные припадка, при ономъ оказывающівся. Ибо естьли изшеченіе бъли сукровично временно полько появляется и никакою болью, ни ръзомы при мочеиспусканій не сопровождаеть. ся, що есть, сте простая толькобыль; ежели же исше енте напрошивъ того желтовато, гноевато, вловонно, упорно и болью и сженіем в при моченспусканій сопровождается, то будеть сте гноезатое изтеченте и шребуеть другаго способа льченія, на смотря на то, Венерического оное

или не Венерическаго есть происхож-

Когда найдемъ мы при осматриваніи, что складки или морщины при сжимательной мочеваго пузыря мышкъ или другая какая часть дъпороднаго уда имвешь язву, или пойдеть изв оныхв при легкомв давлении гной, то знаемь мы, что сти части страждуть. Далве, естьли. какая часть вв маточномв влагалищь будеть при осязаніи чувствительные другой, то имветь оная явнымь образомь язын; но есшьли будеть теченіе, и онаго источника ни зрћијемъ, ни осязанјемъ открыть не можно, то върно имъеть оное произхождение свое изв машки. Когда изтечение произошло не давно, то тьмь скорье уступить оное употребляемымъ средствомъ; а буде оно уже долго продолжалось, то легко вообразишь себъ можно, что отврашеніе онаго должно съ большими с единено бышь затрудненіями.

Не смотря на сходство помяну" тых разных родовь гноетечений, имъеть вь себъ Венерическое то особенное, что засъдаеть наиболье вь морщинахь, нежели въ другихъ частяхв, и что оное вкореняется очень плошно вь шьхв часляхв, гдв ядв прежде поселился, и что оный стараешся болье вышши наружу; почему и дъйствуеть не только непосредственно на малыя железы оныхъ, но и дълаенів чрезв сїє то, что другія части купно страдають, и учиняеть ихв чрезв то способными кв воспріяшію яда. Какв скоро язвы успокоятся и воспалительные припадки уменьшатся, то и ядь теряеть нъкоторым в образом в заразительную силу, такъ что часто между существомь онаго и между тъмь, оть другой причины происходящимъ, никакого различия не имбешся; почему и можеть вкоренившаяся Венерическая послъдственная течь (gleet) какъ въ мужескомв, такв и женскомв полв пребыть для техь, кои кь обьятіямъ привыкли, долгое время и во всю даже жизнь безвредною; а иног-да возжечь будто сокровенный огонь и приве ть въ движенте всю живот ную машину.

Правда, что сія вкоренившаяся послідственная течь обоего пола, естьли оная порядочна и при томі не остра, иногда рожденію и самых в здоровых в дътей не препятствуеть; но что оная иногда страждущим в оною особам в и потомкам в их величаї тій вредвинесть можеть, доказывают в ежедневные опыты, а слідствія сих в изслідованій оное подтверждають.

Разсмотря состояние гоноррен, приступимъ теперъ къ разпымъ неприятнымъ припадкамъ, оную сопровождающимъ.

## О воспалительных припадках д.

ВЬ мёстахв, вы коихы нечто свободному обращению соковы препятствуеты, происходить вожжение. Кы свободы отремится вся Природа; она посъяна въ каждомъ существъ живущемъ; что покущается
положить оной препятствіе, то приводить участвующія въ томь части
въ движеніе, и онъ стараются союзными силами изгнать непріятеля.
Первыя усилія бывають въ семь случат наисильнъйшія; но наконець сопротивленіе слабъеть, и побъжденныя
преклоняются мало по малу подь иго;
однакожь суть тъмь не довольны и
все еще усиливаются, чтобь оть
онаго освободиться. Такъ происходить сте въ Государствъ и точнотакже въ Экономїи животныхъ.

Воспалительные припадки, появляющієся по малу віз недавно произшедшей злосвойственной гонорреи, явились бы такиміз же образоміз, естьли бы причинены были другиміз образоміз, а не Венерическиміз ядоміз, какіз явствуетіз сіс изіз раніз, ожоги, контузій, поврежденій іздкими средствами и т. д. Ибо естьли вітьям восудовіз разодраны или придавлены, знакіз что ділающей неспособными от-

правлять свою работу, то соки въ оных в останавливаются, отв втеченія соковь оть другихь частей притекающих в напруживаются и разширяющь еще болье смежные сосуды; от в сего чувственножильная оболочка оных в раздражается, побуждается кв сожащію, и последующее разширеніе оных в двлается несносные. Притекающіе со встхв сторонь соки должны непремънно возбуждать сосуды и нервныя их волони к в сильный шему отправлению работы ихв; почему будуть оные стараться освободиться от давленія, и таковое усиліе должно непремънно произвесть въ сихъ частихъ жаръ: а поелику кровавые шарики сильнымь сожащемь волоконь изв своихв сосудовь вы сукровичные прогоняющся, що шакле и сія напруживающся и воспаляющся. ВЬ такомь состояни бываеть сначала воспаление, которое наптуральнымь образомь по сосъдсивеннымь и союзнымь съ оными частямь распространающся.

Когда волокна страждущих сосудово или уступять, или упругимь своимь сожащемь захряслые соки не раздравшись прогонять, такь что соки могуть опять спокойно продолжать течене свое, то прежней покой паки возстановляется: се есть разрышене, одно изы наисчастливыйшихь вожженей окончаней.

Но естьли воспаленіе очень сильно, так в что ни жидкія части разръшиться, ни плотныя уступить не
могуть, или не въ состояніи превозмочь предполагаемаго препятствія,
то угро кають части сотреніемь между собою; жидкія части лишаются оть захряслогти добраго своего
свойства, и дълаются ъдкими и разрушають тъмь тонь и сплетеніе
плотных в частей: сіе есть антоново
вгонь.

Когда сей разорительный непріятель не найдеть выходу, но сдълается гнилымь, причиняетьеще большее опустошеніе и пресъчеть всякую для страждущей части помощь, то становится вредь отчасу болье и угрожаеть погибелью всей машины. Вы семы случав должно или отнять страждущую часть, или больному погибнуть: сте естьпомертевние.

А естьми обращение соковы не совсьмы воспреия иствовано будеть, но разлиренные от захряслыхы соковы сосуды принуждены будуты прорваться, оставя однакожы при томы не большую сжимательную силу, такы что они не много только соковы пропускають, то дылается нарывы, который Натурачены нагноение, очищение и заживление опять исправляеть.

Таково есть всеобщее состояние и слыдствия воспаления: теперь разсмотримь оное вы особенности.

## О дизурін или могерьзь.

Какъ скоро ощущение щекотания при наступлении гонорреи умножится, которое изтечениемъ сукровичной влаги изъ мочеваго стиола у муж-

щинъ и изъ дътороднаго уда у женщинъ сопровождается, то приключается мало по малу мочерьзь; моча испускается чаще обыкновеннаго и сначала съ пріятнымь ощущеніемь, которое превращается напоследокъ въ жжение и ръзъ. Моча получаетъ темноватый цвъть, который мекду шафраножелтаго и цвъту кръпкаго Аглинскаго пива наблюдаеть сред ну; и како сей цебшь возвышается, усиливается такожде и острота мочи, такъ что больной имъетъ иногда безпрестанное кв мочентю побужденте, хонгя едва в состояни испустить оной от времени св чайную ложку, и которая такъ сильно ръжеть, какь будшо какое обоюдуострое орудіе. А иногда перемъняется мочеръзв, какв мы скоро увидимв, вв сильнейшія бользни.

Мочеръз всть очевидно только воспалительный припадок гонорреи, а не самая бользы; ибо оный бываеть безпрестанным спутником горячек и воспаленти всобще, и же-

стокость онаго соотвътствует вольному, чъм волье или менье подвержен в он в нервиммы припадкамы: отсюду явствует , от чего мужщины симы припадкомы гонорреи болье страждуть, чъм женщины, особливо когда они молоды, горячи и сильны. А сверьхы того и строенте мочевых в орудти причиною тому, что они большее от онаго претерпъвают в безпокойство, нежели женщины.

Признаки познанія и предсказянія, взятые извосмотрінія урины,
имьють между Врачами своих в з щитителей и противников в. Некоторые изв них в хотьли узнать изв
оной слишком в много, другіе напротивь того вовсе не привнавали,
чтоб в изв оной что либо узнать
было можне. И ть и другіе захсдять в семь дъль слишком в далеко. И тоть такой великой ша; латань, который думаеть, что изв
осматриванія урины ничему научиться не можно, как в и тоть, кото-

рый думаеть, что въ состояни узнать по уринь всь бользни.

Есть много бользней, вы коихы моча болье являеты показаній, чымы польсы, или другой какой признакт; и я думяю, что иной Врачь замытиль вы оной то, что заслуживало бы дальныйшее изслыдованіе и обыявленіе.

Древніе обладали великимі искусствомі ві разсматриваній урины; и хотя они ві семі иногда слишкомі далеко заходили, однакожі оставили намі послі себя о семі много употребительнаго, оті чего, естьлибі оное надлежащимі образомі исправлено было, получила бы Врачебная наука не малое приращеніе.

Что всякая горячая и судорожная бользнь соединена св здкою и красною мочею, есть наблюдение извъстное. Но отв чего преисходить сте? Обыкновенный на то отвъть есть: понеже оная обременена солеными и здкими частями, кои вы-

апянула она изв крови. Но естьли ньсколько о семь подумаемь, та найдемь, что сје не правда, хотя и вообще за то принимается. Ибо положимъ, что совершеннымъ здравїемв наслаждающійся человькв обожжеть нечаеннымь случаемь часть свеего шьда, то опыть научаеть нась, что больной чрезь нъсколько часовь претерпить вь той части воспаленіе, получить лихорадку и мгновенно возымъеть примътно острую и красную мочу; но какъ скоро дихорадка и воспаление прекратиятся, лю и моча въ разсуждении количесива и остроты ея перемънится. Такожде и дъйствія нарывных в с едствь на мочевыя части и свой. сшво мочи извъсшнъе, нежели иное что, которое бы могло для больнаго полезнымь бышь. Изв сего кажешся явствуеть, что острота бываеть причиняема дъйствиемъ воспаления на нервы, не смотря на состояние крови.

Пьль наша не дозволяеть намы поворить о семы пространные, чего ради обратимся кы изслыдованию разныхы родовы мочерыза, которые сопровождають обыкновенно гоноррею, и разсмотримы, когда бывають они подлинно злокачественными, и когда можно почесть ихы припадками; сле принесемы вы разсуждени лычения не малую пользу.

Гав бы гивздо гонорреи ни было, однакожь мочерьзь всегда соображается св воспалительными припадками, оною причиняемыми. Молодые люди, получившёе оную въ первый разъ, претерпьвають, какь я имъль случай часто замътить, сильнъйшій мочеръзъ, нежели другіе; ибо судорожное воспаление бываеть у нихъ сильние. Я не осмъливаюсь показашь, отв чего то происходить, что почки ощавляющь въ воспалентяхъ столь опънчную прошиву здоровой мочу; ибо равное право имъль бы я утвердишь, что хочу описать преудивительное разных в родовы мочи отды-Часть ІІ.

ленте. И так в покажу единственно, что воспалительное сожатте яда сообщается нервному существу мочевато пузыря и сжимательной онаго мышкв, а оттуда сопровождается посредством в мочевых в протоков в и в самыя почки, и таким в образом в ражаются отдъляюще сосуды жел в образнаго существа, почещный тав и выдаивающе сосуды.

Пока раздражение не сильно, то побуждающся они шокмо кв ощавленію, на примърь, такимь образомь, какь дьлаемся посредствомь мочегонипельных); почему и испускаеть больной сначала мочу чаще обыкновеннаго. Но как в скоро злокачественное сте раздражение учинится воспалительным в, по воспалишельное сожащие сообщишся мочу отдъляющимь орудіямь, возимъеть вліяніе на отделеніе оной, и моча получаеть оть того остроту свою. Высокой цввтв мочи можно, правда, приписать кровавымъ частицамт, смиеннымь св воспалитель. нымь опавлением); но равнымь обравомъ можно приписать оный и причинамь, кои содълывають оную острою.

Естьми воспамительное сожатие пребываеть порядочнымь, не оставляя яда ни вы какой части мочевых орудий, то мочерых купно сы воспамениемы мало по малу уменьшается, и рызы будеты тогда происходить единственно оты Венерическихы язый, а уже не оты чрезвычайной ыдкости мочи, почему и останется только симптоматическимы.

Когда моча шолько вдка и причиняеть боль, а при шомь на нвкошорое время удержана быть можеть, то называется могервзомо или дизуртю. Но естьли боль вы шейкы мочеваго пузыря и вы самомы пузыры ощущается и имыется при шомы безтрестанное побужденте кы мочиспускантю, моча же вы маломы шолько количествы и сы великою болью отдыляется, то называется больны странгуртею. Ста прачаняет я или остротою урны, которая, раздражая нервые существо мочеваго

пузыря, побуждаеть оный къ безг престанному сожато и отдъленом мочи; или происходить и отв того, когда Венерической ядь вы сжимательной мочеваго пузыря мышкъ или и вы самомы пузырь засъдаеть. Отв сего дълаются часто вы сей части язвы, которыя, естьли неосторожно пользованы будуть, могуть навлечь больному великой вреды и продлить льченое, а иногда могуть даже учиниться и неизлъчимыми.

Естьли же послъдуетъ ишурїя или совершенной мочи запоръ, то таковый случай еще бъдственнъе, и бываеть иногда весьма опасень. Часто случается, что ядь засъдаеть въ сжимательной мочеваго пузыря мышкъ, отъ чего оная воспаляется, и опухолью, отъ того произтедтею, совсъмь замыкаеть проходь; късему присоединяется еще острота мочи и нелъпое старанте запускать катетерь, что все весьма увеличиваеть воспаленте. Бываеть иногда, что и самыя почки воспаляются и дълают-

ся неспособными къ отдълению мочи за когда сте случится и воспаление произойдеть отв Венерическаго яда, то находится больной въ чрезвычайной опасности.

Но вообще бываеть дизурія вы гоннореи не весьма злаго свойства; а естьли странгурія и запоры оную сопровождають, то произходить сїє обыкновенно оть худаго пользованія или оть нехорошаго свойства больнаго. Какимы образомы сіє происходить, покажемь вы другомы мысть.

## О филозись и парафилозись, или о незалуяь и неотлуяь.

Какъ скоро ядъ начнетъ причинять воспаленте, то происходятъ обыкновенно или фимозисъ или парафимозисъ, а особливо у такихъ, которые онымъ въ первый разъ заражаются. Иногда происходятъ оные вскоръ послъ гонорреи; оченъ ръдко оной предтествуютъ, а по больтой части возрождаются тогда, какъ послъдуетъ уже сильное изтеченте. Фимозись или незалупа дволается у тьхв, которых в головка дыпороднаго уда покрыта крайнею кожицею; а именно: кожица сіл воспаляется, опухаеть, и иногда такв сильно, что препятствуеть изтеченію мочи и гноеватой матеріи.

Парафимозись или неотлупа дьлается у техь, у которых крайняя плоть головки не покрывает?; вь таком случат залупается воспалительная опухоль позадь головки, сжимается и объемлеть мужескій члень позади головки такь плотно, что не только не можно натянуть оную на голову, но и причинаеть по причинъ плотнаго сожатія воспаленіе вь пліткь, какь одно изь наивеличайтихь золь.

Какъ та, такъ и другая суть спутники воспалентя дътороднаго уда, Венерическаго ли оное ролу или нътъ; и въ такомъ случат бывають они только припадочными и умень-таются купно съ воспалентемъ. Но когда бывають оные слъдствтемь отъ

нечистаго соитія полученнаго яда, то оные не такъ поотдають скоро, и старые и молодые суть равно онымъ подвержены. Опухоль какъ незалупы, такъ и неотлупы можеть быть троякаго рода, а именно: воспалительная, водяная, скирроваталь.

Воспалительная опухоль приключается весьма часто и бываеть всегда водянаго рода. При семь надлежить въдать, что нъть части вы тъль человъческомь, которая бы большимь числомы сукровичныхы сосудовь снабдъна была, какы внътній покровы мужескаго уда и дътородоудныя губы женскій: ибо хотя и суть оныя продолженіе сальной плевы, однакожы кльтчетое существо оной теряется и презращается вы сихы частяхы вы сукровичные сосуды; оты сего дълаются сій части нъжные и гибчае, почему и болье подвержены опухоли.

Не излишне будеть замътить здъсь, что сукровичные сосуды имъють вь себъ нъчто особенное, чъмъоптличаются они примътно от в другихв сосудовь, а именно, что они сушь одно продолжение небольших в прозрачных в кавточекв, изв коихв одна въ другую посредствомъ заслоночекъ такъ испоражнивается, что препятиствують обратному теченію; однакожъ кромъ шого, что находяшся между собою въ союзъ, имъють онв также сообщение съ малыми въшьвями кровавых в и боевых в жиль, и соединяющся съ нервами и мясистыми волошями, так в что онв вь тьхь частяхь, вь коихь находяшся, со всъми плошными и жидкими частями сцёпленны.

И такъ, поелику ядъ Венерической причиняеть воспаление, то сукровичные сосуды побуждаются къ сожатию, и сте препятствуеть обращению въ оныхъ: а понеже притечение влагъ продолжается, то клътки или сътки напруживаются, и малыя вътьви кровавыхъ и боевыхъ жилъ, кои также придавляются, изливають въ оныя нъсколько крови, отъ чего онъ

еще бол в разширяющся, получають красный видь и воспаляющся. Такь бываеть сте вы началь.

Естьли сїй сукровичныя сѣтки прорвутся, то дѣлаются шанкеры; а естьли онѣ разслабнуть и волокна ихь потеряють свою упругость, то дѣлается опухоль водянистою. Однакожь происходить сїє рѣдко или и никогда въ самомь началь, а обыкловенно уже посль, когда существують шанкеры, и то въ людяхь сложенія слабаго и при наступающей заразь у флегматиковь. Почему и оказывается оная чаще у женщинь, нежели у мужщинь, развъ только что настоящая зараза уже существуеть.

Естьли же водяная влага сдълается въ оныхъ густою и наконець затвердълою, и сътки такъ сужмутся, что воспрепятствують истечентю, то учиняется опухоль скирроватою. Сте происходить само по себъ ръдко или никогда, наименъе же въ началъ болъзни; естьли крайняя плоть начасть П.

полнена внутри шанкерами, краж которых в, естьли они долго существовали, дълаются обыкновенно жесткими и кръпкими, то претерпъвает в крайняя плоть от сих в язвы весьма много и пртемлет в на себя часто безобразный видь.

Естьли незалупа или неотлупа нѣсколько времени продолжались, то бывають обыкновенно сопровождаемы шанкерами. Незалупа бываеть тогда затруднишельна и причиняеть часто великой вредь, такь что иногда не только вся внутренность крайней плоти, но и дътородоудная головка, а наипаче уздечка покрываются ранками: сверьхъ того случается и то, что помянутыя части съ переднею кожицею сростаются; позади шаковаго срощенія возрождаются иногда нарывы, кошорые или сами собою прорывающся, или вскрывающся какъ и другіе ножичкомь. Во всехь Хирургических в книгах в находятся предписанія, какимь образомь надлежишь эскрывань крайнюю плонь, чиобь достигнуть до разыбдающихы язвины, но ни вы одной изы оныхы не нашелы я предписаннаго способа, чтобы предупредить оное: ибо теплыя примочки приносять вы семы случав мало пользы; и любострастной яды слиткомы упорены, чтобы уступить обыключеннымы средствамы; гораздо дыствительный средствамы; гораздо дыствительный пеказано вы своемы мысть. Когда существуеть уже настоящее срощение, то надлежить сростытася части отдылить, чего безы операции никакы учинить не можно.

Что надлежить до неотлупы или парафимозиса, то имъется при семь болье опасности, и больной на-ходится часто вы сомнительномы вы разсуждени жизни его положени: ибо воспаленная крайняя плоть позади головки плотно сжимается, и препятствуеть обратному теченю крови вы крововозвратной дътороднаго уда жиль, оты сего дътородоудная головка распухаеть и воспаляется;

восжение одной умножаеть восжение другой; и естьли не подана будеть заблаговременно помощь, то дълается Антоновь огонь и омертвыне, и больной находится во опасности не только лишиться двтороднаго уда, но и самой жизни. Однакож в не всегда имбешь неотлупа таковыя худыя дъйствія, а только тогда, когда больной крынкаго сложенія и склонень къ остроить. Но вообще есть она весьма затруднительна: ибо скрываеть обыкновенно позадь вънца нъкоторыя язвы, кои промежность между толовкою и печуристыми твлами находящуюся развъдають, и оставляють по себь иногда новы или фистулы, простирающіяся даже и въ самый мочевый стволь. Еспьли неотлупа учинится скирроватою, то обезображиваеть мужескій члень болье, чъмъ скирроватая незалупа, и дълаетъ позади головки родъ преграды, которая своимь затвердвијемь и безпрестаннымь сожащимь не только причиняеть больному немамую боль, но и великое затруднение при возстании уда.

Что бываеть у мужщинь незалупа и неотплупа, то бываетъ у женщинь водяная тайных в тубь опухоль, а невоспалительное сожаще язычка, миртообразных в сосочковь, или отверзтія маточнаго влагалища, какъ то думаетъ Аструкъ: ибо строеніе сихв частей сходствуеть болбе съ печуристыми тълами и гомовкою мужескаго уда; почему можно оное болбе сравнять съ струнообразнымь напряжениемь и станихою, о которыхъ мы скоро говорить будемъ. Но по строению страждущихъ частей и по состоянію волотей легко разсудишь можно, что женщины не столько от в сей опухоли претерпъзающь, какь мужщины отв незалупы и неопілупы. Однакож в происходять обыкновенно вь семь случав внутри тайных в губв шанкеры. которые однако удебные вылычиваются, чъмв у мужщинв.

Иногда происходить отв неестественнаго любострастія такожде и въ сжимательной задняго прохода мышкъ водяная опухоль. Сія бываеть не только крайне чувствительна, но причиняеть напупорнъйшія язвы и часто подаеть поводь къ произтествію заднепроходной фистулы.

Незалупа и неошлупа симпиоматическая и отв полученнаго вы сей части яда произшедшая начинается вообще восжениемы, которие вы семы случай гораздо злосвойственные часийю по причины сложения частей, отчасти же и ради причины оное произведшихы. Но что сля часть кожи отв прочей кожи какы вы мужескомы, такы и женскомы поль примытно отличается, можно видыть изы того, что мокротныя обоего пола особы весьма подвержены опухоли кожи дытородныхы частей какы Венерической, такы и не Венерической.

Доколъ водяная опухоль въ обоихъ полахъ пребываетъ простою, то она удобно разбивается. А какїя другія мо-

жеть она имъть саъдствія, о томь будеть вы посаъдствіи упомянуто.

О шанкерахд, или любострастныхд язвахд.

Наилучшій йсходь, какого можно ожидать от незалупы и неотлупы, суть шанкеры. Они не всегда дають себя больному такь чувствовэть, какь предшествующее примытное восженіе, но часто появляются скрытно; однакожь вскорь увыряють его вы своей злоско ственностя.

Когда ядъ причинить воспаление, то страждеть вся срамота, хотя будеть оно припадочное или нъть: ибо въ этомъ то только различие, во многихъ ли мъстахъ зажжень домъ или въ одномъ, въ обоихъ случаяхъ можеть огонь съ равною разгораться свиръпостию. Сукровичные сосуды не только, какъ прежде замъчено, въ нъкоторыхъ мъстахъ стъсняются и разтягиваются, но и захряслая въ оныхъ влага дълается

острою; почему она, дъйствуя на оныя, развъдаеть ихв и причиняеть язву.

Сначала распухають на поверхности различныя клеточки, кои наименье къ сопрошивлению способны и авлающся подобными маленькимв пузырькамь; естьли вмащающаяся въ оныхв влага прозрачна, що называются водяными пузырьками; иначе же дають имь общее название гидатидовъ. Сіи гидатиды или водяные пузырьки происходящь обыкновенно на внутренней сторонъ воспаленной кожицы; иногда покрывають они всю дътороднаго уда головку; наипаче же находятся позади головки близь уздочки. При вступленти своемв причиняють они сильной зудь, которой однакожь скоро превращается въ болъзненное ощущенте.

Злосвойствие шанкеровь зависить не только от их в продолжения, но также и от частей ими пораженных в Внёшний покровь дётороднаго уда вы обоих в полах в наипаче оным в

подвержень; у мужщинь выходить они около крайней плоши и простираюшся до шулять, обвемлять шакожде шако и вадній проходь, у женщинь избирають они себь мъсто на лобкв, оттуду простираются кЪ большимъ и малымъ тайнымъ губамъ до така и до сжимательной залняго прохода мышки. Далье они обыкновенно не простираются, особлизо вЪ первомъ заражении. Язвы, въ сихъ мъстахъ появляющіяся, сушь птакъ злосвойственны, какъ шъ, кои садашся на часши многими нервами снабденныя, каковы сущь: головка дъпгороднаго уда, узлочка и печуристыя тьла у мужщинь и женской удъ и миртообразныя сосочки у женщинъ; ибо понеже сін части плотнъе и чувственножильные суть, то бывають они и воспаленію, сожащію и боли наилаче подвержены, и мотушь вы последенний болье приняшь въ себя остроты; оныя же суть напрошивь того слабее и имвють менъе нервовь, почему и шанкеры не Ш 5

могушь вы оныхы такы сильно во спалиться, ни причинить такой боли, ни разывдать бливлежащихы частей.

Молодые люди как мужескаго, так и женскаго пола, особливо когда вы первой разы шанкеры получили, претерпывають при том сильное воспаление. Естьли си особы купно крыпкаго тылосложения и кы остроты склонны, то поражають они сы большимы свирытствомы, нежели какы то дыльють они вы слабыхы и холодныхы сложенияхы.

Иногда имъетъ больной телько одинь или два шанкера; но которые естьли запущены будуть, надълывають довольно работы. Другіе имъють напротивь того множество сихь водяных в пузырьков на головкъ и покрывающей оную кожицъ, которые; естьли прорвутся, сливаются; ежели случится при том в незалупа, то какъ головка, такъ и крайняя плоть вскоръ покрываются язвами; а естьли существуетъ неотлупа, то Ангана

тонов во опстоять, и должно стараться оныя предварить. Ежели головка покрыта многими язвинами, то без в потери существа, особливо в вынца и уздочки ръдко обходится.

Естьли на патыкъ шанкеры находятся, то бываеть изв оныхв обыкновенно сильная течь, особливо естьли они малы и многочисленны суть; сте есть можеть быть кожная гоноррея Аструка; да и подлинно есть гноеватая течь въ гонорреи не что иное, какъ течь изв язвы, въ мочевомъ каналъ находящейся.

Доколь шанкерь вы первомы его элосвойстви пребываеть, то существо вы томы мысть, гдь находится язва, вскорь разрушается; оны проницаеть вы существо часто такы глубоко, что разывдаеть кровавые сосуды и причиняеть сильное кровотечение; края онаго становятся мало по малу грубыми и затвердылыми, а изы одна онаго выростаеть дикое мя-

со, которое не только наполняеть язву, но часто выходить сверьхь поверхности, и навывается тогда мясистою бородавкою. Когда сте случится, то язва по настоящему не есть уже шанкерь; оно пртемлеть на себято тоть, то другой видь и получаеть по оному разныя наименовантя, о чемь ниже пространные говорить будемь.

Шанкеры, находящиеся на женском удь, на дътородных губах в, въ миртообразных в сосочках в и внутри маточнаго влагалища суть также затруднительны, как в и на мужеском в член в; они разрушают в большую часть существа прежде возрождени въ них в дикаго мяса. Однакож в суть си мясистыя бородавки далеко не так вредны, как в обыкновенно думают в, и я тверло увърен в, что многи средства, противу сего благаго дъйстви Натуры употребляетыя, для многих в больных в вредны были.

Шанкеры имъють вы себв изь жсьхь другихь дысшей, оказываемыхь Венерическимь ядомь, по осо. бенное, то они, пока пребывающь вы вакомв состоянии, болье подходяшь къ ракообразнымъ язвамъ, нежели другая какая язва, и что они кремъ ртупных в приголовлений почти всв другія презирають, да и самыя сін должны бышь употребляемы съ великимъ разсмотрънјемъ. Шанкеры садятся также и на железистыя часпи; а поелику строенте рта имветь великое сходство съ строенјемъ дътородных в частей, то и происходяшь обыкновенно у людей, любоспрастною бользные зараженых в, шанкерообразныя язвы вы горшани, вы роту, на языкъ и близлежащихъ частяхв, гдв естьми онв не будуть предупреждены, могушь причинить великой вредь, какь мы ниже сего увидимь.

Есшьли шанкеры воздимъю требывание свое на крайней плоти и на вившнемъ покровъ мужескаго чле-

на, то распространяють часто ядь свой далье, от в чего и происходять шанкеры вы такь, на шулятахь и на вадниць; однако же рыдко пребывають они вы сихы частяхь долго влосвойственными, а дылаются скоро масистыми бородавками.

Едва ли нужно напомнишь то, что шанкеры заразительны суть, поелику ядь является вь оныхь вы величайшей остроть своей. Оны находится вь оныхь такь какь вы гонорреи, и расположение тыла и острота яда причиняють вы дыйстви онаго великое различие.

Много бы можно было сказать еще о шанкерахв, но не дозволяють предвлы нашего трактата входить далье вв разсуждение обв оныхв. Однакожв мы упомянемв еще нъсколько, когда будемв говорить о пользовани оныхв, гдв и постараемся довольно доказать, что употребление вдкихв средство совсьмы не пристойно, что онь заслуживають изключены быть изв числа Хирургическихв

средствъ, и что онъ столько же вредны, какъ и прижигательныя оруділ.

О хордъ им струнообразномо напряжени и станихъ, ими привимъ.

Дътородныя орудія имьють подь мясистыми частями твла нашего наимножайшіе нервы; почему и не удивительно, что онв весьма чув. співительны супь. Особливо состоить мочевый стволь изв сплетения нервовь и сосудовь, между кошорыми мокрошныя железы находящся. Стя мокрошныя железы служать наиначе къ охранению нъжныхъ неововъ; и такъ естьли оные нервы не только фишены будушь сего охраненія, но и охранители учинятся ихъ раззорителями, то должны онъ непремънно раздражать ихв, причинить вв нихв боль и воспаленіе. Буде же существуеть купно разлучение частей, потеря существа и воспаление, то должно произойти сожаще, вы которомы случав смежные сосуды ощекають и слъдственно сокращаются. Таковый

случай бываеть при струнообразно 33 напряжении.

Когда мужескій уді напрагается, то волокна, от уздочки ко съменнымо хранилищамо идущія, разширяются; от сего разширенія сообщается щекотаніе плышки при соитіи со большею силою съменнымо орудіямі, для отправленія работы при изліяніи съмени. Сіе напряженіе уздочки весьма примытно и причинаето во здоровомо состояніи не малое удовольствіе; но естьли присоединится струнообразное напряженіе ко недавно произшедшей гонорреи, то происходить изліяніе со довольно примытною болью.

Чъмъ сильнъе въ стволъ восжение, тъмъ сильнъе бываеть напряжение и тъмъ большую причиняеть оно боль. Боль становится еще чувствительнъе от присовокупляющейся станихи, которая противное напряжение причиняеть, а иногда дълается боль столь несносною, что больной старается подавливать мужеский удъ

внизв, отв чего и чувствуеть нъкоторое облегчение.

Струнообразное напряжение бываеть обыкновенно вь нижней части. мочеваго сшвола, причиняеть опухоль въ фибрахъ покрова онаго, простирается часто до печуристыхъ швлв мочеваго ствола и оставляеть вы ономы зашвердьлосии, которыя естьли ивсколько времени продолжаш. ся, не очень удобно истребляются. Но иногда садится гоноррея по сторонамъ мочеваго ствола, и тогда изгибается удв на ту сторону, гдв находится ядь, или на право или на лъво, а инсгда и въ верхъ. Однакожъ не всегда причинаетъ мъстопребывание гонорреи таковое искривленіе; иногда восженіе распространяется, и ядь дъйствуеть на клетки печуристых в таль двтороднаго уда, сжимаеть оныя и оставляеть вы нихъ на нъкоторое время затвераьлыя опухоли.

Струнообразное напряжение прекращается купно съ воспалительны-Часть II.

ми припадками: ибо как в скоро опухоль въ сихъ частяхь опадаеть, що бываеть возстание уда также свободно, какъ и прежде, развъ полько что часть существа утрачена; но вь такомь случав части болье и болъе разширающся и пошеря въ скоромъ времени награждается. Легко судинь можно, что от усилія волоконь, претерпъпнаго онымь во время восжентя от разширентя и сожашія, можешь произойши вы сихы частяхь разслабленіе; почему и бываеть часто сабденвиемь сего упорная шечь, сопровождаемая не произвольным в истечением в съмени; а поелику упругость частей при семь весьма ослаблена, то бываеть дътородный удь при опаденти толще обыкновеннаго, и возстание онаго не происходишь уже съ шакою крыпостію, как прежде.

Что учиняеть хорду столь чувспівительною, есть опухлое возстаніе уда, которое сколь и непріятно, однакожь всегда сопровождаеть оную въ большей или меньшей степени и жестокости оной соотвътствуеть; сте есть Венерической пртапизмо. Но по моему мнънтю имъеть оный совствив другое свойство, нежели то безпрестанно продолжающееся напряженте уда, каковое приписывають Пртапу, который въ Лампсакъ въ малой Азти обожаемь быль, и отъ коего получиль оный свое наименованте. Какъ бы то ни было, Врачи разумъють подъ названтемь пртапизма невольное и болъзненное возстанте уда, коего свойство мы здъсь разсмотримь.

Не смотря на многія Физіологическія изъясненія, учиненныя о возстаній уда, опасаюсь я, что наисущественнъйшее при томъ еще не извъстно; то правда, что когда кровавые сосуды отдъленнаго отъ тьла мужескаго члена ининцируются, то оный какъ въ живомъ состояніи напрягается: но сего не довольно, ибо тайность напряженія состоять въ продолжительности. Прижатіе кровавой жилы къ лобковымъ костямъ ничего не объясняеть; ибо ни придавление, ни отведение онаго не дълаешь въ семь никакого различія; сверхъ того въ прјапизмъ и ни маавишей боли вы сихы частяхы не ощущается. А въроятнымъ кажется то, что весь дътородный удь въ ономь содъйствуеть; ибо вь пріапизмъ чувствуется такъ какъ будто оный руками сдавливается, и сте давленте простирается от в сжиматель. ной мочеваго пузыря мышки до устья мочеваго ствола. Что мышки дъщороднаго уда имъють въ напряжении онаго участве, есть очень явственно; но я не понимаю, какимъ бы образомъ были онъ въ состояни всему оному содъйствовать; а можеть статься имьють онь и очень малое въ возстании участие. Въ слъдствие сего думаю, что подвемлющія мышки должны почтены быть какв помочи, а ускоришельная мышка какЪ лигаменть, и что возстание производишся наипаче посредствомъ особеннаго строенія нервнаго и волокнистаго существа печуристых в дътороднаго уда шълв и кровавой онаго жилы, отв чего кровь вгоняется вв печурки, и въ оныхъ замыкается. Правда, что судорожное сожащие и опухоль, особливо вв воспалительномв пріапизмв, онушается въ заднепроходной промежности, и что ускорительная мышка кажешся быть сильно сожатою; но спрашивается, не причиняется ли сте сожащие раздражениемъ восженнаго уда. Я объявиль уже выше нъкоторым в образом в мысль мою вв разсужденій сего, а місто не дозноляеть мив завсь извисниться столько, сколько бы хошьлось.

Но то върно, что напряжение болье посредствомъ нервами изобилующаго существа мочеваго ствола и прочихъ дътороднаго уда частей, особливо около съменныхъ хранилищъ находящихся производимо бываеть, нежели посредствомъ раздражения самыхъ мускуловъ; а наипаче въ злосвойственномъ воспалительномъ при-

апизмъ, въ коемъ, по моему мнънию, мышки мало имъють участия.

Изв средствв, кв любострастію побуждающихв, суть Шпанскія мухи неоспоримо наисильныйшія; и есть примыры, что онь такое любострастное воспалительное производили бытенство, что больные во время сонпія умирали.

Прјапизмъ бываетъ опасенъ, когда нъсколько времени безъ облегчентя предолжаешся; ибо поелику въ семъ случав обращение крови накоторымъ образомъ воспрепящствовано, то легко можешь оный перейши вы Аншонов огонь, причининь во всем в штль конвульсти, совершенное дътороднаго уда омершавние и самую даже смершь. Сверхв того чувствуеть больной обыкновенно послъ сильнаго прізнизма еще долгое время слідствія онаго; части учиняются будто онъмълыми и больной находится не въ состояни удовлетворить себъ совокуплентемв.

Обще утверждають, что вы продолжений пріапизма не бываеть похоши къ любострастію, но сіе только от в части правда; ибо вв начал в и въ междувременіяхъ сильнаго пріапизма дълается иногда настоящее истечение съмени; но вскоръ послъ истеченія бываеть больной, когда имъется опухоль, мучимъ прежестокою болью, особливо когда присоедянишся купно струнообразное напряжение, а еще болье, когда существуеть неотлупа. Изліяніе съмени еснь при соиніи переломъ удовольствія, и продолженіе совокупленія становится бользыеннымь: тожь самое происходить и въ прівнизмъ. полько въ высоча тей степени: одуразенся и при ономъ накоторое удовольствие, но по незчастию следующая посль шого боль превышаеть оное несравненно.

Nocet empta dolore voluptas. Hor-То есть: Болью купленное удовольствие вредно.

Наказываемые розгами претерпъвають сильную встаниху, кото рая даже изліяніемь съмени сопровождаема бываеть; и каждый ударь, получаемый преступникомь посль изліжнія, причиняеть ему большее мученье, нежели вста полученные имь прежде: от сего происходить обморокь; и естьли таковыя изліянія жесточайтимь образомь повторены будуть, то часто случается, чтотаковые преступники во время наказанія умирають.

Чтож в касается до воспалентя, сопровождающаго встаниху, от венерическаго яда произшедшую, или внутренними и наружными кв любострасттю возбуждающими средствами причиненную, естьли части сильно будуть сжаты и естьли какв съменныя хранилища, такв и сжиматель-

ная мочеваго пузыря мышка судорожно замкнушся, шакъ что ни кровь надлежащимъ образомъ обращаться, ниже съмя и моча испущены бышь могуть, то находится больной въ плачевномъ состоянии: дътородный удь вы семь случав сильно опухаеть и дълается жгущимь, притомь столь чрезвычайно чувстви. тельнымв, что больной прикосновенія къ оному болье страшится, нежели самой смерши; Антоновъ огонь уже не далекъ, омершвънје приближается и жизнь больнаго находится вь опасности, хотя бы и учинено было отнятіе омертвълой части, какъ единственное для избавленія средство.

Что бываеть у мужщинь струнообразное напряжение, то бываеть у женщинь сожатие вы той или другой сторонь маточнаго влагалища, при чемь претерпьвають онь временно не малую боль. При пизмы удобно можно сравнить сы бышенствомы матки: ибо что оное можеть часть II. причинено быть Венерическим в ядом в в в том в не противор в чательные наблюдатели бол в зней.

Въ воспалительномъ состоянти гонорреи бываетъ обыкновенно наружаная опухоль дътороднаго уда, сопровождаемая сильнымъ зудомъ и повождениемъ къ любострасттю. Какъ скоро маточное влагалище воспалено и входъ онаго сильно сожмется, то и соитте бываетъ болъзненно.

Что къ любострастію возбуждающій средства столькожь сильно дъйствують въ женскомь поль, какъ и въ мужескомъ, и что оныя столькожь для нихъ вредны бывають, есть дъло извъстное; но я въ молчаніи обойду оныя: пселику объявленіе оныхъ легко моглобы навлечь на себя большее злоупотребленіе, а сверьхъ того и не касается сте до нашей цъли.

Вообще суть хорда, пріапизмі, стівсненіе маточнаго влагалища и устья онаго, и сожатіе миртообразных в сосочков в воспалительные припадки недавно произшедшей злосвойственной гонорреи, которые ръдко
бывает в трудно отвратить, естьли
надлежащим в образом в пользованы
будутв. Однъ примочки произвесть
льчене не в состояни, а надлежить прежде укротить ядь; каким в
образом в можно произвесть с с скорым в надежным способом в, покажем в ниже сего. И так в приступим теперь к в разсмотрънно зла совсъм в другаго рода, которое однакож в в состояни оказать столькож в важныя слъдствия.

## О бубонах в или паховиках в.

Слово: бубонъ есть Греческаго происхожденія и значить опухоль вы паховыхь железахь. Почему весьма ошибаются ть, кои опухоли подплечныхь железь, железь слиноточивыхь и т. д. дають наименованіе бубона.

Бубоны бывають четырехь родовь, а именно: Венеритеские, пестиленціальные, цынготные и золотушные. Мы имбем'в здась дало св Венерическими; точное изсладованіе их в натуры сдалаеть насв вы состояніи отличать оные отв прочихв, поелику имбють они вы себь весьма много карактеристическаго.

Паховики Венерические могуть раздълены бышь на два класса, а именно: на недавно произшедшие или такіе, кои отв перваго зараженія происходящь и лотайные или такіе, кои посредством в втораго зараженія причиняющся и бывающь всегда характеристическимъ признакомъ заксснълой любострастной заразы. Подъ первымъ родомъ разумъемъ мы шакте паховики, кои въ то время появляются, когда еще Венерической ядь бываеть мъстнымь; последние же разсмотримь въ другомъ мъстъ, понеже оные от других примътно отмичаются. Бубонамъ и мужщины и женшины равно подвержены; и хошя булушь они недавно произшедште мли пошайные, однакожь сушь припадки и продолжение оных вы обоих в полах в совершенно одинаковы. Но вырэмпнымы образомы производящы темпераменты и пылосложения ныкоторое различие.

Бубонь, недавно полвившійся, можешь произойши или непосредственно послъ нечистаго соитія, прежде нежели ядь другимь образомь окажешся, или происходишь онв шакже ошь переселенія яда съ другаго мъста. Первый родь происхожденія очень ръдко приключается, а именно по двумъ причинамь: ибо естьли ядь во первыхь въ другой части тьла какь въ мужескомъ дътородномъ удь и машочномь влагалиць засядеть и оною восприемленися, вто входишь оный въ кровь и обращается сь оною, прежде нежели вь сихъ железахь или вь другой какой либо части поселится; а во вторых в приключается оный редко такимв, которые совокупление естественным в образомъ совершають, но обыкновенно машинистамь, содомитамь и отрокоблудникамь. Послъдній родь происхожденія бываеть обыкновенные, а именно: когда ядь при опухоли или при существующихь щанкерахь крайней плоти, тайныхь губь и т. д. или вь злосвойственной гонорреи посредствомь сукровичныхь сосудовь вь паховыя железы приносится.

Аюбострастный паховикь бываеть обыкновенно сопровождаемь такими припадками, которые довольно отличають оный оть другихь паховиховь; а иногда случается, что онь сь ними весьма много сходствуеть, однакожь нечистое соите и другіе предществующіе оному припадки представять дёло вскорь вь надлежащемь его видь.

Не давно приключившійся паховикь, от перваго ли произошель зараженія безь предшествующихь другихь припадковь, или от вошедшаго внутрь яда при остановившей ся течи, оказывается слъдующимь образомь: больной чувствуеть вы одномы или вы обоихы пахахы нько-

терую тугость, тупою болью сопровождаемую; въ правомъ или лъвомъ, а иногда вь обоихь пахахь ощущается небольшая шугая опухоль, кошорая бываешь сначала съ горошину, но мало по малу увеличиваентся; снаружи не видно ни воспаленія, ни нагноенія, но вскоръ послъ ощупанія сшановишься опухоль шуже ичувствительные. Она получаеть мало по малу величину оръха, боль дълается чувствительные и иногла быющеюся; больной получаеть воспалительные припадки, чувствуеть слабость во всемь шьль, боль вы головы и поясниць, жажду и пт. д.

Вольной начинаеть искать помощи, и естьми надлежащія средства употреблены булуть, но бубонь легко разбивается; но ложныя понятія сдълали слишкомь общественнымь правиломь то, что будто надлежить стараться привесть бубонь вы нагноеніе, оный проръзать и держать долгое время отверзтымь, дабы истребить весь ядь. Сего ради. совътують больному употреблять всякую питу и питье, дълать сильное движение и все, что служить къ увеличиванию воспаления и нагноения; но сие значить вливать въ огонь масло, вмъсто того, чтобъ оный тушить.

СЪ намъреніемъ ли или тълосложеніемъ больнаго приведень будеть бубонь въ нагноеніе, то опужоль, боль и прочіе припадки увеличиваются; опухоль достигаеть часто до величины голубинаго и даже куринаго яйца, и дълается красною и синею; наконецъ возрождается гной и зыбленіе онаго ощущается.

Бубонь достигь теперь своей зрёлости, воспалительные припадки уменьшаются и великая чувствительность нёкоторымь образомы притиупляется; вмёсто того, что быль оны прежде тугь, становится теперь мягкимы, а особливо во возвышенномы его мёсть; туть бываеть оны наименье чувствителень, и имъеть совсьмы другой цвыть, какы-

жо красноватый, синеватый, а иногда и желтоватый.

Теперь можно оный вскрыть; когда сїе учинено будеть надлежащимь образомь, и оный послъ порядочно врачуемь будеть, то излъченіе скоро послѣдуешь. Но я не понимаю, что побуждаеть Лъкарей дълашь отверзтве посредствомь Бакихь средствь: ибо и разумь и опыть сему мешоду противоръчать. Можеть быть, что нечаяннымь обравомь и удалось сте разь безь вреда; но сколь великой вредъ причиняетъ открытие бубоновь посредствомь вдкихь средствь, знають они, можеть быть, болье, нежели какъ признаться въ томъ дерзають. И я осмѣливаюсь ушвердишь, сколь ни дерзко покажется таковое утвержденіе, что от неискуснаго пользова. нія болье людей получили Венерическую заразу, нежели отв самаго яда...

Пока первая степень продолжается, то бубонь удобно разбиъ 5

вается; и св твхв порв, какв узналь я неудобность обыкновеннаго способа, разбиваль я оные съ благополучнымо успъхомо даже и шогда, когда уже зыбление гноеватой матерїи существовало. Я очень еще хорошо помню, что я хулиль прежде таковый поступокъ, почему и ожидаю сего теперь от других ; только не ожидаю сего от опышнаго и предразсужденій чукдаго Абкаря, особливо естьли онь всегда благоразумно дожидался до тугости бубона, прежде нежели предпринималь оный вскрывать, поехику я увърень, что онь находиль иногда, что бубонь еще сверьх в чаянія его разбивался.

Но когда уже настоящій гной скопился и бубонь созрыдь, то надлежать оный для выпущенія гноя в крыть: ибо естыли Лікарь сего не сдвлаеть, то учинить сте натура. Но тогда не стараюсь я увеличивать вло начиненіемь рану корптею, или произведентемь упорной и вдкой язвы,

когда сама натура старается о соединенти и заживленти разлученных в частей.

Должно, чтобъ соки больнаго крайне испорчены были, когда новопроисшедшій бубонь надлежащимь средствамъ сопротивляется; и я подлинно не знаю другаго Венерическаго недуга, который бы такв легко выльчивался. А какъ ни съ какими железистыми частями шутишь не должно, то имъетъ худое пользование и въ семъ случав неблагопріятивищія следствія: ибо не только можеть произойти оть того фистулозный, скирроватый и ракообразный бубонь, но и самая Венерическая возродишься зараза. Любострастный ядь не успокоивается подобно огню, пока еще мальншая искра остается. Какъ скоро паховик в появится, находится больной на краю вшораго заражентя; и изъ десяти, получивших в любострастную заразу, имъютъ оную навърно девять от неприличного пользовантя

бубона. Естьли паховик неосторожным образом разобьется, не уничтожа купно съ оным в яда, то вгоняется оный въ кровь, или въ другуюкакую либо часть, въ обоих случаях суть слъдствія явственны.

Что надлежить до свойства новопроизшедшаго любострастнаго паковика, то имъетъ онъ пребывание свое въ шаровидныхъ сукров чныхъ паховых в жельзах В Но каким в обравомь досшигаеть ядь вь оныя? Еспьли приключится бугонь безь предшествующих в припадков в гонорреи послъ нечистаго соитія, то происходить оный такимьже обравомь, как в гоноррея, внашийя опухоли, шанкеры и ш д. посредствомъ всасыванія вскоръ посль изліянія съмени. Можно прошиву сего возразишь, чио когда сте шочно шакъ произходить, то для чего же не всегда сте дълается? и для чего не произжодишь бубонь купно съ обыкновенвыми припадками? Здъсь должны мыл замъщить, что въ томъ мъстъ, тав в экономіи животных в наибольшее раздражение бываеть, тамо и сильнъйшее соковь пришечение слъдуеть; и такь, понеже мужескій удь и маточное влагалище наиболье обнаженны сушь, то ядь весьма удобно къ онымъ прилъпляется и на оныя дъйствуеть; почему и накопляется всосанный ядь напудобные вь шыхь частяхь, кои наиболье раздражаемы были. А хотя мужескій удв и маточное влагалище от в яда свободными остануния, однакожъ сушь прочія части, особливо паха подвержены Венерическимъ испареніямъ, которыя посредствомь железь оныхь всосаны, или другимъ образомъ въ кровь принесены бышь могуть, сь которою и ядв купно обращается, пока вв той или другой части засядеть. А поелику паховыя железы сущь наиближайшія, то тьмъ способнье бывакоть онъ кв воспріятію онаго; но инстда оказывается оный прежде въ подплечных в железахв, на шекакъ и въ слиноточивыхъ желе захъ, въ такомъ случат надлежитъ немедленно стараться остановить зло: ибо Венерическая зараза большими шагами приближается и угрожаетъ бъдствомъ и опустошентемъ.

Но когда приключается паховикЪ оть прекратившейся гоногреи, оть вогнаннаго внутрь яда шанкеровъ, или опухоли ядерь, то происходить сте другимь образомь. Ежели имъеть кто влосвойственную гоноррею, и изтеченію онаго какимь либо способомь воспрепяшствовано будеть, то должень ядь удалишься или вь пахи, или въ другія части. Сїе приключается или отв простуды, когда кровообращение воспящается, отв незапнаго нападенія озноба и жару, или ошь сильныхь душевныхь движеній, гивва, спраха, испуга и п. д., отв чего ядъ посредствомъ скораго сожатія частей вгоняется внутрь. Но столькожь часто происходить сте и оть худаго авченія, кровопусканія,

сильных слабительных вяжущих впрыскиваній и т. д., когда не стараются купно о истребленіи яда; да еще вы такомы случать счастіе для больнаго, когда вогнанный яды причинить только бубонь.

Для чего вогнанный внутрь ядь приемлеть такь часто убъжище свое кы паховымы железамы, не такы легко изыяснить можно, какы нькоторымы думается. Всего выроятные есть то, что любострастный яды достигаеть туда во время остановившейся гонорреи посредствомы сукровичныхы сосудовь.

Паховыя железы распространяють сукровичные свои сосуды вы тайныхы частяхы, такы какы подплечныя железы, имыющія сы оными сходство, дылають то вы грудяхы; и какы ты, такы и другія подвержены бывають опухоли, какы скоро сосуды ихы повредятся; почему и пріємлють подплечныя железы вы вожженіяхы грудей участіе вы судорожныхы сокращеніяхь, опухають и кръпнуть, воспаляются, гноятся, содълываются скирроватыми и даже ракообразными; равнымь образомы м любострастный ядь также способень распространиться по разнымы къ срамоть принадлежащимь частямь обеего пола.

Что железы иногда въ лъкомъ, иногда въ пракомъ, а иногда и въ обоихъ пахахъ Венерическимъ ядомъ поражающся, бываетъ только случайно.

Паховикъ оказывается мало по малу безъ сильной боли и безъ виъшняго вожженія; сїе происходить нашпаче отв того, потому что ядъ поражаеть железы внутри, а не снаружи; и по тому, что волокна оныхъ хотя и суть чувственножильны, однакожъ не напряженны, почему и растяженію удобнье уступають; но какъ скоро бубонъ увеличится, то разпространяется также и воспаленіе, раздраженіе и боль усиливаются, пока внешній покровь оныхъ будеть разівдень.

Однакож в бывает в продолжение бубона различно: у нъкоторых в прибавляется он в очень медленно и причиняет в мало боли; у других в возрастает в он в против в того скоро и сильным в воспалением в сопровождается; у иных в он мяток в и водяниет в, у других в напротив в того кръпок в и скирроват в. И так в он в соображается спачала обыкновенно с в тълосложением в болящаго.

У женщинь и у особь, слабыя волоши имъющихь, возрасшаеть бубонь обыкновенно скоро: сначала мало болить, но вскорь увеличивается и наполняется гноемь. И естьли онь или самь собою про в тея, или надлежащимь образомь проръзань будеть, то вы скоромь времени опять заживаеть; но естьли учинено сынимь будеть много пачканья, то можеть онь легко содълаться водянистымь, упорнымь, гнилообразнымы и для всего тьла вреднымь.

У мужщинь и имвющихь плопоныя волокна возрастаеть бубонь Часть II. медлиенъе, бываеть кръпче, чувствительнъе и труднъе приводится въ
нагноенъе. Они претерпъвають весьма много от неискуснаго лъченъя,
особливо когда мучать ихъ гноящими и ъдкими средствами и т. д.
Окръплые скирроватые бубоны, пли
фистулозныя ъдкъя и ракообравныя
язвы бывають кромъ Венерической
заразы весьма часто слъдствемъ таковаго лъченъя. Однакожъ дъло зависить въ семъ весьма много и отъ
сложенъя тъла.

Времени произхождентя, проделжентя, разрышентя и нагноснтя бубона опредылить не льзя. Оно происходить иногда чрезь одинь или чрезь два дни послы нечистаю соиття; а иногда протекають и цылые мысяцы, прежде нежели оны ноявится. Иногда приключается оны вы началы гонореи, иногда при концы оной; и есть примыры, что оны еще вы то время приключался, когда больной почиталь себя совершенно оснобожденнымы оты яда. Бубоны созры-

ваеть иногда вы продолжении четырехы, шести или осьми дней послы своего возрождения; а иногда продолжается сте цылыя недыли и даже мысяцы. Послыднее происходить обыкновенно оты неискусного пользования. Но вообще зависить продолжительность бубона оты сложения и образа жизни болящаго, а наипаче оты способа, ко уврачеванию онаго употребляемаго.

Теперь остается еще объявить признаки, посредством в которых в Венерической паховик отличается от в не Венерическаго.

Венерической паховик в оказывается небольшою зерновидною опухолью паховых в желез в, кошорах тугостью и шупою болью, при нарощени паховика усиливающеюся, сопровождается; бубонь приемлеть продолговато - круглый вид в и достигает величины голубинаго или куринаго яйца, становится мало по малу мягче и поверхность онаго безпорядочною, больже и вожжение пребывающь; наконець пропадаеть онь мало по малу, или возраждается вы ономы зыблющаяся матерія, или дылается оны крыпкимы и скирроватымы.

Моровые желваки во времена наши въ Европъ не приключающия; изъ описантя оныхъ явствуетъ, что они весьма много разнятия отъ Венерическихъ. Они оказывающия жестокимъ, злосвойственнымъ, антоноогненнымъ и крайне бользненнымъ воспалентемъ. Естьли оные не перейдутъ въ скоромъ времени въ нагноенте, которое однакожъ бываетъ по больтой части злокачественное, то уже вокругъ себя поражающее омертвънте содълываетъ жизни больнаго конецъ.

Что надлежить до золотушных бубоново, то имъють они великое сходство съ Венерическими, а наипаче съ потайными; и хотя не имъется здъсь ничего Венерическаго, однажожъ суть они столько же вредны. Въ разсуждени лъчения не дълаю я

въ семъ никакого различія, и бывають. И въ самомъ дъль одно только происхожденіе дълаеть между ими различіе. Къ сему роду бубоновь причисляются, хотя несправедливо, и ть желваки, коимъ отроки и дъвицы при приближающейся возмужалости подвержены бывають; но сій бывають обыкновенно не столько важны и удобно отвращаются, хотя и суть они весьма чувствительны вожжены, и очень скоро возрастаноть, чрезь что удобно можно откличить оные отвъ Венерическихъ

Пынготной бубон сам по себъ едва имъеть нъкоторое сходство съ Венерическимь: ибо естьли окажутся у больнаго цынготные желваки, то бываеть онь обыкновенно слабь и тъло его пятнами усъенно, возращенте ихъ бываеть медленно, и хотя они въ началъ не очень чувствительны, однакожь вскоръ таковыми и купно весьма упорными становятся; они

ни удобно разръшаются, ниже порядочно гноятся; весьма также трудно, когда они и вскрыты будуть, привесть ихъ къ порядочному нагноентю; они имъють мертвой видь и източають жидкую сукровицу.

Что ни сказано въ разсуждени Венерическаго бубона для различения онаго от прочихъ родовъ, однакожъ можеть существовать въ больномъ смъщение острыхъ соковъ, которые состояние онаго перемънить могутъ.

Опышный Врачь не смышаеть грыжи съ Венерическимъ паховикомъ; но поелику имъются примъры, что она съ оными отъ младыхъ и неопытныхъ Врачей перемъщена была, то сообщу здъсь признаки оной.

Мъстопребыванте паховой грыжи есть весьма различно от мъстопребывантя бубона, а именно: грыжа проходить сквозь отверзття косых и поперешных в брюшных в мышекв, гдъ какв несовершенная грыжа и остается не входя въ шулята, бубонъ

напрошивь того находится вь пахахb. Паховая грыжа (bubonocele) приключается по большой части отъ сильнаго напряженія, почему и появляется скоропостижно. При вынаденіи сальника (epiplocele) дълается мягкая опухоль, кошорая легко виравляется, когда больной ляжеть на спину. Кишечная грыжа (enterocele) происходишь, когда часть кишки выдавлена и ущемлена будеть; она бываеть иногда очень опасна: ибо естьли выпадшая часть не скоро вправлена будеть, то грыжа напыщается и производить часто противное червообразное движение кишокъ, отъ чего приключающся колики, овоща и другіе опасные припадки. ИзЪ вышепомянушаго можно уже удобно ошличишь грыжу от всякаго рода бубона. А сверьх в того отличается грыжа примъшно от онаго и въ разсуждении вида и осязанія; оная похожа на пузырь и имъемъ власно голову и шейку, а сей повсюду тугь; а естьли онь вь которомь мысть мягокь, то

бываеть обыкновенно на верьку онаго зыбление гноя ощущаемо.

Наконедъ можетъ и аневризма (разтиренте или поврежденте) бедренной боевой жилы истинная или ложная почтена быть отъ неопытнаго Врача за бубонъ: но въ такомъ случать бываеть опухоль съ самаго начала мягка, при давленти пропадаеть, и отущается въ оной явственное бтенте, чъмъ и отличается она примътно отъ бубоновъ.

Довольно сего о любострастных в бубонахв, пока ядв пребываетв еще частнымв. Чтожв касается до бубоновь, которые происходятв, когда уже ядв далье распространился и учинился повсемственнымв, то предпріямемв ниже разсматриваніе оных в; а теперь приступимв кв изслюдованію.

## Опухоли ядрб (hernia humoralis).

Между различными дъйствїями, причиняемыми Венерическимъ ядомъ, иътъ ни одного такого, которое бы

толико низлагало подрость больнаго, как в непрічиные припадки, сопровождающ ї опухоль и воспаленіе одногомли объихь ядерь. Больной не только мучямь бываеть болью, иногда чрезвычайно жестокою, но и душа его находишся шакже, пока участь его еще не ръшена, въ величайшемъ безпокойстви; ни въ какомъ Венерическом в недугъ не бываеть сте такъ примъщно какъ въ семъ. Сте есть внушение природы: ибо никто ничего шакъ не спрашится какъ обезмужалости. Да и случай сей есть весьма важень, и никакой мышкошности не терпить.

Опухоль вы ядрахы происходить оты такихы же причины, которыя бубоны причиняють, и можеть также различнымы кончиться образомы; но она бываеты всегда большимы затрудненйемы, болью и опасностью сопровождаема. Во первыхы можеть оная произойти оты яда, при нечистомы соити полученнаго, который, когда не остановится вы мочевомы

стволь, проходить или въ съменныя хранилища или въ другіе съменные сосуды, и оттуда онымъ сообщается, или прилъпляется снаружи къ шулятамъ, откуда удобно достигаеть и вь самыя яички. Во вторых в приключается она отвостановившихся или вогнанных в внутрь гонорреи, бубома, шанкера и ш. д.; въ третьихь оть самой любострастной заразы. Въ первомъ родъ бываетъ она существенная; во втором в припадочная; а третій служить характеристическимь признакомь заразы. Какого бы рода оная ни была, однакожь произшествие оной всегда опасно и время терять при томь не должно.

Естьли кто получить любострастный ядь во время нечистаго соитя, то оказывается обыкновенно гоноррея; и такъ естьли ядь или оть сильнаго движентя, оть простуды или оть неискуснаго лъчентя вгонится внутрь, то можеть оный удобно направить ходь свой къ ядрамв, кв паховымв железамв или къ другой какой либо части. Естьли приключится сїе прежде, нежели окажения оный снаружи, то шъмъ менъе бывають тогда ядра отв зараженія безопасны, особливо когда оный причиниль уже язвы и воспаленіе. Общее мивніе есть, что опу--сыханоп отого приключается, что въ течени его изъ съменных вранилищь въ мочевом в стволъ воспрепятствованное зараженное съмя въ относящихъ съменныхъ сосудахь накопляется, а оттуда сообщается захряслость ядернымЪ сосудамъ. Сте иногда произойши можеть, однакожь оное по моему мнвнію: бываеть не часто, ибо во первых ръдко случается, чтобъ гоноррея въ съменных в сосудахъ засъдала; во вторых в находим в мы, что когда таковый случай приключится, то ядъ также удобно устремляется къ паховымъ железамъ, а оттуда приходить уже кь ядрамь, или возвращается от ядерь и причиняеть b 2

бубонь, а иногда и то и другое; вы третьихы извыстно изы опыта, что танкеры, не смотря на небыте гонорреи, причиняли часто опухоль вы ядрахь. Когда же яды предпремлеть путь оты сыменныхы хранилицы чрезы относяще сосуды вы ядра, то дылаеть оный на пути своемы больному обыкновенно нько-торое напоминовенте.

Но вообще суть дътородныя орудля какъ въ мужескомъ, такъ и женскомъ полъ такъ со-денены и сцъплены между собою, что ядъ можетъ различнымъ образомъ переходить отъ одной части къ другой; то есть, онъ можетъ не только посредствомъ сукровичныхъ сосудовъ, кровавыхъ и боевыхъ жилъ, нервовъ и мясистыхъ голоконъ внутреннихъ и наружныхъ частей, но и посредствомъ пртуготовляющихъ съменныхъ сосудовъ разпространенъ быть.

Что надлежить до опухоли ядорь, от любострастной заразы происходящей, то приключается она, какь и всв другіе недуги оной, обыкновенно сама собою. Разсужденіе объ оной будеть преподано вы послъдующей Глявь.

Ньтв части вв твль человьческом втак в ньжной, так в особенно образованной и так в чувствительной, как в ядра; почему и боль бывает в в в оных в наижесточай так. Придавление яичка причиняет в такое мучение, коего никаким в образом в скрыть не можно. Никакая часть не подчержена столько Антонову огню и омертвыйю, как в самая си; и придавлению оной естьли не будет в подана заблаговременно надлежащая помощь, или часть си не будет в изгата, то может в в продолжение 24 часов в навлечь на себя смерть.

Первый припадок в гонорреи, когда начнешь ядь оказывать дъйствие свое, есть ползящее червообразное вы ядрахь движение, продолжающееся до тъх в порь, пока появится изтечение и ядь причинить язвы. Отсюду явствуеть, как в легко можеть ядь направить туда путь свой, и какъ чувствительны суть сїн части. И естьли бы не причиняло сїє купно довольнаго отдъленія, то претерпъвали бы оны г отв яда можеть быть гораздо чаще.

Опухоль въ ядрахъ, Венерическимъ ядомъ причиненная, начинается всегда всспаленіем в симпиюматическимъ, или не симптоматическимь. Что таковое восжение съ темпераментомъ и трлосложенјемъ соображается, можно легко поняшь изъ предыдущаго; сверьхъ того соотвътствуеть оное и образу, коимъ ядь вы стю часть достигаеть. Чымь ближе проникнеть ядь вь существо ядра, шъмъ менъе бываеть сначала боль, но тъмъ упориве и опасиве оный. Чъмъ ближе напрошивъ шсго засъдаеть ядь ко внышности, тъмь сильнъе бывающь при происхождении боль и воспаление, но штым в скорте и уступають употребляемымь средствамЪ-

Но дабы удобнъе можно было судишь о разных в ожесточениях в и исходах в оной, то разсмотрим в воспаление въ разных в онаго степенях в.

Больной чувствуеть сначала червообразное движение во одномо или вь объихь яичкахь, которое сперва не безпрестанно продолжается, мало по малу усиливается и превращается наконець вь безпрерывную, тупую и отпительную боль, незапнымъ колотьем' сопровождаемую, до подчревной части простирающуюся и поперегъ поясницы ощущаемую. Послъ сего начинает вичко распухать, дълается весьма чувствительным в и для болящаго крайне отпяготительнымЪ; а естьли не будетъ посредствомь подвязки поддержано, то сомнъвается больной въ снесени бользненной тяжести. Когда шулята надлежащимь образомь поддержаны, больной впрочемь здоровь и надлежащія средства употреблены будуть, то опухоль по малу пропадаеть. Естьли же сего не сдълается и восженте усилится, то воспаляются также и восходяще и относяще стменные сосуды, распухають и становятся чувствительными; почему воспаляется также и та часть, на конорой висить яичко и содълывается примътно чувствительною. Вольной получаеть лихорадку; бтенте въ яичкъ ощущается; шулята приемлють въ опухоли участе и настоить переломь восжентя, которое или разръщается, или оканчивается нагноентемь, Антоновымь огнемь, омертивънтемь или скирромь.

Нагноенте причиняеть много затрудненти: ибо оно легко производить фистулозныя, ъдкти и ракообразныя язым, хотя сначала, когда надлежащимь образомь пользовано будеть, и подаеть надежду къ совершенному излъченте.

Антонов огонь и наступающее омерть внас бывають опасны и угрожають больному погибелью. Буде восноследуеть скирры, то учиняется мико безполезною для больнаго тя-

жестью; наилучшее, что въ тэковомь и предшедшемь случав для больнаго сдвлать можно, есть, что в освободчть его вовсе от таковаго бремени.

Нагноенія можно ожидать, когда біеніе во время восженія существовало, и мало по малу ушихнеть, хотя величина янчка не уменьшишся, а шолько вечикая чувствительность притупится, когда въ тожь время янчко въ какой либо части содълается мягче, и зыбленіе гноя во ономо ощущено будеть. Нагноеніе можеть вь различныль мьспах в воспослъдовать: во первых в можеть оное существовать вь однихь только плевах в янчка, и тогда бываеть восжение припадочнымь; сте познается по скорому ходу воспаленія и нагноенія, а наипаче по вившней воспалительной опухоли. Во вторых в можеть пребывать язва в в яичном в барышкъ; въ семь случаъ воспаленіе не только происходишь скоро, но и бываеть сопряжено съ чрезвычайною болью, которая не только

въ яичкъ, но и въ восходящихъ сосудахъ, въ надчревной части и въ поясницъ ощущаема бываетъ. Наконецъ можетъ гной находиться въ самомъ существъ яичка, гдъ онъ тъмъ отяготительнъе бываетъ, чъмъ глубже находится.

Не неприлично, думаю, будеть упомянуть здъсь о мясистой грыжь; во оной оказывается мясистое вырощенте или во яичкъ, или во плевахо онаго. Буде находится оное
во яичкъ, то бываето или скирро-

вашаго или ракообразнаго свойства; а ежели находится вы плевахы, то бываеты обыкновенно зобообразнымы. Причиною сего бываеты обыкновенно придавление; однакожы можеты оная и оты любострастнаго яда возродиться. Какимы образомы сте происходить, будеты показано вы слыдующемы отдыления.

Какь скоро вь одномь или вь объих в ядрах в окажения воспаление, ошь чего бы оное ни произошло, то содълывающся оныя для больнаго безполезными, а особливо въ разсужденіи дъторожденія. Пока остается еще одно яичко здоровымв, то бываеть больной кь плодородному соиштю способень; почему и върояшно, что Природа снабдила мужескій поль двумя янчками, а женской двумя яичниками болье изъ предосторожно. сти, нежели изв другаго какого намъренїя. Но ежели у больнаго оба яичка воспалящея, учинящея скирровашыми и уязвленными, по способность отделения будеть вь оныхв воспрепятствована, и болящій содвамы зается безплоднымі, так в как в бы и вовсе оных в не имвлю. Что безплодіе и трусость не разлучны суть, есть опыть самый древній. Человік в охотно согласится для спасенія жизни своей лишиться одного яичка; но мысль лишиться их в обічх в, есть для крыкаго мужщины несравненно несносніе, нежели всв вымышленныя мученія инквизиціи.

Не излишне будеть объявить здъсь признаки, коими отличается опухоль въ ядряхъ от кишечной грыжи и водяной килы. Опухоль въ ядряхъ происходить мало по малу и бываеть болью и вося ентемъ сопровождаема; китечная же грыжа происходить напротивь того скоропостижно от сильнаго напряжентя, от убою или от другихъ подобныхъ случаевь, и бываеть иногда сопровождаема такими припадками, кои выше въ паховой грыжъ объявлены.

Что надлежить до водяной килы, которая есть настоящая водянка шулять, що межно оную равнымь образомь удобно отличить от опухоли вь ядрахь: ибо шулятный мкшокь бываеть вь оной чрезвычайно растянуть и опухоль имтеть мокротный и полупрограчный видь, и оставляеть на время впечашльнее от давленія пальца, или находять вь ономь посредствомь зрънія и осязанія зыблящуюся влагу.

Водяная кила не от в любострастнаго яда приключается, но происходить наипаче от в сильнаго ослабън волокон в в мокротных в людях в, и бывает в слъдствем в долго продолжающихся лихорадок в, и ли другим в образом в разслабленнаго сложен в; но поелику Венерическ й яд в спесобен в изнурить и наикръпчайте слежен в, то и не имъется недостатка в в примърах в, что послъ Венерических в бользней водяныя килы слъдовали.

Что бывает у мужщин опуколь вь ядрахь, то есть у женщин восменте яичникозь, которое хотя часто не усматривается, однакожъ ръдко скрывается от вамъчантя опытнаго Врача. Правда, что оные внътнимъ повреждентямъ не столько бываютъ подвержены, какъ ядра; но поелику изъ вскрыття мертвыхъ тъль научаемся мы, что яичники не только наполнены водою, зобообразны, скирроваты и изранены быть могутъ, то имъемъ довольную причину думать, что также и яичники, маточныя трубы и матка отъвогнаннаго внутрь яда также поражены бываютъ, какъ и познаемъ сте изъ жалобъ, на оныя части чинимыхъ.

## О любострастных вырощениях.

Мы приступаемы теперь кы такимы любострастнаго яда дъйствіямы, которыя подходять близко кы причиняемымы любострастною заразою. Поелику таковые выросты могуть произойти оты перваго зараженія безы предшествующихы другихы Венерическихы припадковы, то причисляю я оные кы недугамы пер-

ваго зараженія и кЪ частнымЪ бользнямЬ; но поелику бываютЬ оные еще чаще слъдствіями любострастной заразы, то можно бы сЪ большею справедливостью описать оные вЪ Главъ втораго зараженія. ОднакожЪ не дълаетЬ сіе кЪ самой вещи никакой перемъны, понеже причиняются они обоими.

Различные годы Венерических враствий, около или вы самыхы тайныхы частяхы происходящихы, суть или воспалительны или не воспалительны, туги или мягки, отверзты или закрыты, влажны или сухи. Вы разсуждени вида ихы бываюты они столькожы различны, какы и вы разсуждени ихы свойствы и дыйстви. А дабы удобные можно было оных различить, то опиту здысь каждый роды оныхы обстоятельно.

Verrucæ суть родь Венерическихъ бородавокъ, которыя оказываются иногда послъ нечистаго соитія, по большой же части происходять отъ любострастной заразы. Онъ быва-

ють разной величины, и имѣють ино да видь булавочной головки. У мужщинь находятся обыкновенно на головкь дьтороднаго уда и на крайней плоти, а уженщинь на тайномы удь, крайней онаго плоти и на миртобразных сосочках в, у отрокоблудников же на задниць.

Естьми бородавки сверьх в поверхности кожи насколько высунулись, так в что в в корн в насколько уже будуть и висять власно на стержень, то называются таковыя сережками (роігеацх роггі). Он возрастають часто до изрядной величины, по том вотпадають и снова возраждаются. Когда находятся он в на двтородоудной го човк в или при вход в маточнаго влагалища, то препятствують совокупленію и содълывають оное бользненнымь.

Когда же находятся онъ подъ кожею подобно кръпкому, широкому, продолговатому и круглому комку, далъе распространяющемуся, то именуются кондиломатами (condylomata).

Онв оказываются большею частью вы подкожныхы частяхы, вы такь, на шулятахы и дыпородоудномы покровы у мужщины; а у женщины на большихы и меньшихы тайныхы губахы, также и вы такь. Сйи не такы удобно прогоняются, какы предше ствующія, потому что оны глубке вкореняются и вы подкожныхы частяхы удобно разпространяются далье; инстда пробиваются оны и сверыхы кожи.

Иногда пріємлють на себя бородавки видь пътушьяго гребия, и называются тогда гребешками (criftae).
Они находятся по большой части
у мужщинь на дътородоудномь вънцъ и уздочкъ, а у женщинь промежду тайныхь губь и на задницъ;
наипаче же возраждаются они на послъднемь мъстъ у отрокоблудниковь,
у коихь и бывають весьма злосвойственны; такожде и въ разсужденти
вида примътно отличаются они от в
преждепомянутыхь, что однакожь
болье мъсту, на которомь находятьчасть 11.

ся, нежели другой какой причинѣ приписашь можно.

Сїи Венерическія бородавки появляются иногда безь всякаго восженія и затрудненія, и безь мальйшаго о себъ предвъщанія; часто также сами собою засыхають и по прошествій нъкотораго времени пропадають. Естьми приметь ихв больной за предвъщателей полнаенной заразы, за каковых вему по настоящему и принять бы надлежало, що потаенный ядь и предвъстники онаго вскоръ уничтожаются; естьли же останутся оныя безь замъчанія, то можно въ скоромъ времени ожидать выступлентя заразы. Бывають бородавки иногда и воспалишельны и болъзненны, и тогда болъе пріемлются вь разсужденіе, такь какь и должно: ибо естьли имветь больной острые соки, ведеть себя безпорядочно и т. Д., то не только могуть произойти онів того вдкія и ракообразныя язвы, но явитися и самая зараза и иногда довольно уже вкоренившаяся.

Что касается до происхожденія бородавокв, то думають нъкоторые, что оныя суть продолженія кожных в волошей; но мнъ онъ шаковыми бышь не кажутся: ибо рогообразныя сихъ бородавокъ волокна находятся иногда очень глубоко и имфють обыкновенно происхождение свое подъ кожею, так в что оная явно не имъеть никакого вь образовании оныхв участія. Сверьхъ того въ нъкоторыхь мъстахь, какь на пр. на дътородоудной головкъ и машочномъ влагалиць, гдь онь наикрыпчайшими и рогообразнъйшими бывають, не имъется почти совсъмъ никакой кожи. Онъ происходять паче отв испорченной сукровицы. А какимъ образомь делается образование сихъ окраплых в рогообразных волоконь, пскажу въ удобнъйшемъ мъсть.

Посль сего савдующь по порядку губкообразныя или ноздреващыя и мягкія бородавки, кошорыя по гнішнему ихь виду различныя получили

B 2

наименованія. Гребешки сушь продолженія кожи, пъпушьимь гребнямь уподобляющіяся; они находятся у женщинь обыкновенно на съдальной чаеши; наиначе же отягощають отрокоблудниковь. Когда они мягки слабы, по имъють обыкновенно язвы, и кажушся бышь такою сукровицею орошаемыми; почему и бывають обыкновенно воспаленіемь и непріятнымъ сженіемъ сопровождаемы, пока превращящся мало по малу вь глубокія Бакія и фистулообразныя язвы. Гребешки бывающь иногда окраплы, чешуйчены и воспаленны, и шогда не шолько бывають они очень чувспівительны, но и причиняють великія неблагопріятности вь той части, въ которой находятся, а особливо когда не хорошо пользованы, и вакими или другими непристойными средспвами разправлены бу-AVIII b.

Ежели сін вырощенія имфють видь шелковичных в ягодь, то называются тогає; а естьли уподобляють

ся земляникъ, то именуются fragae, фигамъ, fici и marifcae, и т. д.

Онъ садятся иногда на шулятахь, въ такъ, и иногда, хотя ръдко, на съдальной части у мужщинъ; а у женщинъ на тайныхъ губахъ, въ такъ и на задницъ. По большой же части садятся онъ на задницъ у отрокоблудниковъ.

Могае и fragae оказываются такожде и вь Иавсахь, сь тою только разницею, что въ Иавсахъ оказываются онъ кромъ тайныхъ частей и на другихъ мъстахъ; онъ бывають точно такія же, какь и вы любострастной бользни. Иногда бывають онъ воспалены, и източають изъ себя только жидкую сукровицу, и тогда сопровождаются жестокою и жгущею болью; а иногда причиняють столько же небольшихъ язвъ, сколько прежде возвышеній было.

Сїй выросты оказываются болье у мужщинь и отрокоблудниковь, нежели у женщинь. У мужщинь находятся они на шулятах и в так в, у отрокоблудников в же около задняго прохода и в в оном в. Иногда бывають они желтоватокраснаго цвыма, крытки и верьхушка каждаго из воных в наполнена густою матерією; а иногда бывають слабы, имыють мершвой видь и издають кровавую и вловонную сукровицу.

Fici и marifcae суть выросты плоскіе и широкіе, которые болье у женщинъ и слабыхъ людей, нежели у мужщинь и крыкихь людей обрытаются. Они находятся обыкновенно внутри тайных в губв, а наипаче на задницъ. Иногда разширяются они довольно пространно; а иногда торчашь взерыхь, въ верхушкъ лопаются и пріемлють видь разстушейся фиги, а изв небольших в съменообразных в концовь оных в источается острая и зловонная сукровица. У мужщинь занимають они обыкновенно шуляпа и заднепреходную промежность; а у отрокоблудниковь замыкають часто заднепроходное отверзтіе.

Мягкія мясистыя бородавки смъшиваются часто съ чечуйными шишками, потому что ихъ трудно различить, особливо когда и тъ и другія купно суцествують: однакожъ бывають чечуйныя шишки въ нижнемь концъ уже, чъмь въ верхнемь, и имъють болъе коническій видь.

Хотя вышепомянутые выросты могуть быть Венерическаго происхожденія, и сбыкновенно отв нерадънія и неискуснаго пользованія приключаются: однакожь не должно думать, чтобь оные не могли такожде произойти и отв другихъ причинъ, особливо называемые fici и marifcae въ женскихъ тайныхъ удахъ; ибо я знаю такіе примъры, въ коихъ не льзя было подозръвать ничего любострастнато, а причиною оныхъ можно было почесть острое изтеченіе почечуя, или остроту бъли, мъсячныхъ кровей и упущеніе чистеты. Сего ради не над-

лежить быть слишкомь скороспътну, чтобь подозръвать больнаго вы отрокоблудіи, когда найдемы около задняго прохода онаго подобные выросты.

Когда же напрошивъ того находятся они на кожъ, на шулятахъ и т. д., то върно имъется основанјемъ нъчто Венерическое; а естьли находятся они около задняго прохода, то могутъ произойти отъ остраго исте енјя чечуя.

Однакожъ по большой части бывають вышепомянутые выросиы, выключая нъкоторыхъ случаевь, не только любострастнаго рода, но и большою частью припадками любострастной заразы; хотя больной вы семы винены или не винены, и объявленныя причины справедливы или ложны, однакожы показаніе наше не только должно стремиться кы истребленію оныхы наружными средствами, но мы и должны старашься разстять потаенный вы крови и прочихы сокахы находящійся

ядь; оть чего, естьли упущено будеть, можеть вы то или другое время произойти великое зло. Выросты, бородавкамы подобные, суть злосвойственные, чымы ноздреватые: ибо, хотя и кажутся оные сначала доброкачественными, однакожы превращаются часто вы весьма злыя и ракообразныя язвы.

Оставимь ихв здёсь какв выростовь, происходящихь оть перваго зараженія, и какъ бользнь, могущую почесться частною; а поелику бывають оные по большой части предвъстниками и слъдствіями любестрастной заразы, то предпримемь дальнъйшее оных в испышание в слъдующей Главъ. Сверьхъ того нахсдятся еще другіе недуги, кои въ первомъ заражении произойти мотушь; сюда принадлежать растрескиванія кожи въ заднемь проходь и въ разныхъ частяхъ женскаго уда, изъ коихъ проистекаетъ иногда жидкая ъдкая сукровица, и кои бывають по временамь крайне чувствительны: когда онъ еще не давно произошли, то не трудно оныя отвратить; когда же края ихъ окръпнуть и воспалятся, то бываеть льченте оныхъ съ большимъ сопряжено затруднентемь.

Довольно сего о различных в двйствіях в нечистаго сонтіл. Приступим в теперь к в другим в родам в заразы; а поелику ядв в в таком в случать болье по всему тълу распрестраняется, то разсмотрим в слъдствія оных в в в слъдующей Главъ.



## TAABA VI.

О второмо заражении.

Теперь приступаю я къ такому предмету, который, естьли точно описывать, заключиль бы въ себъ всъ бользни, коимь люди подвержены суть. Ибо когда ядь съ тълесными соками тъла обращается и каждой части онаго сообщается,

то должно непремънно столько же произойти бользней, сколько заражено частей, от в коих в оныя произойти могуть. Не должно однакожь думать, что таковое собрание бользней вы одномы больномы вмъщается, или что всь сій различныя бользни у встхь больных в одинаковым в сбразомь оказывающся: ибо нашь ни одной причины, которая бы столь многія и одна от в другой столь различныя бользни причинишь могля, и кошорая бы столь различныя на шклосложения дъйствия являла, какъ ядь Венерической. Онь дъйствуеть не полько соотпавиственно зараженным в частям в различно, но зловредныя дъйствія онаго соображаются шакже съ шрлосложениемъ и состояніемь здравія того человька.

Нашь ни одной бользни, коимь родь человыческій подвержень бываеть, которую бы не причиниль ядь Венерической, или по крайней мъръ съоной столь сходственную, что по внътнему виду вь дъйствіляхь и

сабдетвіяхь оныхь нёть никакого различія; изь сего сабдуеть, что бользненныя причины не только легко между собою смёшиваются, но что оныя и могуть подать поводь кы величайшимы погрёшностямы, естьлибы не имёли мы, кромё существующихь припадковь, другихь путеводителей кы достиженію вёрностя. Но мы имёсть вы Венерической заразы нёкоторые хирактеристическіе признаки, естьли зловредному распространенію оной не будеть положено препятствіе.

Свойство натуры тъла животных весть, что она все оному вредное старается изгнать вонь; от в сего происходить, что натура во всъх заразительных бользнях, вы коих в ядь снаружи вошель вы тъло, старается выгонять вредную матертю ко внышнимы частямь, дабы благородныйтя части от онаго не заразились; равнымы образомы происходить сте и съ Венерическимы ядомы: ибо хотя и взойдеть оный въ кровь и съ оною обращается, однакожъ поражаеть оный обыкновенно наружныя части прежде, нежели окажеть зловредное дъйствие свое на части благороднъйшия.

0

0

0

0

Ъ

7

6

e

-

)

3

Но естьли ядь случайнымъ образомь изв вившних частей во внутреннія вгонится, или далье распространится, то должна воспосатдовашь повсемъстная пълесной машины порча. Радко случается, чтобъ второе заражение не оказывалось нвкоторыми признаками и болазненными припадками, компорые уващевають нась, естьли оные унажены и надлежащимь образомь пользованы будуть, учинить заблаговременно препону наступающему злу; но по несчастію бывають припадки вь началь слишкомъ малы, чисбъ возбудить вниманіе больнаго, а иногда содълывають употребляемыя противу онаго средства зло еще горьше.

Представляя разныя бользни, причиняемыя вторым варажентемь, начнемь сперыва св маловажный шихв,

петомъ приступимъ мало по малу къ величайшимъ и заживищимъ.

## О бользинхо кожи.

Наибольшая часть злосвойственных вользней подающь надежду кв благополучному окончанию посредстьом в закожных в сыпей, а вы Венерической зараз в бывающь онъ обыкновенно предвыстниками оной; хотя и имъющся вы семы изключения, однакож в сте столь же обыкновенно какы и то, что гоноррея бываеть первым признаком в нечистато соиття.

Гав ядь прежде возпріємления, вы томь мість обыкновенно прежде и оказывается. Когда произойдемь зараза от нечистаго сонтія, що оказываеть ядь дійствіе стое обыкновенно скорбе на дітородныя орудія, чімь на другія части. А естьли заразилів ядь прежде соки и св оными обращается, то бываеть каждая часть тіла способна ків воспріятію онаго. Большею же частью оказывается тогда ядь прежде всего на повере

жности кожи, по причинъ ли слабаго сопротивлентя оной, или по большему къ оной яда стремлентю.

Кожа состоить по настоящему изъ четырехь плевь, а именно: изъ сътистой (recicularis) и сальной плевы (adipota membrana), изъ настоящей кожи (cutis) и кожицы (cuticula).

самомь низу, и граничить, смотря по части, которую обдьваеть, или съ мышками, сухими жилами, или съ издкостною плевою.

Сальная ими по настоящему клёттетая плева, въ которой находится жирь, распростравлется по всему тьлу, выключая нъкоторыя части, какі то: части дътородныя, глазныя въка и нъкоторыя другія части головы, гдъ превращающея клътки въ сукровичные сосуды, а особливо въ дътородныхъ частяхъ, гдъ они въ великомъ множествъ находящея, и гдъ жирь вовсе перяется. Въ жирныхъ людяхъ бываютъ сін клътки наполнены жиромъ, а у сухощавыхъ почти и совсъмъ ничего не находится.

Настоящая кожи находится сверьх сальной плевы, разширяется но всему швлу, и состоять изв сухожильных волоконь, изв боевых в и кровавых волоконь, и изв сукровичных сосудов в которые со множеством в испражняющих в желез смышаны, так в чио вся кожа кажется быть железообразным веществом вся сосудов в чио вся кожа кажется быть железообразным веществом в становых веством в становых в ста

На верхней поверхности оной находится сътчетое сплетейе, помянутыми сосудами и нервами образуемое; по цвъту онаго бываеть чер. ный, смуглый и бълый цвъть у людей; вр ономь же имъють гаъздо свое веснушки и т. д. Внъшняя поверхность кожи усъяна маленькими сосочками, кои болъе или менъе видимы бывають, смотря по тому, когда кожа тепла или холодна бываеть, испаряеть, или не испаряеть.

Кожица есть наконець внышний покровь оной; она роговидна, без-

чувственна и болье или менье толста, смотря по тому, чьмь болье или менье подвержены части давленію и насилію. Она кажется быть соединенною цьпью чешуи, сосочками кожнаго силетенія производимой и оть повторяемаго давленія толстьющей.

Вся кожа снабдена скважинами, кои не что иное суть как отверэтія безчисленных валеньких железок в, glandulae miliares имянуемых в; промежду оных в находятся в волосистых в мёстах в волосяные корни, которые в в разсужденій цявта подходят в несколько к в цвыту сётчетаго сплетенія.

Такъ устроена кожа, которая не только служить для тьла, подобно древесной корь, для внъшняго токрова, но и служить оному, кажется, подобно испражияющей железь, оть чего находится тьло въ безпрестанномъ испареніи, и которая мъняеть пары свои на другія части окружающаго оную воздуха.

И такъ поелику части коми, ядомь поражаемыя, различны сушь, то перемъняется по тому и видъ бользии; а тьлосложения двлають и въ семъ нъкоторое различие. Когда вившийя части съткъ подобнаго сплетенія ядомі поражены будуті, то происходить чесотка. Въ мокрошных н соками изобилующих в сложеніях в наполняеть она комицу небольшими гнойными пузыриками, которые вь точикое же листо мачень. ких вязвинь превращающия, и, или нодсыхають и спадають, или распространяются далье. Вы сухихы, горячихо и цынгошныхо сложенихо, а наипаче когда она Венерическаго рода, бываеть чесотка не так влажна, но вдчае, и начинается несноснымь эудомь и небольшимь вожженіемь, и рождаются разныя закожныя сыпи: лишаи, короста, летучій огонь и т. д., которыя натурою своею между собою сходствуюшь, а единственно только по естественному и настоящему тьлосложентю больнаго раздичный на себя видь прівмлюнь.

Сколь ни піягостны и непріятны сушь по видимому шаковыя сыпи, однакожъ то върно, что когда оныя оть ночной боли и другихъ неудобешвъ происходянъ, которыя посль появленія сей сыпи прекращаются, ше надлежить больнымь взирать на оную, какъ на благошворное дъйствіе нашуры, а наипаче во времена наши, когда мы стабданы такими средствами, которыя сильны изгнать изъ соковь и самый злосвойственныйшій ядь. Но въ пожь самое время бываеть всякая чесотошная сыпь и купно предвестникомъ наитажчайшей лепровіи, и Венерической заразы, со всвии ужасными сабдешвіями оной, совершенной порчи кожи и других в частей тьла. Ибо, отъ продолжительной ли остроны пом нутой сыпи, или отв того, что кровь умножает в остроту, или купно и отъ того и отъ другаго сіе происходить, то объемлеть острый

ядь, естьми не будеть поправлень, внутреннія части кожи, разрушаєть волоти оной, и рождаєть множество маленькихь вдкихь язвь, препятствующихь естественному испаренію; или причиняєть оный корою покрытыя язвы и сокровенный острый ядь поражаєть сосъдственныя части, и производить наконець самую сильный ую степень Венерической заразы.

А естьми засядеть ядь ими дъйствиемь натуры, ими перваго заражения во внутренности кожи, то надобно думать, что ядь быль острве; и пупырышки, находясь глубже, потребують для происхождения своего болье времени, и содълаются вы послъдстви бользненные, при чемь тымь скорые вышепомянутыхь и другихь не менье отяготительных воль ожидать можно. Изъ всъхъ же закожныхь бользней имьють самое глубское гнъздо ть, когда ядь вы сальной плевъ находится.

Хошя кожа состоить по видимому изъ одного тьла и изъ одной матеріи, однакож в из вразных в дъйствій, Венерическим в и всяким в другим в острым в ядом в на оную оказываемых в, явствует в, что строеніе оной должно быть весьма различно: ибо в в одно и то же время бывают в нъкоторыя части оной нъкоторым в телько дъйствіям в бользней подвержены.

Бородавки, гребешки, вемляникъ подобные выросшы и ш. д., сушь виросты кожи, которые однимъ дътородоуднымо плевамо свойственны, а въ нъкошорыхъ ръдкихъ случаяхъ выростають также вь роту, вь носу и въ горат. Сти выросны такъ сходны въ Иавсахъ и въ любострастной заразъ, что сіи бользни, не смотря на различныя названія, какЪ вь разсуждении ихь дъйсшвия, шакъ и употребляемых в противу оных в средствъ между собою сходствуютъ. Въ самой даже лепрозіи остается у сихъ растъний наружный ихъ видъ, хотя прочая кожа на тьль и совсьмы другой видъ пріемлеть.

Разсвлины или трещины (Rhagades), которыя бывысть иногла глубоки, скрыплы и нг. д., находятся по большой части на задниць, на губахь, вы ноздряхь, выкахь, соскахь и т. д. Оны могуть приключиться отв растажения и сожатия частей, хотя и также злосвойственны какь и прежие быть могуть. Отличаются отв сихь по вининему виду растены, на ладочяхь и подотвахь бывающе; однаком острот ю ядя, которая устремляется кь кожиць и оную сморщинаеть.

Рыпаденіе волосовь на головь, сопровождаемое чушуйчетою сыпью, приключается вы лепрозін, вы Иавсахы и вы Венерической зарязь; вы послыдней называется оно Венерическимы вынуемы. Она (сыпы) начинается позади ушей, распространяется чрезы большую часть передней половины головы, и окружаеты затылокы. Вы тыхы мыстахы, гды сваливается сія сыпь сы волосами, бы-

ваеть она толще и вредные, такь какь и на бровяхь. Стя сынь схедствуеть сь дішскою корост ю и сь проказою древнихь, гді кора соединена сь влокончою сукровищею, вы которой весьма часто ваходятся черьви, остранью у дішей и мокрошныхь людей.

Какого бы рода больной ин быль, быль или черень, и какого бы дажна волосы его прежде ни были, то они лишатся онаго, сдылаются былыма и съ корьнемъ выпадають. Когда больной таковымъ выпадають укращень, то видъ и состояние его бывають стратны.

Коросия на головь бываеть обыкновенно сопровождаема зассво ственною сыные по всей кожь, которая какь бы влажна или хотя какого бы рола ни была прыщеватня чесошка (pfora), или родь лишаевь (ferpigo), летучи огонь (phlyfaena) и т. д., то все бываеть голова, когда оная купно состраждеть, шолудивье прочихь частей: ибо вселику влаги засыхають и св волосами савпливаются, то сокровенная матерія вытекать не можеть; почему не только увеличиваеть она толудивую кожу, но истребляеть также волосяные корни и сосуды, служащіе кв питанію оныхв, отв чего и причиняеть выпаденіе оныхв.

Чирьи (furunculi), какого бы рода ни были, когда не глубже кожи или сальной плевы простираются, находятся обыкновенно въ мышечныхв и сухожильныхв частяхв вибшнихъ членовъ, какъ-то: на рукахъ, ногахъ, колънахъ, локтяхъ и плечахв, ръдко же находящся они въ мягчайших в частях в тъла. Когда выходять близь железистых вчастей, то причиняють часто зобообразныя опухоли и многія другія неудобства. Когда чиры рода Венерического бывають, то составляють настоящую заразу; но о семь будемь говоришь ниже сего.

Такожде и мъшечныя шишки происходять иногда въ кожъ и быва9

ють весьма медлительны, по купно и крайне упорны, особливо когда возрождаются вы железистых изставующий железы; извяте оных возможно будеть оное учинить, есть самое надежное средство. Естьли шишки сти суть рода Венерическаго, то бывають обыкновенно тучны, и причиняють лъкарю великтя затруднентя, съ какой бы стороны ни предърчнималь онь изтребленте оных в.

Здъсь прекращу я описание закожных волъзней, ядом венерическим в причиняемых в вообще может всякой род выпи и закожной бользни, какия другими остротами причиняются, произойти и от венерическаго яда.

Что называется у Негровь Навсомъ (Yaws), то есть, можеть быть Венерическая зарава у Европейцовь; и ежели послъдняя заразить человъка сухощаваго и холерическаго, такъ что получить онъ Венерическую корону и тъло его покроется клейкою

4 acm v II. 10

чешуй четою корою, то сходствуеть оная св проказою. Одинаковый способь льченія довольно послужить кв отвращенію оных в.

## О бользияхо во железахо.

Когда ядь Венерической вошель ав кровь и св оною обращается, то легко засъдаешь оный вы железахь, которыя и редко остаются от вараженія свободными. А когда примемь мы слово железы вь общисивищемь смысль, що ньшь почти части во всемь швав, которая бы не имвла вь себв нъ то железистаго. такъ что можно почесть все тіло за железу, изь безчисленнаго множества маленьких в железов в составленную. Но завсь говорится только о такикь железахь, кои во вившних в частях в находятся и иногда наружных в средствь преблеть.

Не однъ природныя железы бывають поражены яломь, опухають, воспаляются и вы нагносние переходять, но что гораздо достойные

примъчанія, есть то, что иногда, когда шьло изобилуеть остротою, Венерическою или другою какою, то происходящь ложныя железы вы шьхв мъстахь, гдъ натура вь здравомъ состояни никогда никаких в железв не определяла, и шаковыя бывають обыкногенно вобообразны. Сте видимъ мы не шолько вы наружных в, но и во внутренних и даже вы благороднъйших в частяхв. И шакъ когда возможно есль, что таковыя претивоестественныя железы произойти могушь, то легко ожидань можно, что оныя скорве въ железистых в частях в окажущся, и салдешвенно естественныя железы съ проинвоеспественными смешаны быть могуть.

Отв сего будемь мы вы состояни сдълать различе между опухолью, происходящею отв захряслости в накопления соковь, и между опухолью имъншею основаниемь противоестественную железу.

Í

Все, чиго бываеть претиву течента натуры, есть болвань, почему

и надлежить почитать таковыя железопоразныя опухоли подлинными. бользнями, кои многія неблагопріятныя савдешейя имьть могуть: но не сметря на то, находимъ мы, когда примемъ въ разсуждение удивип льные законы самоохранентя экономїн живошныхв, чшо сїн опуходи должны сначала почищаемы бышь заблагошворныя двисшегя натуры, долженствующія служить или к в заключению вредишельных влагь, или естьли можно къ изгнанию оныхъ, и въ шакомъ случат должны слабъйшія части уступить сильнайшимі. Непріятель, который насколько времени въ шълъ ошь одной часши къ другой гоняется, и от всъх равнопрезираемь бываешь, укръпляешся наконець вь томь масть, гла найдеть меньшее сопротивление; а когда онв и оттуда прогнанъ бул тв или случайным в дъйствием в нашуры, или помощию посторонней причины, то пускается опять вЪ дорогу, пока не сыщеть для себя новаго прибъжища. Почему и случается, что въ Венерической и другой элосвойственной бользии боль и другія непріязненности от одной части къ другой переходять, пока не пожертвуется одною какою либо частью ко благу цълаго, въ которой ядь накопляется; а естьли ядь одержить нобъду, то слъдуеть разрушеніе всей матины.

Довольно извъстно, что всякая железа состоить изь боевых и крововозвратных в жиль, изь отдъляющих в испражняющих в сосудов; но какимь образомь пртуготовляющся вь оных вазличные соки, пребываеть досель таинствомь.

Доколь любострастный ядь вы дьтородныхы орудіяхы пребываеть, то оказываются обыкновенно бубоны, опухоль вы ядрахы и т. д.; но какы скоро яды перейдеты вы кровь, то бываюты всы железы разно подвержены зараженію. Однакожы страждуть обыкновенно наипаче железы паховыя, подплечныя, тейныя и т. д. Онь содылываются

кръпкими и нечувствительными, и сходствують во возврещени своемь сь недавнопроявшедшимь бубономь, бывають сднакожь упорны и зобообразны.

При возрожденти зобообразных в желваковь, Венерическаго или не Венерическаго рода, пріемлють вь шомь обыкновенно близь лежація части участие. Сперва оказывается опухоль в вественных в железахв, а именно: когда возымветв ядв пристанище свое въ железахъ слиношочивыхь, подплечныхь и ш. д., и когда ядь или изгнань будешь или распространится, то прі млють близь лежащія мышки вь зараженій учасийе; почему происходящь опухоли вь шейныхь мышкахь, иногда до плечь простирающияся, и потерхность той части, желаками сизбанную, ков жою содваннающія. Снача а желваки сти пропадающь, одаакожь паки выходять и вся тея дъ аешся наконець зобообразною, такъ что естественных железы и прошивоестественные желваки имфють между собою сообщение, пока нако ець тоть или другой прорвется и изтеченіе оных в фистулообразно смежными желваками поддержано будеть. Ежели произойдеть сін бользнь оть не Венерической причины, по называется шаковая по Аганнски: King's Evil. Подобным в образом в происходишь сте вь потайномь любострастномь паховикв, а именно: онь способень произвесть св снымь сообщеніе имъющіе желваки во мышкахв бедренных в и м. д., отв че о могушь произойши глубокія фисшулы, кои возпрепятствують заживленію подобных в язав, особливо во людяхв, острыми соками изобилующих в и у которымъ ядъ по всему тълу распространился. Сти зобообразныя желваки и язвы бывають часто злаго свойства и разпространяются до составовь, гдв не только делають членосоставную влагу окраплою, но заражають также связки и причиняють вь оныхь опухоль: почему и

)

происходять колодныя безчувственныя опухоли и членосрощентя, костобды, надкостные выростки и другте въ костяхъ недуги, которые остаются часто неизлъчимыми.

Сїй зобообразныя опухоли являются, естьли от Венерическаго яда зависять, вы Венерической заразь; но какы ть, такы и другія совершенно сходствують между собою вы разсужденій льченія, продолженія и вы разсужденій разрушенія взеймащины.

Ежели разсмотримъ тщательно зобообразныя бользни и средства въ оныхъ употребляемыя, то должны дивипься легкому (несильному) способу льченія и строгому воздержанію оть ртупи и слинопроизведенія. Но какъ скоро сій бользни и оныхъ припадки объявлены будуть Венерическими, то должны мы удивляться, что производять больному тотчась пресильное слинотеченіе, при чемь онь или во время опыта погибаеть, или когда его переживеть, вь та-

ком в же остается положени, или находить даже недугь свой новыми увеличеннымь. Разница имъется вы семь такая, что оныя от недостаточнаго употребления, а си от слишком сильнаго употребления надлежащих средствы не производять желаемаго дъйствия; когда напротивы того средний путь вы обоих случаях увънчался бы благоприятным успъхом в.

Нъшь части въ тълъ, въ которой бы не находились железы; въ разсуждени только количества и строения оныхъ имъется въ семъ нъкоторое различие.

Строенте пищепртемнаго канала, гортани, язычка и т. д. такъ много сходствуеть съ строентемъ дътородныхъ частей, что любострастныя язвы, о конхъ мы послъ говорить будемъ, равныя въ обоихъ оказываютъ дъйствтя.

Оболочки рта, гортани, носа и разных в общих в их в впадинв, образуются из в совершенно железистаго Часть II. вещества, коего поверхность снабдыва скважинами, ньжна и чувственно-жильна; сверьхо того находится во роту множество сложныхо слино-точивыхо железо (gl. conglomeratae), како-то: защечныя, заушныя, подовазычныя и подбородныя железы, кои при жеваніи пищи източають слину; далье снабдыны всь сіи части безчисленными мокротными железками, издающими слизкую мскроту и сохраняющими роть и разныя онаго части удободвижимыми и слизкими.

Различные органы рта, а именно якыкь, язычекь (uvula), большая часть дыхательнаго канала и десны, состоять по большой части изь подобнаго вещества.

Поелику слиношочивыя желевы бозпрестанно упражняющся въ дълъ и многія въ экономіи живошных в имъющь ошправленія, що слъдоващельно должны онъ съ кровью великое имъть сообщеніе, почему и заражены быть могуть. А понеже разпространяють онъ сосуды свои по сосъдственнымь

органамЪ, то слъдственно должны онъ также сообщать онымъ и заразу.

Губы, горшань и язычеко имъюшь великое сходство въ разсуждении ихъ строенія со внутренними женскими дътородными частями, почему и происходять вь оныхв, когда онъ Венерическим в ядом в поражаемы бывають, язвы, кои шанкерообразны сушь, и кои, когда шьло осшрыми соками изобилуеть, могуть весьма злосвойственными учиниться; сего ради могуть язвы на губахь, ланитахъ и язычкъ удобно учиниться влосвойственными, и отв того части сін совершенно разбітдены быть; а поелику горшанная оболочка очень тонка и находящіяся подь оною кости такожде тонки и ноздреваты сушь, то приключается часто косто, ъда, поражающая ноздреватыя верыхней челюсти кости и все образованіе сих в частей разрушающая.

Равным в образом в и мокрошная плева, обдъвающая нось и различныя сь оным в сообщение имъющия впади-

ны, способна къ воспріятію яда, почему и подвержена нъкоторымъ злосвойственнымъ и упорнымъ болъзнямь. Когда ядь Венерической или другая какая либо острота стю железистую оболочку объемлеть, которая служить частію ко отділенію возгрей, и частію къ содержанію вь сихь частяхь слизи и къ сохраменію обонятельных в нервов в отв вићшних в повреждений, то бываеть оная наипаче ноздреващым в и злосвойственнымь растъніямь и гнилообразнымъ язвамъ подвержена. Слизкая мокроша препяшствуеть, правда, св начала дъйствовать на оную яду ев тою скоростію, какв вв другихъ нъжных в частяхь, но по той же самой причинъ становится для оной тъмь вредительнъе. Возраждаются въ оной мало по малу ноздревашыя, вловонныя и злосвойственныя раствнія, которыя бывають иногда полипу и раку подобны, а иногда превращающся въ зловонныя язвы, кошорыя сосъдственныя кости поражають, вь оныхь гниль производять, и совсьмь оныя разрушають: почему дълается нось, когда кости и носовая преграда разрушатся, плоскимь, заваливаеть прежнее отверзте и причиняеть гнусенте въ разговорь. А какъ скоро кости поднебенныя, кость сохъ подобная и т. д. истребятся, то учиняется ръчь пустовонкою и невразумительною, подобно зруку изъ пустой бочки.

Язычек в может в в сем в случав посредством в воспалительной опухоли или увеличиться, так в чио замывает в часто пищеприемное горло, или может в онв также злоскойственного язвого вовсе истреблен в быть.

На языкъ, особливо на корнъ онаго дълающся также часто Венерическія язвы, такъ какъ сіе и въ подъязычных в железахъ происходить; а иногда поражаеть ядь весь языкъ, причиняеть въ ономъ сильную опухоль, и учиняеть оный не только

весьма чувствительнымъ, но не употребительнымъ и тягостнымъ.

Иногда дълаются язвы въ мышкахъ язычка, какъ-то: въ мышкъ завъсо-язычковой (М. fphenostaphilinus), крыло-язычковой (М. pterigostaphilinus), и т. д.; отъ чего, когда купно языкъ, какъ-то часто случается, а особливо мышки онаго покрыты язвами и язычная кость поражена, происходить онъмънїе языка, и поэлъ лъченїя остается часто сиповатость, трудная ръчь и худое глотанїе.

Но всего бываеть хуже, когда поселяется ядь вь дыхащельномы горль. Оное состоить изь хрящей, мышекь, железь и плевь, кои весьма плотно соединены между собою и снабдымы нервными и другими сосудами, которые съ близьлежащими частями въ точномъ состоять соединени; изъ сего удобно понять можно, что когда ядъ Венерической заразить сйю часть, то должно сте

болью, злосвойствіем в опасностію сопровождаемо быть.

Естьми причинить ядь вожжение и непосредственное нагноение, то происходить вы семь случав такв, какь и въ злосвойственной жабъ. Однакожь происходить сте по большэй части не такъ скоро, и въ прэдолжени мокрошной плевы рождаюшся ноздреватые выростки, преврашающеся мало по малу в в злосвой. спеенныя, вонючія и вакія язвы. Иногда заваливають сін выростки дыхательный каналь и все пищепріечное горло, такв что больной не вв состояни бываеть принимать пищи, что и побуждаеть для предупрежденія задушенія прибъгнуть къ бронхотомїй или разсъченію дыхательнаго канала.

Гнилая жаба, Венерическаго ли она рода или ніть, почитается всегда самою злосвойственною и опаснійшею болізнію: пбо понеже части дыхательнаго горла такь плотно соединены между собою, то разпространяется опухоль съ величайшею скоростію, и воспаленіе легко можеть возпрепятствовать дыханію, безь коего жизнь продолжаться не можеть. А сверьхь того можеть гноеватая матерія пасть во время гноенія въ легкое, наполнить легошные пузырьки и произвесть въ больномь смертельную чахотку.

Такожде и десны могутв поражены быть Венерическимы ядомы, учиниться ноздреватыми, распухнуть и получить ость подобную сыть, которая мало по малу превращается вы язвы; зубы становятся черны, разрушаются и выпадають, а луночки оныхы поражаются гнилью и стщепляются.

Изв преждесказаннаго явствует, что дыхание таковых вараженных влюдей, которые обвяты нъкоторыми или встми сими такими и зловонными вв роту и вв носу недугами, какв для нихв самихв, такв и для другихв сколо ихв находящихся людей крайне не приятно, и что,

естьли не будеть подана онымь непосредственная помощь, то должень ядь перенесень быть оттуда вз всь части тьла: ибо понеже нища во время жеванія и глопанія гозпріємлемь ньсколько гноеватой матеріи, то долженствуеть непремьнно и пріуготовленное сь оною питаніе быть ядовито.

Самыя дурныя язвы, какими можеть страждущій любострастною бользнію поражень быть, суть причиняемыя слинотеченіемь даже и тогда, когда ни мальйшаго знака уязвленія вы тьхы частяхь не было; сколь часто не находимы мы также, что хотя больной и довольно имыеть силы кы понесенію оныхь, однікожь зло оты того не уменьтается, а паче увеличивается.

Острые соки твла, Венерическаго или не Венерическаго рода, могуть также устремиться кв гламать; а поелику состояще твла бываеть обыкновенно вы любострастиных болганяхь изъ встхы худ-

шее, то и двиствуеть любострастная острота въ тъхъ частяхъ, вь кои вгоняется, съ большимъ свирънсивомъ, чъмъ въ другихъ случаяхь. У больныхь зараженныхь любострастною бользнію находимь мы, какЪ скоро глаза поражены бываюшь, что на бровяхь небольшія язвины оказывающся, кои воспаляющся, гноятся и опять засыхають, при чемв изшекаеть купно изв самыхв глазъ гноеватая матерія; внутренній глазный уголь равномърно воспаляется, получаеть язвы и не ръдко возрождающся во ономо упорная шишка, слезная фистула, гниль вЪ костяхь глазной впадины и другіе недуги.

Иногда происходить во внутренномь глазномь угль фистула, которая сообщаеть остроту свою былочной оболочкы и самой даже роговой плевы, и причиняеть множество маленькихь огневидныхы пятень и осты подобную сыпы; вы
семь состоить внышее любостра-

етиное глазовоспаление, (ophthalmia venerea externa).

Естьли проникнеть ядь вы глазныя влажности, вы водяную, или стеклообразную или кристалловидную сочениць подобную, то лишаются оны прозрачности своей и становятся мутными; дылается быльмо, которое, естьли увеличится и сильною болью сопровождаемо будеть, составить внутренное глазовоспаленіе, которое переходить наконець вы нагноеніе.

Когда зришельный нерво ядомо поражено будеть, то воспослодуеть темная сода со воспалентемо или безо онаго, и бываеть разными сопровождаема припадками.

Такожде и уши бывають бродящимь ядомь объемлемы, вы кои достигаеть онь оть зараженныхь частей рта или чрезь жельзообразную слуховаго прохода оболочку и слуху спостышествующія части, или посредствомь Евстахіевой трубы. Сей ядь Венерическаго рода будеть, или нъть, однакожь могуть произойти отв онаго вы разных в частяхь уха язвы.

Съра въ ушахъ примътно отличается отв прочихв влагв твла; жирная влага, примъчаемая по утрамъ послъ легкаго испарентя въ лицъ и отделяемая сальными железами, кои кожица съ същчетою плевою на поверхности кожи совокупляеть, и которыя кожу болье или менье гладкою двлають, наиболье походить на оную. Но ша ли самая есть съра влажность, или накопляется оная вь сихь частяхь для того единственно въ такомъ количествъ, потому что не такъ удобно смывается, не осмъливаюсь я св достовърностію утвердинь: о накожь по върно, чно органы слышанія ві лучшемі находятся состояніи, чтыв менте оной опідбляется, и что большая часть бользяей, вы сихы частяхы приключающихся, большимь отделениемь свры бывають сопрогождаемы.

Когда отдъляющая уха сболочка Венерическимъ ядомь объяща будеть, то дълается съра кръпкою, хрупкою, острою и зловонною; иногда разъъдаеть она внутреннюю оболочку и причиняеть въ оной злосвойственныя язвы, отъ чего кости обыкновенно купно заражаются, и воспослъдуеть тдкое эловонное гноеватое изъ уха изтечене, сопровождаемое часто отщепленемъ костей.

Буде достигнеть ядь изь рта до внутренних истей уха, барабана, винтообразной раковины (cochlea) и т. д., то воспослъдують костиве выростки (exostoles), наросты (hyperostoles), костоъды (caries) и злосвойственныя вь сихь частяхь язы, оть чего не только оныя истребляются, но и слухь теряется. А именно: происходить сперыва вь сихь частяхь воспалене, сопровождаемое разными кажущимися тонами; воспалительная опухоль разпространяется послъ сего по внъшнимь частямь уха, и превращается нако-

недь вы элосвойственную язву, коей зловонный гной изы уха изтекаеть и отщепленйемы костей сопровождается, пока наконець вст кы слуху принадлежащия части разытаены и истреблены будуть.

Женскія груди суть по строенію ихв многимв подвержены бользнямв; сіе происходитв или отв случайныхв причинв, разстройку вв работахв ихв причиняющихв, или отв острыхв соковь отв недавнаго зараженія вв твло вотедшихв, или вв ономв мало по малу возродившихся. Равнымв образомв и любострастный ядв способенв причинить вв оныхв многія неудобства и самаго даже отверзтаго рака.

Женщины питающія грудою получають ядь часто от в любострасть ныхь дътей. От в сего разтрескиваются иногда соски злосвойственнымь образомь. А иногда оказываются въ сихъ и другихъ младенцомъ осязаемыхъ частяхъ горячаго рода сыпи. Иногда же воспріемлется ядь возвращательными сосудами и входить вы кровь; почему и можеть тогда оный также удобио поразить сіи части какъ и другія.

Но не смотря на сте, должны мы при семь случав бышь во суждента нашемъ осторожнымъ, особливо изъясняясь о семь съ другими; ибо младенець можеть, кромь Венерической, другими столькож в вредными объять быть бользиями, кои онь вь состоянии сообщить кормилицъ. Но какого бы рода бользнь младенцова ни была, то не можеть, по моему мивнію, произойти зараженія, пока еще не окажется снаружи пятень, опуходи или язвы. Но совевмв инаково произходить сте съ зараженною кормилицею и млекососущимъ младенцомь: ибо у очой происходить безпрестанное притечение соковь къ млечнымь железамь грудей и посредствомь отделяющагося молока, безпрестанно высасываемаго, во состоянін кормилица сообщинь остроту свою младенцу.

Женщины подлежать разнымь періодическимь бользнямь, коимь мужщины вовсе не подвержены. Сверьхы того бывають у нихь нькоторыя бользни гораздо злосвойственные, чымь у мужщинь; напротивы того имыють оны и гораздо болье путей для освобожденія и предохраненія оть оныхь, такь что составляють онь вы цыломы вы разсужденіи расположенія тыла ихь совсымь другой родь тварей.

Промежду грудей и дътородныхъ частей царствуетъ великое сообщенте. При наступленти мъсячнаго очищентя груди болъе обыкновеннаго напрягаются; и естьли впадаютъ женщины въ болъзнь, то приключается сте обыкновенно около сего времени; а какъ скоро мъсячное изтеченте появится, то оныя примътно и гесьма много облегчаются; такожде находимъ мы, что женщины, имъющтя порядочное мъсячное, наименъе подвержены болтзиямъ грудей. Сокровенный въ грудахъ ракъ можеть долгое время спокойно пребывать вь оныхь, естьми не будеть непристойнымь образомь разтравлень; но какь скоро мъсячное очищене учинится безпорядочнымь, ими и совсъмь еще прекратится, то спящій непріятель пробуждается и угрожаеть бъдствіемь.

Но вообще можеть всякой недугь вы железахы и вы железистыхы частяхы, другою вы тыль дыйствующего остротою производимый, преизойти также и оты любострастнаго яда, таккожде и на обороты; равнымы образомы вырно и то, что вы недугахы сихы, Венерическаго ли оные произхождения или ныты, за благовременно употребляемыя средства равно благоприятныя являють дыйствия, чтобы противу сего ни говорили.

Что сказано здъсь о бользняхь, Венерическимь ядомь причиняемыхь, то относится по сравнентю и кь тъмь, кои разсмотримь мы кратко, когда будемь говорить о бродащемь любострастномъ ядъ. Почему приступимъ теперь къ поврежденіямь, коимъ кости подвержены бываютъ.

## О недугахо костей.

Кости хотя и суть наикръпчайтія тъла части, однакожь могуть столько же многія вредительныя оть бродящей остроты, особливо Венерической, о которой мы здъсь говоримь, претерпъть перемъны, какь мягкія и железистыя части, о коихь мы досель говорили. Онъ могуть опухнуть, воспалиться, гноиться, развъдены, растворены и въ ини е мягкое и гибкое существо превращены быть.

Сколь много о образовании косшей ни писано, однако, не смошря на то, царствуеть еще вы семы великая темнота. А что о семы сы достовырностю утвердить можемы, есть то, что оны изы тыхы же самыхы матеріаловы образуются, какы и всь другія существа живот

жых в, только что оныя отличным в образом в пріуготовлены и между собою соединены суть.

Вь естественномь состояніи суть кости изв существв животных в наикръпчайнія, и одарены кромь нлевнаго их в покрова и мозга малымЪ чувствомЪ. Крепость оныхЪ сь латами по малу увеличивается, наконецъ лишаются своей клейкости и становятся хрупкими. Всв кости, выключая только одну часть зубовь, покрыты плевенною и нервною оболочкою, объемлющею купно и составы оныхв. На черепъ называется оная терепною плевою (pericranium), на прочихъ же частяхъ надкостною плевою, (periofium). Длинныя кости верьхних и нижних в конечностей сушь во срединь шонки, очень кръпки и пусты, а въ концахъ широки и ноздреваны; прочія кости суть частію плотны, отчасти же ноздреваты. Опредъленныя къ движенію покрыты по концамъ хрящами. Членосоставы оных в созокуплены ме-

)

Ŧ

.

Ь

e

жду собою госредством в надкостной плевы и крипких связокь; внушри наполнены сив мозгомв, ньжною, нерви ю и чувствительною кожицею покрышымь. На костяхь находятся разныя небольшія ошверзтія, въ кон входять иногда кровавые сосуды, иногда нервы, окруженные надкостною плевою и термощіеся частію ві коени, частію же въ мозжечкогомъ существт. Составы орошаются прозрачною клею подобною влагою, въ ксей и движение имтюшт. У дъшей бывають кости широки и полсты, но мягки и имъющь краснований видь; по концамь сушь онв хрящевашы и головки движущихся костей шырски, мягки, нездревашы, и мотуть удобно от в кръпких в частей ещавлены бышь. Вь средних влатахь становятся онъ кръпки, плотны и цевть ихь подходить кв бъасму. Вь глубокей старости кости вокращаются, становатся хрупкими и получають желиованой видь. Когда кость переломищся, то изпекаеть изв перелома клейкая членосоставной влагь подобная жидкость, 
которая переломленныя части мало 
по малу опять склеиваеть и согокупляеть оныя также плотно, какь 
и прежде были; у молодыхь людей 
имьють кости свойство сте вы гораздо большей силь. Се суть нъкоторыя естественныя костей свойства; 
петерь приступимь кь бользнямь 
оныхь.

Поелику кровь и другія въ шъль обращающіяся влаги имьють теченіе свое сквозь кости и соединяющія ихь между собою части, то нашурально положить можно, что Венерической ядь и другія входящія въ кровь остроты могуть такожде и въ костяхъ оказать вредныя свои дъйствія, воспрепятствовать естественному оныхъ образованію и нарушить очыхъ сложеніе или связь; а чьть болье или менье бывають боль и воспаленіе сильны.

Подъ названиемъ еховоб разумфется обыкновенно противоестественный выросток в кости. Возрашенје сего рода недуговъ бываешъ обыкновенно медленное. Естьли бывають онв св начала мягки, по навываются гуммами (gummata). Мъсто происхожденія ихв есть весьма различно; иногда происходящь они вь кожъ, иногда въ надкостной плевъ, инстда въ сухой жилъ, а иногда какь вь ноздреватомь, такь и въ плетномъ существъ самой кости. Гдь бы оные ни произошли, то всегда бывають припадкомь вкоренившейся даразы Венерической, хошя и другія скитаюціяся острошы могуть такожде подать ко онымо поводо, и имъють всегда нъчто злосвойственное и упорное въ себъ. Иногда бы. вають выростки тучны и заключены въ кожъ, иногда окръплы и костообразны, хотя от настоящей кости и отличаются. Иногда бывають они восналительны и чувспівительны, а иногда безчувственны, иногда же начинають свирыпствовать незапно. Каковы бы оные ни были, то всегда бывають предвыстниками вкоренившейся заразы Венерической.

Они бывають обыкновенно соединены св гнилью находящейся подв оными кости, а наипаче когда имвють точное св оною соединение; изв сего и изв тучнаго свойства оныхв, также и изв способности оныхв претворяться вв кость, ясно слвдуеть, что происходять они отв влосяойственнаго повреждения мозолистаго существа самой кости.

Истинной же выросток происходить из существа самой кости, которой и называется бугромь (nodus). Таковый состоить
иногда из кръпкаго кости подобнаго
существа, а иногда из в безпорядочно
образованнаго тучнаго и мясистаго
существа, которое кажется из в
костной язвы произросттимь. Иногда
бываеть кость и сей части плотнье обыкновеннаго и недугь похо-

дить кръпостю на слоновую кость; вы инное же время бываеть оная ворсовата и ноздревата, и клътки оной наполнены безпорядочно образованным в хрящеватымы и кости подобнымы существомы. Кръпки или мятки суть бугры, то объемлють они или одну, или различныя кости, суть или узки, или общирны, и бывають обыкновенно соединены съ ночною болью, иногда же и безь оной.

Кости ноздреватыя суть наиначе подвержены выросткамь, такь что не ръдко вся кость разширяется и опухаеть; сте называется надкостнымь выросткомь (hyperostofis). Естьми простирается опухоль также и на плотныя кости безь мальйшаго снаружи оказантя, то именуется вътренного остью (fpina ventofa).

Надкостные выростки на конетностях в костей бывають иногда съ сильною сопряжены болью, а иногда тульмы и непріятнымь ощущеніємь сопровождаемы. Но выпренная

ость, произходя от разрушенія мозжечка или вь плошной косши, или въ ноздреватомъ существъ, должна причинить больному наисильнъйшее мучение, и есть по ракт наиприскорбнъйшая, можеть быть, бользнь, какою только человъкъ одержимъ быть можеть, наипаче же когда объемлеть оная берцовую кость или одну изъ длинныхъ костей, и такъ разширишся, что костобда пробреть себъ дорогу наружу. Въ такомъ случав приключающся вожженія и злосвойственныя, зловонныя и упорныя язвы, сопровождаемыя губкъ подобными вырощеніями и опіщепленіемЪ кости, пока не произведеть натура совсъмъ новой кости на мъсто старой. Но возобновление кости не всегда слъдуеть, ибо иногда получаеть кость видь червоточины. Иногда могуть купно страдать разныя кости, и есть даже скелеты, которые Венерическою и другими ядовишыми остротами совство развъдены и обезображены.

Часть ІІ.

Выростокъ можетъ такожде произойти и отъ ушибовъ или незапныхъ вывиховъ члена. Но таковый примътно отличается отъ такого, который посредствомъ какой либо остроты причиняется: ибо въ ономъ выпячивается только кожа, сухая жила или кость, когда напротивъ того въ семъ выпучивается изъ кости испорченная кожа. Что надлежитъ до различнаго оныхъ образовантя, то не льзя опредълить тому причины.

Отв надкостной ли плевы имъетв кость произхождение и питание свое, или оная отв кости, многия о семв происходили пръния. Опытв научаеть, что вв развъденной и отщепляющейся кости здоровая часть прежде покрывается новою надкостною плевою, нежели отполкнетв развъденную часть; и пока не можетв сте безпрепятственно учиниться, пребываеть язва злосвойственною, и костобда и отщепление кости продолжаются: ибо нъжность существа

кости столь велика, что наимальйшій приступь воздуха вы состояніи дьйствовать на оное безь всякой другой существующей причины. Отсюду такожде явствуеть, что скоблить кость есть вредно: ибо сте дылаеть натуры вы дыйствіяхь ея помышательство и препятствуеть возрожденію надкостной плевы.

Всь кости подвержены такъ называемымъ узламъ или бугоркамъ, обыкновенно же происходять они въ твердыхъ частяхъ оныхъ, и въ такихъ костяхъ, кои наименъе покрыты мускулами. И такъ естьли больной, любострастною болъзнію одержимый, жалуется на ночную боль, длинныя кости онаго въ рукахъ и въ ногахъ при осязаніи шароховаты и шишковаты суть, и изъ черепа желваки, рогамъ молодыхъ телятъ подобные, возростають, то навърно положить можно, что онъ объять до костей Венерическимъ ядомъ.

Надкостные выростки могуть равнымь образомь оть многихь при-

чинъ приключиться. Обыкновенно оказываются оные у дътей, Аглинскою бользнію одержимыхь, оть чего и бывають таковыя дъти часто весьма обезображены. Такожде и молодые люди, вступающіе вы мужественный возрасть, бывають онымь подвержены, хотя бы и имъли мокротное сложеніе; кости ихь учиняются бользиенными и безобразными, а составы примътно широкими и неуклюжими.

Обыкновенно же бывають надкостные выростки дъйствием Венерическаго яда, когда дълается сильнъйшее притечение соковь къ костямь. Желвакъ бываеть по большой части разрушительный, сопровождаемый зобообразною связокъ и всего состава опухолью. Таковый желвакъ причиняеть часто многия неудобства. Членосоставная влага можеть въ семъ случать различнымъ перемъниться образомъ, иногда превращается оная въ гной и сукровицу, оть сего поражаются хрящи и головки костей, и слъдуеть язва наизлоссойственнъйщая, сопровождаемая отщепленйем вости; а иногда превращается оная в' ноздреватый выроств, содълывается мозолистою, костообразною и причиняеть недвижимость вы составь (anchylofe), которая отяготительнымы безобразйемы состава и кы оному принадлежащаго члена сопровождается; такожде превращается иногда членосоставная влага вы существо, подобное извести, которое причиняеть сильную вы той части боль.

Въпреная ость есть ужасная бользнь, особливо когда она разпространяется и цълую кость объемлеть. Она состоить въ истинномъ вожжении и нагноении существа кости. Поелику она общирна, то долженствуеть непремънно поразать вхо дящія и исходящія нервы какъ надкостной плевы, такъ и мозжечка и мышечныхъ сухихъ жилъ, укръпляющихся въ разныхъ мъстахъ кости, и по сей причинъ соединена быть съ великою болью. Почему и чувъ

b

И

V 3

ствуеть больной, будто у него вы кости ньчто жуеть, (какы то просто изыксняются), а вы мышечныхы частяхы имьеть раздирающее ощущене, что и продолжается до тыхы поры, пока появится наконецы снаружи язва, которая прорывается, оказывается весьма злосвойственною и отщеплентемы кости сопровождается, пока не произведеты натура новой кости высто разывается натура новой кости высто разывается исхода требуется тщательное и благоразумное пользованте и молодое хорошее тылосложенте.

Сїя въ кости язва претворяетъ иногда не полько кость, оною пораженную, въ испорченную массу, но и разпложаетъ также порчу по смежнымъ, а иногда даже и по всъмъ костямъ.

Но изъ всъхъ костныхъ болъзней кажется наипречуднъйшею та, когда дълаются онъ совсъмъ мягкими и гибкими, и похожими болъе на мясистыя, нежели на кръпкія косто-

образныя части: сїе можеть какь оть Венерическаго яда, такь и оть других в приключиться причинв. Есть примфры, что сія бользнь приключалась безъ большей боли и безъ всякаго другаго неудобства, кромъ того, что кости отв тяжести твла сгибались и наконецъ для подпоры онаго неспособными учинялись. Сія бользив начинаешся обыкновенно воспаленіемъ и сильнымъ въ той части колотьемь, какь и вътреная ость; кости распухають и претворяются наконець въ существо подобное мясу, наполненному кровью, и бывають тогда тъмь же родамь язвь, какь и другія мясистыя части подвержены. Я видьль инвицированную кость от сей бользни умершаго человъка, которая была не только противоестественно велика, но и снабдъна шакже многими довольно большими кровавыми сосудами, а сверьхъ того имъла шароховатое, ноздреватое, клътчетое и мясистое свойсшво.

Но вообще не находится во всемъ ттав части, которая бы отв обрашающагося любострастнаго яда болве прешерпъвала, какъ самыя сїи кости, такъ что, естьли кто онымъ заразится, и оный съ кровью и друтими соками обращался, тотъ получаеть обыкновенно нъкоторые знаки онаго на всю жизнь свою. Иногда сплюснутой нось, похожій на нось обезьяны, иногда лишаешся онъ вовсе онаго, и принужденъ бываешъ употреблять вмъсто натуральнаго искуственный. КЪ томужъ принадлежать далье: гноящиеся глаза, а можеть быть также и косость, изтечение зловонной материи изъ оспальных в ноздрей и изв ушей, испорченные зубы и развъденныя десны, вловонное дыханіе, желваки на шев, чрезвычайно большія плеча, худо движущієся и широкіє локпіи, изсохаме составы руки и пальцовъ, негибкія кольна, кривыя ноги, упорная шечь изв мочеваго ствола, зобообразные желваки, дурной видь, и ш. д.

Хотя всъ сї и неблагопріятности бываю ть обыкновенно остатками предшествовавшей любострастной бользни, однакожь есть также примъры, что нъкоторыя изъ оныхъ происходили у такихъ людей, коихъ какъ родители, такъ и они сами отъ Венерической бользни совсъмъ свободны были.

Но естьли кто претеривлю въ твав своемь Венерическую бользнь и любострастный ядь вь сокахь, наипаче же въ костяхъ его нъсколько времени промедлиль, то ослабляеть сїе обыкновенно все сложеніе его, и дълаеть прежде времени старымь: ибо понеже оный безпрестанное на нужныя къ жизни дъйствія чинить раздраженіе, то и должно шъмъ скорве воспоследовать естественное изнуреніе оныхь. Почему и видимь мы помянушыя зловредносши происходящими, или находимъ по крайней мъръ уменьшенный росшь, хрупкія и тонкія кости, и всь погрьшности и недостатки глубокой старости въ такихъ людяхъ, которымъ бы по лътамъ ихъ надлежало быть здоровыми и кръпкими.

О внутрениих венеригеским здом пригиняемых и никакими наружными припадками несопровождаемых бользиях.

Что ядь Венерической для внутреннихъ частей столькожь вредень бышь можешь, какь и для наружныхв, довольно явствуеть изв опыта; однакожъ происходитъ сте обыкновенно не шакъ часто: ибо экономія живошных в такв расположена, что она все для внутренностей вредное выгоняеть на вившийя части. Но когда сдълается ей въ томъ неудача, то могутъ оныя также удобно ядомъ заражены бынь какъ и наружныя; а когда онъ ядъ одинь разь воспріяли, то сь великимъ трудомъ освобождаются отъ онаго.

Ядь дыствуеть вь тыль какь раздраженіе, а именно: какъ скоро войдеть оный вь кровь, какимь бы то образомъ ни было, то причиняеть не только перемъну въ сокахъ, но зараженные соки раздражають также, во время прохожденія ихв, нервную боевых в жил в оболочку и увеличивають чрезь то растяжение и сожащие оныхъ; отъ сего рождается лихорадка. Доколь дъйствуеть раздражение, до штх в порв и продолжается лихорадка; от умноженія ли въ крови яда произойдетъ сїе, или ошь того, что ядь поразить чувственножильную часть и раздражение разпространить далье: вь семъ состоить различие между существенною и припадотною лихорадкою.

Когда къ кровообращению служащия части столько счастливы будуть, что ядь или посредствомъ испарины, мочею или низомъ совствовь извергнуть, или ко внътнимъ частямъ прогонять, гдъ оный сла-

быми и мало сопротивленія дѣлающими сукровичными кожи сосудами воспріять и по томь изь тѣла извержень будеть, то возымѣеть сіе желаемый исходь. Натура старается о семь во всѣхь болѣзняхь; и когда ей не удается, то бывають обыкновенно причиною тому или злосвойственность и множество яда, или сложеніе тѣла, разныя случайности, нерадѣніе, заблужденіе, а наипаче превратное лѣченіе.

Нъкоторыя бользни свойственны жидкимь, другія плотнымь частямь; но сїе тогда только справедливо, когда онь вы семь болье имьють участія: ибо жидкія и плотныя части такь соединены между собою, что составляють, кажется, одну массу, почему и должны онь вы бользняхь, оныя постигающихь, общее принимать участіе. И такь когда кровяная масса переходящимь ядомь заразится, то должна бользнь непремьню учиниться общею, и болящій толикимь же разнымь подвер-

жень бышь бользнямь, сколько находишся различных в частей, скозь которыя кровь переходить. Чъмь болье или менье способна часть сопротивляться яду, тъмь ранье или позжь и будеть оть онаго страдать.

Первые припадки любострастнымь ядомъ обремененной крови сушь: повсемъсшная слабость, дрожь, послъ которой внутренній жарь следуеть; и хотя лихорадка въ семъ случаъ обыкногенно не очень сильна бываеть, однакожъ сопровождается оная непріяшнымъ жгущимъ и перемежающимся жаромв, также растрескиваніемв на ладоняхв и подошвахв кожи. Ожесточенія сей медленной лихорадки суть безпорядочны. Такожде появляется боль вы головь, вы поясницъ и въ кишкахъ, особливо по ночамв, когда больной начнешь вв постель согръваться.

Во время, как в сти припадки от в одной части к в другой переходять, походять они на припадки легкой

перемежающейся лихорадки, от в простуды или отпостентя желудка происходящей, и бывають не очень сильны, но больной уныль.

Естьли помянутые припадки соединены связвами, выростками или шишками вв дътородных в или других в частях в, то не должно ни мало сомнъваться, что больной страждет в бользной Венеры. Ежели же они не соединены св оными, то можно почесть их в тогда дъйствтем в переходящаго яда, особливо когда предшествовало оным в нечистое соите, или мъстная бользнь перваго заражентя худо пользована была.

Но скитающійся или св мѣста на мѣсто переходащій недугв обыкновенно не долго продолжается, а вскорѣ угнѣздивается вв той или вв другой части плотно.

Ежели засядеть ядь вы сукровичных сосудахь, то дылается Венерическая короста и множество другихь закожных бользней, о которыхь мы прежде говорили, и которыхь

торыя, естьли не будуть выльчены, паки сообщають ядь прочимь частямь, пока все тьло испортится и разрушится.

Венерическая короста можеть иногда долгое время пребыть легкою; она можеть оказаться сильнымь зудомь и спадывающими чешуями, по томь пропасть и причинить ночную боль. Оную почитали часто за цынготную, пока наконець послъдующая Венерическая зараза открывала наконець, хотя уже поздно, таковое заблужденте.

Когда ядь бросится вы железы, то причиняеты вы оныхы опухоли, но которыя опять проходяты прежде, нежели оны вы оныхы укоренится; а какой тогда вреды произвесть оны вы состояни, показали мы уже прежде вы своемы мысть. Больной получаеты за нысколько преды симы времени боль вы гортани, опухоль вы небы, жельяки на шей и т. д., которыя незапно таки пропадаюты, пока яды наконець утвердится и

окаженся въ той или другой часни, или повсюду разпространится.

Но естьли ядь вы сухихь жилахь, связкахы и мышкахы утвердится, то больной сильные поражается и получаеть судорожныя и ревматическія боли.

Венерическая домота бываеть часто судорогами сопровождаема, отъ чего жестокость оной не мало увеличивается. Любострастное судорожное спины и шѣла назадъ и напередъ скорчение (Opishotonus et Emproflhotonus) причиняло иногда ВрачамЪ великія затрудненія, пока не признали Венерической ядъ сокровенною онаго причиною и не истребили оное посредством в ртупных в средствв. Естьли мышечныя плевы Венерическимъ ядомъ объящы будутъ, то воспосабдуеть упорный равматизмв, который иногда одну только часть, иногда всв части облемлеть, а иногда от одной части къ другой переходить. Доколь ядь не остановишся, що нъшь части въ шълъ,

которая бы была отв заразы безопасна. Почему и чувствують часто таковые больные летучую боль, св головы до рукв или ногв, а оттуда до кишокв и другихв внутренностей простирающуюся. Во время таковаго нападентя можеть приключиться сильная головная боль, ударь и даже падучая бользнь, больнаго незапно потубляющая.

Ревматическая ломота бываеть обыкновенно наисильнъйщая, когда начнеть больной вы постель нагрываться, наипаче же когда оная домотою въ костяхъ сопровождаема бываеть. Естьми имъется боль въ мышечных в плевахв, то присоединяется купно недвижимость; при семв части иногда распухають и становятся тугими, иногда бывають онъ безь чувства, а иногда возженны и бользненны. Но ломота гораздо сильные бываеть, когда оказывается она въ составахъ; при семь опухають связки оныхв, дьлаются крайне чувствительными и Yacma II.

воспаляются, членосоставная влага претворяется въ существо известковое и песочное, и производить чрегъ то недвижимость въ составахъ, которая чувствовантемъ, будто что жуетъ, сопровождается.

Ломъ въ поясницъ и въ вертлюгъ бываеть также часто производимъ любострастнымъ ядомъ, и обыкновенно одинъ другаго сопровождають. Они оказываются въ припадкахъ и продолжении ихъ такъ какъ и не Венерические, и бываютъ въ ожесточенияхъ своихъ и порядочны и не порядочны, а иногда безпрерывны.

Мы описали уже прежде сего бользни костей, почему упомянемы теперы только о ихы предвъстницъ ночной ломоть. Оная находится иногда только вы одной, а иногда вы нысколькихы костяхы. Естьли произойдуты купно вы болящей кости выростки, бугры или гуммы, то довольно явственно, что оная есть рода Венерическаго; иногда же

происходять таковые бугры и желваки внушри косши, хошя и случается сте не такъ часто: почему происходить сильная въ головъ боль, такъ что больному кажется, будто нъчто въ головъ у него стучить, и чувствуеть при томь вь кости и сосъдственных в частяхв, будто что жуеть, что ночью, когда больной вь постели согрвется, всегда укеличивается и оказываеть на кость безпрерывное непріятное дъйствіе, пока наконець сїй недуги, естьли не будуть заблаговременно отвращены, достигнуть до высочайшей ихъ степени.

Естьли скитающійся ядь оть плевныхь, мышечныхь и другихь внышнихь частей какимь либо образомы прогонится назадь, то можеть оный легко пасть на внутренности и содълаться для нихь очень вреднымь.

Желудокъ состоитъ со всею животною машиною въ удивительной связи, такъ что онъ у нъ-

Aaa

жных особь, особливо женскаго пола, пріемлеть вь наимальйших внемощахь участве. Почему ежели оный Венерическим в ядом в поражен в будешь, то происходять, естьли онь не будеть вы скоромь времени протнанъ, многія зловредныя слъдствія, какЪ-то: тошнота, неварение желудка, желчное рыганіе, рвоша и другія бользни, посль которых в сльдуеть упорная слабость желудка, сопровождаемая иногда обжорливостію, пока наконецъ маразмъ, сухошка и чахотная лихорадка заключать сцену. А иногда появляющся еїи слъдсивія еще скорве, и двлается въ ономъ вожжение, котторое въ нагноение и омершвънје переходишћ, и шакимъ образомь содылываень вы скоромь времени жизни больнаго конець.

Но еще чаще бывають кишки заразъ Венерическаго яда подвержены. Онъ могушь получить оный отв влагь, въ оных разливающихся. А сверьхъ того можеть оный привлечень быть туда посредствомъ

неосторожно употребленных в сильных проносных , и произойши от в того дизентерія, понось и другія непріящныя слъдствія. Послъднія сушь наиначе достойны точнаго изсабдованія, поелику появляющся онв часто въ скрытной Венерической боавзни и приключаются обыкновенно от в неискуснаго больнаго врачеванія. Отв притечентя испорченной желчи, испорченнаго панкреатическаго сока и т. д. можеть, правда, произойши въ кишкахъ острота, которая въ состоянии причинить колики, воспаленія, поносы, дизентеріи и другія кишечныя бользни, отв чего скишающійся въ шълъ ядь Венерическаго рода или не Венерическаго равномърно туда притягивается. Однакож в обыкновенно причиняется таковое соковъ къ кишкамъ притечение посредствомь сильных проносных в или непомърнаго употребленія ртутных в средствв, особливо при слинопроизведении; а иногда причиняется сте также и неприличными смъще-

A a 3

ніями употребляемых в лакарство, из в коих в ни что так в не вредительно, как в смашенныя со свинцом в, которыя, будучи даны внутрь, составляют в медлительный, но смертоносный ядв: о сем в упомянем в болье в в другом в масть.

Въ Венерическомъ поносъ чувствуетъ больной воспалительный ръзь, сопровождаемый острымъ и вловоннымъ испражнентемъ низомъ и бользненнымъ жилентемъ; изпражненте бываетъ, правда, безпорядочно, однакожъ имъетъ нъкоторыя перемежки, или незапно больнаго убиваетъ, или дълается привычкою и умерщвляетъ онаго мало по малу посредствомъ дизентерти, отъ чего впадаетъ онъ въ сухотку.

Естьки постраждуть кишки оть пріугошовленій свинцовых в, то чувствуєть больной судорожную вы китках в боль, сопровождаемую сожатіємь оных в нарушеніемь их в дъйствій, пока наконець полуоживленное толо восприметь для встхъ неминуемый пушь.

Не ръдко падаеть Венерической ядь на легкія, больные дълаются удушливыми, и умирають чахоткою: сїе приключается обыкновенно вскорь посль того, како объявляются они совершенно посредством в слинотеченія излъченными.

Самое даже сердце не освобождено от в нападентя Венерическаго яда; ибо часто приключаются от в онаго полипы, трепетанте сердца, судорожное сожатте и скоропостижная смерть.

Такожде колотье въ груди и возжение легкихъ и другия внутреннимь частямъ свойственныя бользни могуть равномърно произойти въ сихъ частяхъ от скитающейся Венерической остроты.

Самое же зловредное дъйствіе, каковое можеть оказать Венерической ядь, есть то, когда нападеть оный на мозгъ. Оный почитается самою благороднъйшею частію тъла

и жилищемъ души нашей. Поелику есть оный кромъ того часть тъла непостижимъйшая, нъжнъйшая и многосложнъйшая, то и должны произойти въ-ономъ наиопаснъйшія и зловреднъйтія бользни, когда простреть ядь дъйствія свои на оный.

Мозгв состоить изв двухв главных в часшей, изв мозга (cerebrum) и мозжечка (cerebellum). Мозгъ составляемь наибольшую и наполняемь переднюю и верьхнюю часть черепа. Мозжечек в лежить непосредственно подъ онымъ въ запылкъ. Мозгъ кажешся наипаче быть пріугошовляющею частью, а мозжечек в чувственностію и первоначальною движимостію жизни. Давление, причиненное въ мозгу, производить безчувственность; наимальйшее же давление мозжечка мгновенно умерщваяеть. Оба они полвержены нъкошорымъ бользнямъ, кофини вынимкая размичныя от оных в производять дъйствія, но вскоръ также какв и оныя оканчиваются.

Изъ мозжечка происходить продолговащый мозжечекь (medulla oblon. дата) и множество нервовь, коихъ вышеви вы кажд по часть швла идушь. Все цалое объемленся швердою и мягкою мозговыми оболочками, которыя по всему спинному мозжечку и всьмь нервамь, даже и по малымь вышьвямь простираются, пока наконець теряются. Десять парь нервовь происходять извонаго, изв коихв составляють некоторыя внешнія чувсптва. Изъ спиннаго же мозжечка изходять тратцать нервных в парт, кои по встмъ частямъ шта разпространяются. Мозгь разделень въ длину на двъ доли, haemispheria навываемыя; сте раздъленте простираешся шакожде на всв нервы, даже и на шъ, кои изъ крайняго конца спиннаго мозжечка происходять, такь, что воспящается чрезь то сообщение чувства какой либо вътыви изъ одной стороны въ другую. Сверькъ шого состоять мозгь и мозжечек в изв разных в других в часшей, Часть И. B 6

какЪ - то: впадинЪ, железЪ, полостей и т. д. и снабдены многими боевыми, крововозвратными жилами и сукровичными сосудами.

Здъсь не мъсто, правда, входишь въ обстоятельныя изслъдованія сего таинственнаго органа, да и не имъемъ шого намъренія: ибо мы предпріяли описать здісь кратко токмо разныя бользни, причиняемыя скитающимся Венерическимъ ядомъ; но не смотря на то, не можемъ сставишь, чаюбь не уномянушь о шомь, что ньть такой вь тьль человьческом в части, коей многоразличныя цваи и опредвленности столь мало находимся мы въ состояній приник. нушь, какв самая сія. Мозговыя полости (ventriculi), мость Вароліевь, швло мозолистое (corpus callofum), и т. д. производять вь нась удивленїе, а пользы оных в проникнуть мы не въ состоянии. Можемъ мы конечно догадываться, что пребываніе души имвешся или въ кегельной железь (glandula pinnealis), или

вь четвертой мозговой полости или вь другой какой части; но что скажемъ мы, когда при вскрыній мертваго изла найдемъ, что сти части поражены бользнію и нагноеніемь вовсе изтреблены, когда однакож в больной до последняго мгновентя жизни его пребываль въ разумъ! Безуміе, или другой какой недостатокъ разума приписывается обыкновенно безпорядочному состоянію той или другой части мозга, однако находять иногда при разсмотрвний мозгв бевумнаго и мозго невъжи столько же здоровымъ и совершеннымъ, какъ и мозгъ самаго остроумнаго человъка. Сколь ни разумно мы о семъ дълъ разсуждаемь, однакожь всв наши заключенія останутся ничьмо инымо. какъ одною шолько догадкою.

Что Венерической ядь причиняль головную боль (cephalalyra), мигрень, головокруженіе, каталепсію (\*), ударь, Б 6 2

<sup>(\*)</sup> Просшо гово ишся по Руски: столбиякь.

мозговоспадение (phrenefis) и самое бъщенство и т. д., знаемъ мы изъ опыта, почему можно опасаться, что оный причинишь сїе и въ другихъ случаяхь можешь. А изь положения частей мозга можем в мы почти извяснишь, какимь образомь помянушыя бользни обыкновенно происходять. Когда объемлеть ядь твердую или мягкую мозговую оболочку, то двлается воспаленіе; от сего входящёе и изходящёе кровавые сосуды разширяющся, разныя мозга части придавляющся, и ошправленію должностей ихъ препятствуется; а какъ ядь оказываеть сверькь того вредное раздражение, то и можеть онь удобно разныя причинишь болъзни, и такъ смотря по разности тълосложенія, темперамента частей, оным в поражаемыхъ, и образа, коимъ оныя поражаются, причиняеть онь или безсонницу, или сонаивость, головокружение, кашаленсию, пострыль, головоболение, водяную въ головъ бользнь, мигрень, мозговоспаленіе или

безуміе и ш. д. Одно давленіе на мозго причиняето припадки, которые безчувствіемо сопровождаются; но естьли сіе давленіе сопровождает ся купно раздраженіемо какой либо остроты, то должны причиненные ото припадки гораздо сильно быть: а како оная купно и нервы раздражаето, то следовательно должна также и боль быть болье или менье жестокою, и причинить или сулорожныя сожатія во одной или во всехо частяхо тела, или онь-

Нать ничего обыкновеннае, какъ что больные, страждущие Венерическою бользнию, жалуются на голозную боль, которая бываеть иногда припадочною, иногда периодическою, иногда одно масто занимаеть, и у/ накоторых волючею и бысщеюся, а у других в тупою бываеть, такъ что больное масто только ноеть, при чемъ у накоторых везчувствению и безсоница, а у других в мозговоспаление и безумие приключа»

лось, кои или періодическими пребывали, или и на всю жизнь оставались. Вскрытіе мертвых і тъль довольно показуеть нам'ь вредь, причиняемый вь мозгу Венерическим'ь ядом'ь: ибо находили вь оном'ь мясистыя скирроватыя шишки и даже большія язвы, а вы мозжечкі иногда известковатыя и окостеньлыя существа.

Спинный мозжечекъ есть понастоящему часть, или паче продолжение мозга: поелику испускаеть оный многія нервы, кои часто любострастнымъ ядомъ поражаются, то слъдуеть, что и самъ онъ онымъ пораженъ быть можеть; сте явствуеть изъ полусторонняго паралича (hemiplegia) и апоплексти, по всъмъ частямъ тъла простирающейся, и другихъ опасныхъ бользней, коимъ любострастные больные подвержены бывають.

Вышеномянутыя бользни и еще многія другія могуть Венерическимь ядомь произведены быть вь сбоихь полахв. Но понеже женщины по природь ихв нъкошорымв другимв бользнямв подвержены, то и долженв также ядв, когда по всему ихв твлу распространится, вв состояния быть причинить вв нихв особенныя бользни.

Почти кажется невъроятным в что скитающійся вв тьль ядь вв состояніи произвесть у мужщинь влосвойственную гоноррею безь предетествующаго нечистаго сойтія (\*); у женщинь же случается сіе очень часто. Во время мьсячнаго очищенія дълается сильное соковь кв дътородным в частямь притеченіе, почену и можеть скитающійся вв то время ядь привлечень быть кв симь частямь; у имьющих в бъли прочисходить сіе гораздо скорфе.

B 6 4

<sup>(\*)</sup> Переводчику об Агличска о на НБмецкой языкъ извътень одинъ примъръ, что злосвойстве ная гоноррея приключилась посаъ сплынаго танцованья.

Женскія дітородныя орудія суть столь способны пришягивать кЪ себъ Венерической ядь, что женщина, коей соки наполнены Венерическимь ядомь, бываеть редко или никогда свободною отв отвощений внушренних дътородных орудій, какъ бы наружный видь не являль тому противное. Матка, янчники и маточныя трубы часто онымЪ поражаются; почему жалуются онъ очень часто на несносную вь сихъ частяхь боль, впадають вы сильные истерические припадки и въ нимфоманію, и происходящь въ машкъ и въ прочихъ частяхъ мясистые выросшы и язвы, кои ракообразными учинишься могушь.

Доколь мьсячное очищение пребываеть вы порядкь, можеть Венерической ядь долгое время содержаться тайно; но какы скоро оное у порожнихы (не беременныхы) женщины придеть вы безпорядокы, то приходины вы безпорядокы и все тыло, и происходять отвостановленнаго очищенія кромъ находящагося въ шълъ Венерическаго яда еще другіе острые влосвойственные соки, кои соединяются съ онымь и споспъшествують разрушенію шъла.

Еспьли объяпы будушь янчники, машочныя трубы, машка и къ беременности служащія части опухнуть, или язвы вь оных в подълаются, то должно произойти от того безплоде; но женщина можеть во многих венерических в бользнях в зачать, и иногда противу всякаго ожид нія родить, котя на ръдкость, здороваго младенца.

Как в скоро женщина зачнетв, то произходить вы тель ел другое распоряжение, а именно: воспослыдуеть сильное притечение соковы вы маткв, которая сообщаеть их в зародышу купно сы смішеннымы ядомы. Яды не только соединяется сы основаниемы онаго, но иногда и разрушаеть оное, прежде нежели достигнеть оное совершенной зрълости; почему и бывають сбыкновенно по-

таеннымъ ядомъ. Отпагощенныя особы подвержены выкидыванйю, и выкидыванйю, и выкидыванов зародышей увядшихъ, Венерическимъ ядомъ зараженныхъ и иногда до половины согнившихъ; даже и тогда, когда онъ въ надлежащее время рождають, приносять весьма часто младенцы знаки родительской болъзни купно съ собою на свътъ.

Симъ кончу я описание мое штхъ бользней, кои скрышнымъ въ штлъ скитающимся Венерическимъ ядомъ произведены быть могутъ, и приступлю къ описанию Венерической загразы вкоренившенся.

О Венеритеской заразв вкоренивтейся.

Описаво во предвидущихо Главахо разные способы, коими достиваето Венерической ядо во томо, и различныя части, кои оный ядо поражаето, окончу ядось матерію сію краткимо повтореніемо разныхо степеней и постепеннаго продолженія производимыхо онымо бользней.

Каждому разумному и предразсудковь чуждому Врачу извыстно, что всякая почти бользиь, Венерическимь ядомь, когда войдеть оный вы кровь, производимая, шакожде и доугими острошами причинена быть можеть. Ежедневные опышы научають также, что Венерической ядь вь состояния произвесть всевозможные роды бользней; по крайней мъръ царствуенъ между бользнами, от в любострастнаго яда приключающимися, и между шъми, кои не онымъ причиняемы бывають, толикое сходенво, что естьли не имбемь мы надежныхь доказательство во разсуждени первоначальнаго ихв происхожденія, то должны искренно признашься, что мы не въ состояни съ достовърностію утвердить: Венерическаго ли онъ, или не Венерическаго сушь рода; но какимъ же образомъ доспінгнемь мы въ шаковых в обстоящельсшвах в до исшиннаго оных в познавія? Сіе - то и есть самое затрудненіе; однакож в должень я также признаться, что таковые распознательные признаки безполезны, как в скородълаются оные св затруднением в.

Ежели мы происхождение врачевства преслъдуемъ, то найдемъ, что во время, когда оное таинственнъйтимъ, искуственнъйтимъ и перепутаннъйтимъ было, было оно такожде и съ величайтими сопряжено нелъностями, и такъ какъ туманъ оный изчезалъ, учинились также простота и истинна глазамъ нашимъ явственнъе:

Истичное познаніе бользни состоить вы познанін ел стойства и действія и сложенія півла, на которсе оча дыствуєть; что надлежить до первоначальнаго произхожденія оной, то можеть оно весьма различно быть, а дыствія имыть одинаковыя: слишкомы точное вы семы дыль стараніе являло часто одно только заблужденіе, вмысто того чтобы распространить ныкоторый свыть вы разсужденіи льченія. Недолжно однакожь думать, чтобы я отвергаль здвев всв различіл и испытанія о происхожденіи бользней; нвшь: ибо я хоту чрезь сїє только сказать, что свойство бользни и тивлосложеніе больнаго должны привлекать кь себь величайтее вниманіе наше.

Предпославъ сте наперелъ, преподадимъ мы шеперь существенные признаки, которые учинатъ насъ способными судить о болтани: Венерическато ли она есть рода, или нътъ.

И такъ надлежить сперьва вывъдать от больнаго искреннее от вътствование на слъдующие вопросы: не имъль ли онь когда сообщение съ нечистою особою, или не заразился ли Венерическимь ядомь другимь образомь? Не имъеть ли больной, или не имъль ли не задолго предъ симъ какой либо мъстной Венерической больной, какъ то: злосвойственной гонорреи, бубона, танкеровь, опухоли въ янчкахъ или Венерическихъ выростковъ; продолжаются

онъ еще, или незапно скрылись, и не произошло ли послѣ таковых в мъстных в бользней летучей боли и другихъ принадковъ? Не подверженъ ли онъ членосоставной или ревматической ломошь, каменной бользни, а женщина особенно бълямъ и ш. д., какь онь при шомь содержаль себя и какую употребляль діэну? Когда будеть онь на все сте откровенно отвытствовать, то могуть всь сомивнія легко истреблены быть. Сверьх в того им вются общёе признаки, кои не пребующь дальнаго объясненія, какі - то: элосвойственная гоноррея, фистулозный бубонь, затвердълое янчко и т. д., особливо у такихв, которые виновны и наказаніе заслужили. Но вообще при всъх внаших в изслъдованіях в, общили сушь признаки или сомнишельны, и больной виновень или не винень, можешь дыйстые вы подобныхы бользняхь бышь равно; и шакь, когда бользнь сходствуеть сь Венерическою, то должна какЪ таковая и врзчуема

быть, хотя она Венерическаго или не Венерическаго есть рода, буде только желаем имъть въ томь благополучный успъхь. Но что таковое льчен не въ томъ состоить, чтобь давать ртуть по ложкъ, или производить чрезмърное слинотечен , а что таковые неосторожные способы льчен по больной части болье вреда причиняють, нежели самая бользнь, покажу ниже сего.

Теперь станем в преслъдовать бользнь сто св ен начала до того пертода, въ который бываеть она въ состоянти разрушить все тъло.

Прежде должны мы еще шолько напомнить, что она соразмъряеть дъйствія свои не шолько по старольтію, но такожде по темпераменту, тьлосложенію и по бользнямь, коимь больной наипаче подвержень бываеть. Дъти, кои обыкновенно соками изобилують, и у коихь плотныя части мятки и гибки суть, улобно поражаются вь сей бользни гноевыми язвами, повсюду разпро-

спраняющимися, и коста оныхв станованися мягки и мясообразчы. Люди посредственных в льшь подвержены болье выросткамь на костяхь, узламь и фимическимь желвакамь, которые вы влосвойсиненныя язвы прешворяющся. Пресшарълыя же особы полвержены напиаче хепрозіи, повсемсиненной гними вы костяхь, вътреной ости, хрупкости костей и т. д.; но все сте перемъняется различнымь образомь темпераментомь, климатомъ, шълосложениемъ, родомъ жизни и другими присоединяющимися бользнями: такь поражается на пр. робенокь, объятый сею больянию, которая чахотною лихорадкою сопровождается, точно такимъ же обравомв, какв и старые, а вв старыхв людяхв, мокротнаго півлосложенія, перемъняется состояніе их в пропорціонально. Часши, Венерической ядь прежде возпрінвшія, обыкновенно наиболье претерпъвають, такь какь и ть части, кои прежде отв бользни страдали, поражаются обыкновенно Венерическимъ ядомъ сильнъе: однакожъ имъются въ семъ изключентя.

Первый припадокъ, при повсемственномъ заражении являющийся, есть небольшая безпорядочно перемежающаяся лихорадка, которая сначала небольшою болью въ головъ, вь рукахь, ногахь и кольнахь и повсемственною усталостію и унынїемь сопровождается. Но мало по малу боль усиливается, особливо около ночи, когда больной начнеть вь постели награванныся; ночи становяшся всегда безпокойнье и препровождающся въ безпресшанномъ ворочании съ боку на бокъ, пока наконець придешь подь утро легкой сонь, который больнаго ободряеть и укръпляеть его къ понесентю муки слъдующей ночи.

Боль вы головы болые и болые увеличивается; иногда бываеты она тупая, а иногда кажется больному какы бы черепы его вы томы или другомы мысты гвоздемы просверлены Часть II. В в.

быль, отв чего и произошло Латинское сей боли название: clavus. Потомв возраждаются мало по малу на черепь, на рукахв и берцахв небольште желваки; вышепомянутыя части и составы становятся чувствишельными и причиняють больному поперемънно безпрестанную боль.

Мало по малу появляется купнона головъ короста; глаза начинають гноиться и авлающея вв нихв язвинки; на бровях в и на передней части толовы выходишь воспалительная чемуйчешая сыпь, кошорая по вискамъ въ волосистой части до запылка простирается и Венеригеской вінецо образуеть. Сыпь разпространяется по малу далве по лицу и доходишь до ушей, портить вы оныхы стру, развъдаеть къ слуху принадлежащія часпи и наполняеть слуховый проходь вловонною матеріею; вь семь наипаче надлежить искать причину вуда, шуму и лому во ушахо, отягошительной тупой боли вь вискахъ и неправильнаго слуха. Сыпь разширяется далве, губы получають язвины и струпы, углы рта и носа разтрескиваются, трещины ихь гноятся, становятся кръпкими и мозолистыми и издають острую разъвлающую сукровицу.

Вся кожа становится тароховатою и покрывается небольшими желлыми чешуями, причиняющими иногда сильной зудь; глаза содълывающся шускаыми, шяжелыми и красными; лице опухаеть, покрываешся ченнуями, пяшнами и возвышенноспіями и получаеть темножелтой цвъть. Въ то же время начинающь купно опухащь миндалины, становятся кръпкими, и оказывается вь оныхь быющаяся боль; горпань двлается крвпкою и неудободвижимою, а промежду мускуловь оной раждаются разной величины опухоли. Въ рошу появляющся язвы; щеки покрывающся внушри сыпью; языкъ распухаеть и покрывается шароховатою, твердою, мокротною корою; на небъ и вы горав происходящь опухоль и

язвы; небо обсъдается тугими желваками; носъ толстветь; ноздри разширяются, оть машерїи залегають и изтекаеть изь оныхь зловонная сукровица.

Струпья вь волосахь делаются подобными коръ, волосы теряютъ природный ихв цвъшв, дълающея толще обыкновеннаго, съдъють и мало по малу выпадающь. Составы вь рукахь, руки и пальцы опухають; ногши далающся широкими, шолсшыми, шароховашыми и желшыми, загнаиваются и снадають. Фимы и гуммы въ верхушкахъ своихъ остръють, воспаляются и издають оть себя клейкую сукровицу, которая засыхаеть и покрываеть ихь клею подобною корою. Кости опухають особливо въ составахъ и становятся шароховащыми. Въ желвакахъ раждается воспаленіе; составы дълаются неудободвижимыми; голосъ охриплымъ; ръчь невразумительною; дыханіе тру днымь; легкія подь бременемь изне могають; аппетить теряется; роть какь бы деревяньеть и остается до половины отверятым!; дыханіе становится зловоннымь; дута учиняется унылою, заботливою и приходить вь отчанніе.

Вошь дъйствишельная вкоренившаяся Венерическая зараза; шаковою оказывалась она обыкнозенно від то время, какв привлекла на себя встхв внимание въ Европъ, и шаковою оказывается она иногда еще особливо вь больницахь. Мы конечно счастанвы, что открыли накоторыя превосходныя свойсшва ршушных в составовь, особливо вь сей бользни; а еще счастивые будемы, когда совершенно узнаем в надлежащее упопребление сего превосходнаго средства. Благодъщельности сего общаго средства, естьли только нашура таковыя производила, обязаны мы, что въ нынъшийя времена не столько людей содблываются мучениками сей бользни, какъ прежде, хошя образь шеперешней жизни нашей столькоже не истовь и зло-

В в 3

вредень, какь и прежде быль. Не смотря на то, что Врачебная наука достигла во дни наши до такой степени, однакожь изобилуеть она еще множествомы глупыхы мньній, которыя сь древними довольно сходствують; сему приписать должно, что хотя Венерическая зараза рідко является вы старомы своемы видь, однакожь пріемлеть на себя другіе, которые хотя по наружности не такь ужасны, но столькожь несчастныя для больнаго слідствія имьють.

Есшьли разсмотримъ тщательно Венерическую заразу, Илвсы и проказу (Lepra, Elephantialis), то най-демъ, что оныя суть отмъны одной и той же бользни, кои въ отношении тълосложения, климата и образа происхождения между собою разиятся.

Естьми страждеть больной вы то время, как в появятся припадки приближающейся Венерической заразы застарымою гноеватою течью (Gleet), то перемынается оная вы наизло-

свойственнъйтую гоноррею; происходять шанкеры, незалупа и неотлупа; такожде раждаются бородавки, гребешки и т. д. на кожъ мужескаго уда, на шулятахъ, въ такъ, въ пахахъ и въ заднепроходномъ отверэтіи у мужщинъ, и во внутреннихъ тайныхъ частяхъ у женщинъ бородавки, гребешки и другіе Венерическіе выросты; они увеличиваются, сливаются и приводять всю срам ту въ гнилое злосвойственное нагноеніе,

Приключающия бубоны, которые содълывающия крънкими, скирроватыми и ракообразными, и имъють сообщение посредствомь фистуль съ опухолями бедренныхы мышекь, и равпространяють нагноение и язвы по всъмь сосъдственнымь частямь.

Боляцій получаеть безпорядочные лихорадочные припадки; иногда имъеть онь ознобь, подираніе по кожь и слъдуеть сильной жарь, иногда имъеть полный и медленный пульсь, сопровождаемый біеніемь сердца, и слъдуеть тягостной и сильной ношь, который красить былье; потомь дылается паки прясение и малой нульсь, сопровождаемый повсемыетною слабостью, потемныйемы врытя, головокружениемы и обморокомь, пока наконець сражающаяся натура паки не ободрится и не нобудить животную машину къ отправлению ея вы безпорядокы приведенных работь, и помянутые безпорядочные припадки снова не появятся.

Теперь сабдуеть конець бользни. Безпрестанный ломы во всей головы ощущается; вы передней части головы, вы глазахы, вы носовыхы костяхы, вы вискахы и вы небы чувствуется вы костяныхы частяхы воспалительный палящій жары; дылается бользненная дизентерія, странтурія и запоры мочи, трудная рычь, трудное глотаніе и дыханіе. Вы семы несчастномы состояній принуждены больной, кромы терзанія совысти, терпыть наижесточайтія мученія, какія только вздумать можно.

Наконецъ опухоли, желваки, надкостные выростки, фимы и гуммы прорывающся, и превращающся вЪ злосвойошвенное, сливающееся и повсюду разпространяющееся нагноеніе. Короста на головъ въ разныхъ мъсшахЪ прорывается и вышекаеть изъ подъ оной зловонный водянистый гной; нось гноится и ноздри наполняются выростами; глаза матеріею зальпливаются, а иногда делаются во оныхъ язвы; изъ ушей изтекаетъ чрезвычайно противная запахомъ сукровица; рошь гнопшся, небо развъдается и получаеть противоестественное сь носомь сообщение; горшань покрывается язвами; зубы выпадають, и дыханіе дьлается какъ для больнаго, такъ и для встхв около его находящихся, несноснымъ. Косшные выростки прорывающся, кости поражаются гнилью. становятся хрупкими, отщепляются и издають от себя острую злокачественную и сукровичную машерію.

Наконець учиняется все тьло вонючею испорченною массою. Язы  $Yacm \ b$  II.  $\Gamma$   $\Gamma$ 

умножаются, члень за членомь отпадаеть, пока наконець къ жизни служащія орудія порчею поразятся, и больной умираеть.



E TA TO MESSAGE


CONTROL TO

# ЧАСТЬ ТРЕТІЯ

0

ВРАЧЕВАНІИ

ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛЬЗНЕЙ.



## О ВРАЧЕВАНІИ

## ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ.

### ВВЕДЕНІЕ.

Разсмотръвь вы предвидущихь частяхь состояние разныхь степеней. Венерической бользни, приступимы теперь кы способу врачеванія оныхь.

Не довольно того знать, что ть или другія цьлишельныя средства, той или другой бользни приличны супь; хорошее дьйствіе, нами оть нихь ожидаемое, зависить совершенно оть того, чтобь знать надлежащее время, когда оныя употреблять, и оть познанія ихь свойствь, силы и дьйствія, оными вь тьль человьческомь производимаго;

Часть III. Ггз

кв сему еще присовокупить должно приличное обстоятельствамь больнаго содержаніе и діэту. Безь сего познанія и безь надлежащаго вы поступкахь нашихь показанія будеть и наилучшее средство вы той же бользни ядомь, для изцыленія которой оное опредылено было.

По сему на разумь и опыть основанному плану намьрень я объявить льченіе Вене-

рических вбользней.

#### ГЛАВА I.

6

О тълосложенияхо и темперамен- ] тахо.

Паипревосходнъйшее при избранти дъйствительных средство дъло должно состоять во томо, чтобо разсматривать тщательно предметы, во коихо должны онъ производить дъйствие. Ибо чъмо болье размышляемо мы о томо, что никакое лъкарство не дъйствуето во мертвомо тълъ, тъмо болье находимо мы, что дъйствие лъкарство ни по законамо движения, ни количествомо оныхо, ниже образованиемо частиць ихо истолковать не можно.

Математика и Химія могупів великую имъть пользу віз доставленія душь нашей хорошаго понятія о экономіи живопіныхів; но сныя ни мало не обіясняють наміз различ-

ных дъйствій, хотя и имъют онъ со многими другими основательными ваконами всякаго другаго естественнаго явленія участіе во цъпи вещей.

Что люди во разсуждении их в твлосложения и темпераментово между собою различны суть, никакого не требуеть доказашельства, и что одна и та же причина часто совсъмо различныя во оных в производить дъйстви, также весьма явственно. А како сте замъчанте имъеть мъсто во здоровых в тълах в, то тъм менъе усомнятся во истиннъ онаго во тълах в, бользнию зараженных в.

Тълосложение и темпераменто принимаются по большой части въ одинакомъ смыслъ. Однакожъ первое показуетъ настоящее состояние тъла, а сие заключаетъ въ себъ естественную способность и расположение къ тъкоторымъ дъйствиятъ.

Древніе раздъляли темпераменты на Флегматитеской, Сангвинитеской, Холеритеской и Меланхолитеской, и приписывали причину оных Б преизобилующей предъ другими влагъ. Различія и характеристическіе признаки нъкоторымъ образомь останутся, хотя мы преданіе древнихъ в происхожденіи оныхъ и ихъ знаковь вь здоровомь шталь болье и не пріемлемь: ибо темпераменны спюлько же зависять оть состоянія плошныхв, какв и жидкихв частей, и такъ между собою смъщаны, что почии во всякомь швав находишея по нъскольку от в каждаго, или по крайней мъръ всякое швло способно къ принятию каждаго изъ оныхъ, как в найдем в сте изв пючнаго изслъдованія тьла нашего подтвержденнымь. Но дабы мало по малу досшигнушь нашей цели, по разсмотримъ прежде человіка въ здоровомъ его состояній съ начала рожденія до его вступленія; мы найдемъ, что разные темпераменты сообразны бывають разнымь степенямь старости, и что они, пребывая в естественномъ семъ состояни, здравию благопріямствують.

Вь младенчествь бывають плотивыя части очень мягки, и вь отноменйи кь жидкимь частямь, вь оныхь содержащимся, весьма рыхлы, что и препятствуеть волокнамь вь ближайшемь прикосновении.

Въ юности имъють оныя равномърное отношенте; волокна болъе напрягаются и дълаются напряженнъе, а кровь становится гуще. Дъяшельность, разумь, живость и страсти становятся сильнъе и интереснъе.

Въ мужескихъ лътахъ достигають возрасть, сила, духъ, страсти и разумь до высочайшей ихъ степени. Плотныя части напрягаются и становятся кръпкими, имъя однакожъ прежнюю ихъ раздражительность. Жидкія части становятся остръе.

Вь тлубокой старости становятся плотныя части твердыми и неудободгижимыми, и литаются мэло по малу великой своей раздражительчости. Жидкія не только вь разсужденіи количества своего, но и въ разсуждени жидкости убавляются, и обращение крови содълывается мало по малу медленнымъ.

Сіи суть естественные періодическіе темпераменты, кои въ здоровомъ тъль должны непремънно соображаться съ началомъ, возращеніемъ и уменьшеніемъ жизни. Но естьли имъется особенная склонность къ воспріятію нъкотораго рода жидкости болье другой, или паче къ слабости, напряженію и кръпоети волоконъ, то и сіи періодическіе темпераменты отступають болье или менье оть постепенной старости, въ коей человъкь находится.

Флегматитеской темпераменто имбеть много клейких мокроть; волокна сушь слабы, мягки и неудобораздражительны, движенё имбють медленное, оть чего также и соки медленно обращаются.

Сангвинитеской темпераменто имћето со прежнимо одинакую слабость волоконо, но снабжено при том'в большею раздражительностью, отв чего и бываеть двятельные; сверьх в того изобилуеть оный хорошими соками.

Холеритеской имѣешъ большую прошиву прежняго раздражительность; волокна оваго сушь болѣе напряженны, а кровь густве.

Меланхолитеской имбеть большую напряженность волоконь, но менбе раздражительности чъмь прежній; соки супь густве, а можеть быть и острве, и вы меньшемь количествь обрытаются.

Отвенти вы произведентя вы ответнительных средства полезны бывають вы ответнительных скорый памо соковь обрящентя, то вы то самое время были бы ответных средства соковь обрящентя, то вы то самое время были бы ответных способны бывають или способны бывають произведентя, по вы то самое время были бы ответных способны бывають произведентя, способны бывають произведентя, способны бывають произведентя, способны бывають произведентя,

дишь вь сихь двухь шемпераменшахь столь различныя дъйствія. Между тъмъ, какъ полезно бы было ускоришь жизненныя действія ві шель флегматика, и испразнить излишніе онато соки, то причинить сте вь швав холерика горячку, приведеть вы движение желчь и произведеть желчную колику, понось и т. д. Такимъ образомъ происходишь и съ прочими; одно абкарсиво окажешЪ противныя дъйствія, или вредныя или полезныя, смотря по разности темперамента и тълосложения, въ коих в должно оно производить дыйemisie.

Равнымъ образомъ должны мы принять въ разсуждение, какия дъй. сния климатъ, образъ жизни, упражнение, душевныя движения и обыкновения въ сихъ случаяхъ произвести въ состояни бывають.

Разсматривая климаты, найдемь мы, что почти каждый изь оныхь своихь жителей карактеризуеть; сте

бываеть не только вь обыкновеніяхь и нравахь, но и вь бользняхь.

Чию касается до содержанія и діяты, то обжорливость и недостатокь вы самой нужной пищь произведуть, безь сомный, совсымы различныя дыйствія какь вы темпераментахь, такь и вы бользняхь. Такожде и упражненія нати подвергають нась многимы хорошимы и дурнымы дыйствіямы, ком
или соотвытствують врожденному
нашему тылосложенію, или бывають оному противны, и имьють оть
того великое на тыло наше вліяніе.

Естьян разсмотримъ страсти, то найдемъ цълов поле для мыслей нашихъ открытымъ. Союзъ души съ тъломъ есть столь тъсенъ, что непремънно должно одно оказывать дъйстеїя свои на другое.

Досель разсматривали мы человыка вообще; но когда разсмотримъ каждый поль особо, то найдемь, что все строенте тыла женщинь весьма много оть мужескаго разиствуеть.


Мужщины сушь от природы сильны и мужественны; женщины же суть напротивь того слабы и боязливы. И такь оные клонятся болье от сангвиническаго кь холерическому и меланходическому темпераменту; а сти удаляются болье от холерическому и флегматическому темпераменту.

Сверьхъ того строенте тъла ихъ, кромъ дътородныхъ частей, во многомъ отъ натего отличается, а особливо въ строенти костей, такъ, что можно сказать: строенте и сложенте ихъ имъютъ одно только подобте натего. Есть также и еще одно обстоятельство въ женскомъ полъ, которое во всякое время требуеть натего внимантя, а именно: мъсячное очищенте, о которомъ мы выше сего говорили.

Вышепомянутое о твлосложеніско и темпераментах разсужденіс пригодить нась вы состояніе справедливо разсуждать о многихы обстоятельствахв, происходящихв въ больныхв отв принятыхв лакарствв.

Я повторю еще кратко. Изъ вышесказаннаго явствуеть, что клейкая кровь вы штат, коего плошныя части слабы суть, должна худо обращашься, и что поелику плотныя части имъють недостатокь вь раздражительности, то и кровь не имъетъ въ себъ надлежащей связи: таковый случай бываеть у флегмашика. Сангвиникъ имъешъ великое изобиліе крови и велихую раздражишельность, но напрошиво того, сушь волокна онаго слабо напряженны. У хелерика раздражительность вь волокнахь весьма велика и кровь въ разсувдении ея количества слишкомъ густа. У меданходика кровь слишком в остра и в весьма маломв количествь обратается, плошныя части супь слишком в тверды и не довольно имѣюшь раздражительности.

Изъ сего удобно уразуметь можно, почему нъкоторыя лакарства одному полезны бывають, а другому вредь навлечь могуть. Почему и надлежало бы не только въ Венерическихь, но и въ другихъ бользняхъ имъть къ сему особливое вниманте.



### ГЛАВА ІІ.

О содержаніи и діэть.

Посль помянущых в темпераментовы наидостойный шее примычанія есть разсужденіе о содержаніи и діэть, двухы наинужный шяхы вещей, служащихы кы сохраненію здравія и кы возвращенію онаго вы случав потери.

Умъренность и порядокъ суть хранители натуры; противное онымъ вредно и для бозпрерывной цъпи вещей. Обыкновенте производить иногда чудеса, и дълаеть для насъ самое вредное безвреднымъ; однакожъ первый проступохъ всегда

часть III. ДА

сопряжень сь неудобствомь. Привычка хотя и сильна, однако имѣеть свои границы; а хотя мы и кь яду привыкнуть можемь, то все вь состояніи онь когда нибудь спровадить нась на тоть свъть. Тъ, кои почитають, что натуру ко всему пріучить можно, забывають при томь наилучшее изь всъхь обыкновеній разсудокь. Оть того находять они наконець, что всь ихь худо избранныя привычки купно сь ихь жизнію, натурою и слабымь тълосложеніемь становятся имь вь тагость.

Пища и пите, соно и бавне, покой и движене суть для сохраненый бренной нашей машины непременно нужны. Каждое изо нихо служито при надлежащемо употреблени ко спокойстви и заравию. Но како скоро преступимо законы оныхо, то бываемо не здоровы. Природа дала намо показателя ко симо законамо, а привычка оные утвердила, и чомо болье привычка

согласуется съ законами природы, тъмъ здоровъе бываетъ при томъ человъкъ.

Умъренность есть источникъ здравія и такая добродьтель, безъ коей мы истиннаго блаженства достигнуть не можемъ. Но умъренность не есть свойство больныхъ, Венерическою бользнію страждущихъ; а поелику взялся я за ихъ дъло, то справедливость требуеть, чтобъ напомянуть имъ прежде о главномъ предметь, служащемъ къ ихъ сохраненію, и въ коемъ они наиболье нужду имъють.

Подь названіемь умфренности разумью я умфренное наслажденіе вы утфхахь жизни; но я не понимаю, для чего осуждають больнаго за его бользны на скудное содержаніе и заточеніе. Естьли бы лишили здороваго человька здоровой его пищи, употребленія свыжаго воздуха и посъщенія друзей, и заключили бы его вы малой покой и принудили бы вдыхать гнилыя испаренія, отказали бы ему вы движеніи,

главной подпоръжизни, и учинили бы въ разсужденти его дтэты совсъмъ другое распоряженте, то узнали бы, что сте также въ состоянти разрушить наикръпчайшее тълосложенте, какъ обжирство и сладострастте.

Умъренность наблюдаеть средину между изобиліемь и недостатькомь. От объихь сихь крайностей имъеть природа отвращеніе, и то и другое столько же вредно для здороваго, какь и для больнаго. По моему мнънію, что касается до одного, то касается и до другихь, и одна только натура опредъляеть различіе, которое при семь наблюдать надлежить.

Воздухъ есть наипревосходнъйшая стихія, въ которой мы для жизни нашей имъемъ нужду, и не нужно доказывать, что здравіе наше почти единственно отъ чистоты онаго зависить. Когда здоровые толикую нужду въ ономъ имъють, для чего же хотимъ мы лишить онаго больныхъ? И такъ, въ какой бы вы бользни ни находились, наслаждайтесь онымь какь можно вы величайшей чистоть его! Я самь толикую имью кы оному привязанность, что лучше соглашусь подвергнуть себя на свобожюмы воздухь дождю, граду, сныгу и солнечному зною, нежели заключить себя вы малую, запертую, темную и узкую комнату, какы бы ни была оная хорошо убрана.

Свыть разномырно нужень для возраста животныхь и прозябений; произрастыне, будучи лишено свыта, увядаеть и опадаеть, также и тыла животныхь долгое время безь снаго обойтися не могуть.

Теплоша не только нужна по тому, что сохраняеть соки вы надлежащей ихь жидкости, а плотныя части вы накоторой пропорціи между слабости и напряженности, но и по тому, что очищаеть и осважаеть воздухь каждаго извастнаго намы тала.

Для moro выбираль бы я для себя всегда вь здоровомь или боль-

номъ состояни спальню свътлую и пространную, которая бы доставляла свободный входь воздуху, однакожь накимь образомь, чтобь ни постеля моя, ни я, на которомъ бы мъстъ ни находился, не быль подтержень сквозному воздуху. Вь оной надлежало бы бышь камину, на которомъ можно бы было по состоянію стужи и сыросни воздуха разводить огонь; а как в скоро саблался бы я больнымв, то должень бы быть безпрестанной на ономъ огонь, не смотря на существующую бользнь, годовое время или климать. Кровать свою поставиль бы я такв, чтобв оная ни сквозному воздуху дверей и камина, ни прямо входящимъ солнечнымъ лучамъ не подвержена была. Не терпъл бы я никакой жаровни, ни печи, которыя бы изв вив покоя попились; столь же мало терпъл бы наполненное испражненіями судно по причинъ распространяющихся испареній; а есиьла бы и принуждень быль оставить оное въ моемъ поков, що должно бы

оное содержимо быть в величайшей чистоть.

Чистота есть для тыла то, что добродътель для души, и пока могь бы я досшать воды за деньги, по сталь бы мынься тенлою или студеною, какв бы лучше сносишь могь, здоровь ли бы я быль или болвив. Былье перемыняль бы я столь же часто, когда я больнь, и естьли бы потребовала того бользнь еще и чаще, нежели в вздоровом в состояніи; оное должно бышь чисто и не накрухмалено, у огня хорошо высумено и опять остылое; также должно оно быть никъмъ не надъванное, как в нъкоторые совътують: ибо я не понимаю, для чего бы присовокуплять чужія испаренія кв моимв собственнымь.

Сонъ и бдъніе опредълены отв природы къ перемънному покою и движенію тъла нашего; оныя должны соотвътствовать льтамъ, темпераменту, годовому времени и климату.

Поелику здоровый сонь укръпляеть и тьло и душу нашу, то
произзольныя движенія и дьятельность дають онымь новую жизнь.
И такь какь то, такь и другое
для спокойствія и пріятнаго наслажденія бытія нашего нужны. Но
излишество или недостатокь какь
въ томь, такь и вь другомь разрушаеть порядокь нашей машины, и
производить какь вь тьль, такь и
вь душь вредныя дьйствія.

КакЪ во время здороваго, такъ и больнаго состоянія надлежить сте замвчать, и собственныя чувства наши должны намъ въ семъ случат путеводительствовать. — Работай душею и тъломъ до тъхъ поръ, пока примътишь, что оныя начинають ослабъвать, и долъе уже не продолжай; спи, пока почувствуещь себя укръпленнымъ, но не долъе; какъ скоро примътищь, что постеля становится тебъ въ тягость, то оставь ее, ежели нозволять другія обстоятельства; а когда примътищь,

чио вставание для тебя тягостно, и чувства твои зовуть тебя кь покою, то савдуй имь, не смотря на время. Вь здоровомь состояни повельваеть привычка, и оной савдовать надлежить; но вь больномь состояни не должно савдовать привычкь, но оставить господствование Природь.

Отъ страстей и душевныхъ движеній надлежить во всякое время оберегаться, а наилаче во время неэдоровья. Тишина и спокойствіе духа много способствують къ выздоровлению, такъ какъ напрошивъ того неудовольствіе, вспыльчивость, а наиболъе досада оному препятсшвующь, поелику онъ однъ сушь уже въ состояніи разрушить наилучшее сложение. Неудовольствие свойственно однимъ только слабымъ душамь, и есть знакомь худаго образа мыслей. Разумныя души стремяшся къ спокойствію, и размышаяють о предстоящемь имь блаженствь, а безумныя сожальють о Ee Часть Ш.

прошедшемЪ, не извлекая изъ онаго правиль для настоящаго. Внезапныя душевныя движенїя происходять также отъ слабости души, которая предпріятіємъ быть къ непредвидимымъ случаямъ безчувственнымъ, и стараніемъ имъть всегда присудствіе духа, удобно уменьшена быть можетъ.

Пищу нашу получаемъ мы изъ дарства прозябаемаго и царства живошных в; нъкоторые народы беруть также не много и изъ минеральнаго царства, а именно: соль. Изв прозябаемаго царства употребляемъ мы плоды, правы, коренья и съмена; а животных в почти изв всъхв родовв. Естьли разсмотримъ травы вообще, то были онв можеть быть всв опредълены для пищи особенных в живолиныхъ; насъ же научила Природа и опыть избрать для пищи нашей такія, которыя для вкуса пріятны сушь, и анбо во сыромо уже состояни, или будучи сварены, имъють свойсыво сахару подобное, клейкое или

масленое. Но ть, кои противныя сказывають свойства и вяжущи, остры или горьки суть, или впрочемь непріятный вкусь, или запахь имьють, не опредълены, кажется, для пищи человьческой, развы лишатся онь вы послыдствій сей остроты или сами собою, или чрезь искусство: а естьли и имьется оть нихь ныкоторая польза, то сная состоить вы ихь раздражительномь свойствь, почему и многія изь оныхь вы поварняхь употребляются.

Всъ растънія, от в которых в можно ожидать питанія, имъют в сахару подобныя и масленыя свойства, которыя будучи надлежащим в образом в смъщаны и прізуготовлены, приближаются болье или менье к в свойству кислоты, или являют в алкалическія дъйствія; а как в онъ в сем в случать болье или менье пропорціонально содержатся, то и дълаются сообразные желудку, и тогда можно их в почесть болье или менье питательными. От в чего и

зависить питаніе, ими содълываемое, не столько оть нихь самихь, какь наиболье оть количества, въ которомь онь пріемлются, и оть тогдашняго расположенія желудка.

Плоды каждаго климата бывають обитателямь онаго наиболье приличны; искусство сколько бы вы семь ни умудрялось, то все не достигнеть до природнаго. Естьли, на примърь, желаеть кто отвъдать ананась и судить обь ономь надлежащимь образомь, тоть должень отвъдать оный на его родинъ.

Плоды, травы, коренья и съмена, поколику содержать въ себъ белъе или менъе сахарнаго и масленаго, по тому и бывають болъе или менъе питательны. Уравненте оныхъ происходить по больтой части посредствомъ кислоты, въ оныхъ содержащейся и броженте производящей, отъ чего и получають оныя во время пртуготовлентя питательнаго сока свойство частей животныхъ. Питанте, ими доставляемое, бы-

ваеть не такь остро, но и не такь живо, какь получаемое оть мясной пищи; сего ради и бываеть оно неиприличныйшимь вы горячихы бользняхь.

Теперь разсмотримь, въ чемь состоить выгода и невыгода мясной пищи предв пищею изв царства прозябаемаго. Распівнія содержать нікоторую кислоту, на чемь и основываешся большою частью ихв превращеніе, и сокъ ихь дълается посредствомь разныхь степеней брожентя болъе или менъе пишашельнымъ и отв произшедшаго отв того раздраженія подобнымь сокамь животныхь; мясная пища дъйствуеть напрошивь того посредствомъ алкалическаго своего свойства, а разрушение оной происходить посредствомь кь гнилости склоннаго превращенія. По сей причинъ досшавляеть оная болье питанія и придаеть болье силы и крьпости, нежели пища, изъ царства прозябаемаго взятая: но напротивъ того она скорве производить остро-

Ee 3

таеть кровь къ воспаленіямь и все тьло кь изобилію желчи и гнилости.

Мы выбираемь обыкновенно для пищи нашей ручную скопину, а изъ сей наиболье жующих жвачку. Говядина и баранина имъють можеть быть предь всеми преимущество. Выки пасушся на лугахв и долинахв, гдъ расшеть сочная трава, а овцы избирають для пасства высокія мъста. Между прочею мясною пищею пишаемся мы шакже свиньиною. Хошя и приносить оная различную пользу, доставляеть обильное питаніе и пріятной вкусь имветь, однакожь имъешь оная шакое же алкалическое свойство, и столькожь способна къ произведенію бользней, какв и мясо плотоядных в звърей, кв коимв свинью съ большею справедливостію причислишь можно, нежели к в пишающимся зернами.

Мясо, такъ какъ оное изъ сыраго состоянія чрезъ разныя приготовленія изъ кухни выходить, лиe

мінется пропорціонально своей растворительности и питательности. Сырое мясо удобиве сваривается въ желудкъ и изобильнъйтее доставляеть питаніе, но напротивь того требуеть оное сильнъйтаго движенія для изгнанія испариною излитней алкалической остроты, от в которой могло бы тъло претерпътъвредь: вареное или жареное мясожотя и менъе питательно и неудобоваримъе, но содержить менъе алкалической остроты, не такъ скоро переходить въ гнилость, и от втогоменъе горячитъ.

Мясо, нъсколько времени лежалое, удобнъе варится, нежели взятое от в недавно убитаго скота. Но оно не должно лежать слишкомъ долго: ибо какъ скоро скотина скончаетъ жизнъ, то и гнилостъ воспріемлеть свое начало; а хотя свъжее мясо и долъе остается въ желудкъ, чъмъ старое, однако сокъ от в онаго бываетъ чище. Да и Натура опредълила для частей, преходящихъ въ тнилость, толстыя кишки, а не желудоко и не млечные сосуды. И тако кто желаето быть здоровымо, тото должено избирать для пищи свъжее нетухлое мясо. Что сказано здъсь о говядинь, то надлежито разумъть и о рыбъ: ибо попорченная товядина и тухлая рыба суть равно вредительны. Однако смотря по климату, годовому времени и сложентю тъла можно дать имо вытерпъть нъкоторую степень гнилости, полько не должно никогда допускать до противнаго запаха.

Жареное мясо пишашельное, чом вареное: во ономо сила болье соединена, а во семо болье выварена; почему и надлежить во обоемо наблюдать средину и располагать смотря по шолосложению, климату и годовому времени.

Мясо молодаго скоша нѣжно и клейко; а у скошовь, въ среднихъ лъшахь находящихся, бываешь оное наисочнъйшее, мясо же сшарыхъ скошовь вязко и остро. Молодое мясо

требуеть ради нъжности своей большей шеплошы для сваренія; а чего не достаеть старому мясу въ клейкости, то награждается во время варенія остротою онаго. Сін суть причины, кои прошивополагаеть опышь обыкновенному мивийю, что молодое мясо удобнъе въ желудкъ варинся, чъмъ старое; отсюду далъе явсивуеть, для чего иъкоторые люди не могуть сносить телятины и ягняшины, или мяса молодых в барашковь, когда напрошивь того вареная баранина и ръпа для каждаго здороваго желудка пригодны, а въ нъкоторых в бользнях в и наилучтія сушь лъкарства. Но вообще научаеть опышь, что мясо такого скота, который св годами человька вь пропорціи содержится, для сваренія онаго есть наиприличнъйшее.

Объявивъ кратко мнънйе свое о обыкновенной пищъ нашей, скажу теперь нъчто и о питьъ. Чистая вода есть не только наипростъйшее, но и наилучшее питье, и способ.

ствуеть лучше другаго растворенію пищи: ибо она не только удобно входить вь оную, сь оною смъшивается и не оказываеть противогнильнаго свойства, но поелику не причиняеть раздраженія, то и требуется оной мало для пищеваренія, а слишкомы большое количество оной могло бы ослабить питательныя орудія.

Во всъхъ посредствомъ брожентя двлаемых в напишках в кисловащое и сахарное свойство разжижено, а мясо претворено въ спиртовое существо; отв точнаго соединенія оныхв двлаются они вкусными и питательными, и получають летучее, желудокъ и кишки раздражающее и гръющее свойство , которое и сообщають всему тьлу. Сти суть главныя свойства, находящіяся въ большей или меньшей степени въ винъ, пивв, медв и п. д. Онв опличенися одно отв другаго образомв ихв пріуготовленія. Которыя вины наилучшія суть, о томь заксь разсуждать не буду; равнымь образомь не стану опредълять и выпиваемое количество оных b: всъ суть полезны, когда умъренно употребляются; излишнее же употребленте во всъх b одинаково вредно.

Прошиву употреблентя рюмки добраго вина никакой разумной человъкъ не сдълаетъ возражентя, ибо духъ и тъло онымъ оживляется и укръпляется; и такъ я совътую съ сочинителемъ спектатора: "первую рюмку выпить для здравтя, другую для пртятеля, а третью для веселости, четвертую же предоставить непртятелямъ. "

Что касается до спиртовых в напитков в, то суть они сами по себ крайне вредны, и чъм вони кръпче, тъм вредительные бывають: ибо можно почесть их в за самое кръпкое существенное масло того растънїя, из в котораго оные добываются, от в чего и бывают в противогнильны, нерастворительны и горячительны. Но естьли прежде надлежащим в образом в разведены и

лишены будуть масленых раздражительных в частей, то могуть уравняться съ соками тъла и учиниться питательными.


Теперь не осталось болье ничего подлежащаго разсматриванію какв только то, холодную ли лучше или горячую пищу употреблять надлежить? Для скота горячая пища ошь природы противна; горячій кусокъ столько же для кошки противень, какь и намазанной горчицею, а свиньи могуть при первой пробъ обътствся горачимъ кормомъ до смерти. Но от в повтореннаго отвъдыванія могушь желудки ихв также къ оному привыкнушь, и онъ находять наконець столь же великое вь ономъ удовольствіе, какъ и люди. Ибо привычка производить чудеса: красильщикь безь наказанія опускаеть руку вь кипящую краску; стеклянщики, кучнецы и плавильщики кажутся быть огнепостоянными; и я видъль одного человъка, пившаго кипящую воду безъ малъйшей въ лицъ перемъны. Правда, что мы теплою пищею и питьемь снособствуемъ варенію, пріуготовленію пишашельнаго сока, обращенію соковь и столь нужному для тьла испаренію; почему и можеть она почесться побужденіем в дъйствій живошныхв, и имъть многія и великія вытоды. Но сіе еще далеко не доказываеть, чтобь была оная всегда полезна: ибо естьли бы, положась на сїе, потребовали имъть все теплое, то значило бы сїе доставлянь огню новое питаніе, и поступашь прошивь разсудка и нашуры. Сверьх в того разплабляеть теплая пища все твло, и способствуя разтолствнію и испаренію, препятствуеть укръплению тъла.

Прежде окончанія сего замѣчу еще, что поелику умѣренность есть главнъйшій законъ Натуры и основаніе человъческаго блаженства, то и нужна оная въ діэть для сохраненія здравія, а тьмъ наипаче нужна во дни бользни.

1

Здравіе пиши не столько зависить оть качества, сколько оть количества оной и отр состоянія желудка, который оную варить долженствуеть: ибо опыть доказываеть, что какая бы пища употреблена ни была, изв прозябаемаго, или изв царства животныхв, сырая, жареная или вареная и т. д., естьли только употреблена будеть съ аппетитомъ и по состоянію желудка, то пріуготовляется изд оной равно хорошій пишашельный сокв. Но нѣшь ничего вредительные для экономіи живошныхв, какв излишество вв пишь и пишьъ. Обжорливость есть мать безпорядка и бользней: обжор. ливость въ здоровомъ состояни ничто иное есть, какъ обременение желудка; но естьли вы бользненномы состояній навшься противь желанія и аппешишу, то не должно ли сїе увеличины бользны.

И такъ будьте умъренны въ здоровомъ и больномъ состояніи! Кущайте и пейте по желанію вашему и аппешиту, но только не обременяйте себя! Слъдуйте во всемъ предписантю Природы и совъсти вашей, и пребудете здравы и благополучны!



#### ГЛАВА ІІІ.

О внутренних в показаниях.

При изслъдованїи Венерических вользней нашли мы, что любострастный ядь способень произвесть вст возможныя бользни, из чего слъдуеть, что желающій изкоренить оныя, должень употребить вст показанія. Но разсматривая оныя вообще, находимь мы столь много заблужденій, происходящих воть незнанія истинной причины бользней, что за таковую слабость нашу, что не познали источника бользней и дъйствій цълительных всредствь, жрасньть долженствуемь.

Хотя и не имъю я намъренїя описывать здёсь всё погрешности Врачебной науки, которыя как в опытомь, такь и заравымь разсудкомь охуждаются; но поелику предметь разсужденій моих в толико обширень, потщусь истребить повстръчавшіяся со мною, не хуля виновника оныхв, но и не опасаясь негодованія водимых в предразсудкомв: Какъ бы ни непріятно было сіе отъ нъкоторых в принято, однако надъюсь получинь за то одобрение от мужей резсудишельных ; величайшее мое награждение состоить въ увъренїи оказать себя при семь случав полезнымъ членомъ гражданскаго общества.

Во время младенчества Врачебныя науки существовали наивеличайшія заблужденія; во аудиторіяхо употребляемы были смъха достойньйшія мньнія, изовснять происхожденіе бользней таинства преисполненнымо образомо: ибо естественныя причины казались слишкомо обыкновенными и подлы,

ми. При семъ случав возлагали причину не только на звъзды и планешы, но и колдуны и самой дьяволь принуждены были терпъть обвиненте въ причиненти оныхъ. Показантя ихъ для отвращенія оных в и сила приписываемая целишельнымъ средствамь столькожь смъшны были. Нъкоторыя кровавыя жилы во некоторых в особенных в бользиях в разсвкались. Нъкоторымъ средствамъ приписаны были особенныя дъйствія на голову, другимъ на сердце, печень и ш. д.; ошр чего и произошли многія незначущія наименованія, какЪто: головныя серhalica, петенотныя hepatica , противуволшебныя antimagica, и m. д., которыя служили шолько къ зашмънію исшинны и разума. Сколько оных уже отмънено, и сколько еще отмънены быть должны, наилучие могуть судить знающіе врачебное веществословіе.

Показанія, о коих в я здесь говорю, суть противу— Венерическія, почему и должны устремлены быть Часть III. Жж

противу всъх Венерических бользней и припадковь. Но поелику Венерическій ядь причиняеть припадки, которые и другою остротою, хотя инным образом в, произведены быть могуть, то смытно бы было утверждать, что противу - Венерическія средства и должны только употребляемы быть вь одной любострастной бользни, или что въ Венериной бользни не льзя пользоваться средствами, вь других вользнях в употребляемыми.

Я не буду болће говорить о нелъпостяхь, затмъвавшихь прежде Врачебную науку, но послъдую моему плану въ показанйи надежнаго и основательнаго лъченйя не только Венерическихь, но и другихъ съ оными сходныхъ болъзней, хотя оныя и отъ другаго проистекають источника.

Прежде объявленія онаго приступлю я кь разсмотрънію главнъйшихь внутреннихь вс помога тельных в средствь, и описывая дъйствія оных в въ тълъ животныхъ, покажу купно и дъйствительнъйте способы и сильнъйтия пълительныя средства.

I

)

)

Ė

)

Что бользни и противоположенныя онымъ средсива дъйсивующь какв на плошныя, такв и на жидктя части, объявили мы уже выше сего, а въ послъдстви найдемь еще то и другое къ подшверждению. Врачебныя средсшва или причиняющь раздражение, или оное утоляють, то есть онь или умножають раздражительность нервной системы, или уменьшающь оную. Онв или производять остроту, или оную разрушають. Очь разжижають или сгущають соки, и наконець укръ. пляють тьло, или разслабляють once.

Сїй суть главнейшія действія оныхь. Почему и нахолимь мы, что ть средства, которыя вы произведеній вышеномянущыхь действій наисильнейшія суть, для шела или полезны или вредны бывають, соответствуя надлежащему или не

Жж 2

надлежащему употребленію оныхъ. Приступимъ прежде ко рвотнымъ.

### О рвотпиых б.

Рвота есть судорожное испражнение вы желудкъ находящихся вещей чрезы отверзтие рта, происходящее оты раздражения чувствительныхы жилы или посредствомы вредныхы выжелудкъ находящихся частей, или и оты того, когда бользненное ощущение другихы частей сообщено будеты нервамы онаго, и продолжающееся до окончания раздражения.

Во всемъ тълъ человъческомъ не находится, можеть быть, столь чувствительной части, которая бы съ прочими частями онаго въ столь тъсномъ находилась союзъ, какъ желудокъ. Страданте отдаленнъйшей части тъла можеть имъть вліянте на желудокъ; а какъ скоро страждеть желудокъ, то нътъ части, которая бы не ощущала слъдствтй, отъ того происходящихъ.

Средства, производящія рвоту, суть различны; но надеживищее и простъйшее изв оныхв есть илекакуанна: ибо поелику оная кЪ царству прозябаемому принадлежишь, то не простираеть дъйствія своего далье первыхь путей и дъйствуеть на желудочныя нервы не долбе, какЪ продолжается рвота. Принимается оная от десяти до дватцати грановь, соотвышствуя льшамь и шьлосложенію; порошокь оной сделанный сь небольшимь количествомь чистой воды и сиропа пишьемь почитаю я за наилучшее рвошное. Рвошный винный камень (\*) и сурьмяное ви-Жж 3

<sup>(\*)</sup> Понеже прієма рвошнаго виннаго камня для произведенія рвошы, для всяк го опредълишь не можно, и оный въ состояніи произвесть рвоту чрезмѣрно спльную, то можно для предупрежденія сего развести нъсколько грановъ онаго въ нісколькихъ унціяхъ теплой воды, и давать чрезъ четверть или чрезъ полчаса по полной столовой ложкѣ до воспослѣдованія довольнаго дѣйствія. П. Н. П. На пр. можно взять б

но (\*\*) даю я для произведентя рвоты нъжнымъ и чувствительнымъ людямъ не охотно, потому что оныя легко засъдають въ нервной оболочкъ желудка, и слишкомъ сильное дъйствте произвести могутъ. Но сильнымъ и людямъ флегматическато сложентя можно употреблять оныя вмъсто рвотныхъ; на вящтую же оказывають онъ пользу, когда въ лихорадкахъ за мъсто потовыхъ въ маломъ пртемъ употребляемы бывають.

Минеральный турбито также сюда принадлежить. Не можно, правда, отрицать того, что оный я когда дается съ величайтею осторожностью и надлежащимъ образомъ пртуготовляется, можетъ оказать

гран. рвошнаго виннаго ками, развести въ 6 унц. воды и давать презъ п линса по ложкъ, или развести пом ну пос количество виннаго камия въ 1 фунтъ воды и давать чрезъ четвертъ часа до воспослъдовавтаго дъйствія.

П. Р. П. (\*\*) ПрїємЪ сурьманаго вина есть і ун-

хорошее дъйствіе въ Венерическихъ бользняхъ, потому что часть ртути, въ ономъ находящейся, входитъ въ кровь; но поелику причиняеть оный весьма скоро слинотеченіе и производить слабость въ желудкъ, то отвергаю совершенно употребленіе онаго, и никогда не даю оный за мъсто рвотнаго, потому что имъетъ для сего безвреднъйшія средства.

ľ

Рвошное наиудобнъе дается вкечеру, а теплое пипъе, послъ каждаго дъйствія принимаемое, наидучше способствуеть рвоть: примъшиваніе жатаго или коровьяго масла, какЪ- то нъкоторые обыкновенно дълають, вспомоществуеть, правда, дъйствію средства, но есть само по себъ для желудка вредно. Наилучшее вь семь случав употребляем е питье есть простая теплая вода. Количество оной должно увеличивать и уменьшать, смотря по силь и уменьшенію рвошы; чешыре, пяшь и шесшь дъйствій суть для испражненія довольно; во время онаго надлежить крайне убъгать простуды, почему и весьма пристойно ожидать дъйспейя въ постелъ, естьли только позволять обстоятельства.

Послъ рвошы нуженъ покой; а по разсужденію можно дать и кръпительное, только не утолительное, выключая крайней нужды. Рюмка стараго вина или пунша съ ромомъ съ нъкоторымъ количествомъ воды Аглинской мяты можеть дана быть сь наилучшимъ успъхомъ. Пишье изъ крупъ, саго и т. п. употреблять не должно, ибо оныя служать только къ тому, чтобъ испортить опять желудокь. Позывь на пищу можеть лучше всего удовлетворенъ быть коркою или кускомъ жаренаго хльба, который служить кв возобновленію силы желудка и кЪ приготовленію онаго къ будущей его работь. Надлежить также наблюдать, чтобъ перьвая послъ рвотнаго вкушаемая пища была удобоварима и употребляема въ маломъ количествъ.

H

0-

a

5-

2,

a b

I

Рвотное есть одно изв наиполезнайших прлительных средство, только должно оное предписываемо быть со всякою осторожностью. Вв Венерических бользнях имъеть оно также свою пользу, хотя и радко потребно бываеть. Обстоятельства же онаго требующія будуть показаны вь сладующихь Главахь.

# О проносных в.

Поносъ есть скоро одно за другимъ слъдующее испражнение низомъ, происходящее от усиленнаго червообразнаго движения кишекъ. Причина тому бываетъ различна: ибо оный произойти можетъ от худаго нищеварения, или от притечения кишкамъ болъзненныхъ соковъ и т. д.; но здъсь говорится о искусственномъ поносъ, причиняемомъ лъкарствами.

Понось, произведенный искусствомь, раздъляется обыкновенно на легкой и сильной. Прежде сего думали, что посредствомь судноваго Часть III. 3 з испражненія можно испребить изъ шта все вредное, и нткоторые были въ семъ столько щастивы, что имти случай видтть, какъ жизнь больнаго купно съ послъднимъ испражненіемъ оканчивалась, да и теперь еще употребляются, по моему мнтанію, проносныя весьма часто ко вреду больнаго

Что судновое очищение причиняеть отвлечение соковь, никакому не подвержено сомнънію; но поелику находимъ мы, что отвлечение на всъ просширается соки, то и не можемъ по справедливости утвердишь, чтобь посредствомъ онаго особенные соки отвлекались. Правило, очищать тьло посредствомв проносных , основывается на слабыхъ причинахъ, и оно служило ко вреду многихъ больныхъ, да и шеперь бываеть часто камнемъ претыканія: ибо изъ точнаго соединенія плошных в жидких в частей явствуеть неосновательность онаго, такъ какъ и изъ того, что объ части могуть объяты быть бользненнымь веществомь, а развы причинить оное сильное раздражение вы кишкахь и выгонить вредное нечаяннымь образомь.

Естьлибъ проносныя освобождали ипъло от в заких в соковв, то не могли бы ни въ какое время удобнъе употреблены быть, какь въ подагръ и ревмашизмъ; но худыя слъдствія довольно доказывають, сколь вредны бывающь онь вы сихь бользняхь. Какая бы была тому причина? Естьли острота находится въ жидкихв частяхв, то для чего же бывають проносныя вь оных случаяхь не такъ пригодны, какъ въ чесоткъ и другихъ хроническихъ болъзняхъ, въ коихъ оныя съ пользою употребляются? Когда бы острота всегда находилась вы сокахы, какы нъкоторые неосновательно утверждають, то не было бы противу всякой бользни лучшаго средства какъ кровопусканте и проносныя. Но разсудокъ и опышь доказывають противное:

ибо пронесныя не только разслабляють кишки посредствомь раздраженія, оными причиняемаго, но ошь оных в оскудъваент в кровь, и плошныя части дълаются неспособными къ извержению изъ шъла вредной остроны. Къ сему присовокупляется еще, что вмъсто того, чтобъ произвесть отвлечение ъдких в соковв, то весьма часто происходить, что споспъществують оныя всасыванію остроны въ составъ крози: ибо сколь часто видимъ мы, что отъ причиняемых желчью поносовъ происходять влосвойственныя лихорадки единственно от употребленія проносных в; а иногда случается, что и отв простой гонорреи происходить от сильных проносных Венерическая бользиь.

Не должно однакож в думань, что я возсе отвергаю проносныя: ибо в в людях в кръпкаго и флегмапическаго сложен я, и в в хронических в бользнях в, также у женщин в и дътей могут в онъ великую при-

несть пользу, понеже могуть купно почесться противоглистными. Но вы горячихь, холерическихы и бакими соками изобилующихы сложентяхы ни что не можеть быть вредные проносныхь, развы сы прибавлентемы ртупи: ибо оная можеть отвратить вреды, проносными причиняемый, и чрезы частое употребленте саблать нысколько добра, що есть, вы продолженти болье принесть пользы, нежели проносное вреда: сте-то сохраняеть хоротую славу исправляющихы соки и проносныхы пилюль, наливокь, электуарти и т. д.

Мало имбется таковых случаев вы коих присовытоваль бы я чистительныя; а сїй долженствовали бы всегда быть легкія. Сильныя проносныя дълають великое раздраженіе и причиняють обыкновенно воспаленіе, и могуть навлечь вредь и самымь флегматикамь.

Проносныя принимаются обыкновенно по утру; но къ сему привязываться не нужно, только бы желудокъ не быль наполненъ пищею: ибо въ прошивномъ случат могло бы проносное произвесть реошу, или и совстмъ не подъйствовать, потому что всосалось бы пищею.

Послъ проноснаго не только пріятно, но и прилично имъть успокоенїв; чего ради и совътоваль бы я не только проносныя, но и рвотныя принимашь послъ объда, какЪ скоро желудокь опростается, потому что Натура во время ночнаго успокоенія исправляется. Во время дъйствія надлежить мало имъть движенїя; для питья наиболье приличествуеть теплая вода, послъ каждаго испражненія умъренно выпиваемая. По окончаніи дъйствія проноснаго можно скушать корку или кусокъ жаренаго хатба съ рюмкою стараго вина или пунша, особливо когда почувствуется слабость въ силахв и кишкахв. Послъ очищентя кишекъ надлежитъ на нъкоторое время наблюдать точную діэту.

Что надлежить до разныхь степеней Венерическихь бользней, то
мало находится случаевь, которые
требують чистительныхь; а сти вы
своемь мысть показаны будуть. Однакожь вообще всегда лучше жить,
наблюдая умыренную діэту: ибо
между дыствіемь причиняемымь
проносными, какь бы легки оныя ни
были и вы какомы бы количествы
ни давались, и между поносомы
пыть другаго различія, кромы того,
что сей есть нечаянное, а то нарочно причиненное нарушеніе дысствія китекь.

Давать слабительныя въ клистирахъ есть наилучшій способь, и желательно бы было, чтобъ оный чаще употребляемь былъ въ случав нужнаго очищенія кишекъ. Но столько же мало желаю я вредить симъ образомъ, почему предпочитаю и въ семъ случав легкія слабительныя сильнымъ проноснымъ.

Когда разсмотримъ нѣжную внутреннюю кишечную оболочку и вса-

сывающіе млечные сосуды, кои съ кровью въ непосредственномъ состоять соединении, то скоро увъримся въ надобности предписывать невиннъйшія промывательныя, и опыть доказываеть намь, что мы посредствомъ оныхъ напудобнъе достигаемъ нашей цъли. Топленое молоко и воду должно всегда брать для уваренія прочих вещей; от прибавленія мыла побудить оный посредствомъ усиленнаго червообразнаго движенія кишекь кь испражненію; оть прибавленія селитры сділается оный мочегонительнымь, потогонительнымв, судорогоу толительнымв и жарь утушающимь средствомь; оть прибавленія сахару будеть оный питателень: а когда примъшано будеть къ промывательному нъсколько капель Свитенова растворенія сулемы, то можно изкоренить онымЪ упорныйшія ві кишкахі язвы, оті Венерической или и отв другой остроты происходящія. Количество молока и воды должно опредвляемо бышь

смотря по возрасту больнаго; промывательное должно быть наставляемо теплымь, но не горячимь, и смотря по обстоящельствамь повторяемо.

H

Приступимъ теперь къ другимъ вспомогательнымъ средствамъ, кои опредълила намъ Натура какъ сильныхъ отвлекателей остроты, и помощтю которыхъ, употребляя оны в осторожно, межемъ мы учинить много добра.

О могегонительных в, потогонительных в п судороги утоляющих в средствах в.

Сїи средства совокупиль я емьств для того, потому чио двіствія оныхь между собою вь точномь состоять соединеніи, когда употреблены будуть надлежащимь образомь, хотя и довольно въдаю, что имъются вь семь изключенія, и что каждое изь оныхь можеть сопряжено быть сь опасностію. Мочегонительныя могушь раздраженість своимь причинить воспаленіе; потогонительныя могуть сдълать соки алкалическими, а утоляющія судороги могуть, естьли слиткомь много упопереблены будуть, причинить параличь. Когда потребно будеть одно изъ помянутых средствь, то не худо бы было употреблять купно и прочія, осо ливо въ Венерической бользни.

Утолять жарв есть одно изв наиполезнайших показаній, а изв встхв соляных пріўгошовленій можно наиболье надыяться на леретищенную селитру. Изв числа противосудорожных в средство есть хорошо сдыланная киновары наисильныйшая. В Сталевом порошкт, которому столь многія хорошія действія справедливо приписываются, суть помянутыя два вещи наидыйствительныйшія.

Но поелику во всъхъ лихорадкахъ, въ коихъ дълаются въ волокнахъ судороги, существовать долЪ

.

)

жна также и острота въ тълъ, которая двлаеть мочу острою и препятствуеть испаренію, то весьма нужно, чтобь и стю остроту исправить; а сте содълывается помощію ригуши. Киноварь хошя нъсколько и способствуеть къ сему; но понеже ртупь, ввоной находящаяся, оть соединенія сь строю лишена большою частью своей дъйствительности, то дъйствуеть она только какъ утолипельное; почему я не только въ Венерическихъ бользняхъ, но и во встхв родах дихорадокв прибавляль къ прочимъ вещамъ нъсколько каломеля съ хорошимъ успъхомъ. Правда, сїе прошивно обще принятымъ правиламъ Врачебной науки; напрошивъ того долженъ замъшишь, что я о ртупи совстыв другихв мыслей, противъ тъхъ, кои не инаково даюшь оную, какь въ большемъ количествв, почему и не видали ошь оной другихь кромъ худыхъ Авиствій. Но разсмотря тщательно найдем), что причина тому не въ ртути состоить, но въ образъ употреблентя. K

T

-

1

1

Порошокъ, состоящій изъ упомянутыхъ вещей въ показанной ниже пропорціи, можетъ по справедливости почесться превосходнъйшимъ и дъйствительнъйшимъ въ своемъ родъ: ибо посредствомъ селитры онь мочетонителень и потгонителень, посредствомъ киновари прэтивосудорожень, а помощію каломеля исправляеть онь остроту, оставшуюся въ тъль посль отделенія мочи и поту-

Натуральный пее мочегонительное и потогонительное есть вода, хотя и студеною вы довольномы количествы выпиваемая. Винная сыворотка или пунты производять подобное дыйстве, будучи унотреблены вы довольномы количествы, и дылають стабые.

Но наконець скажу, что способь выгонять остр ту низомы или потомы, или мочето, есть опасены и не надежены: ибо чымы болые умно0-

0=

ī-

1-

Ъ

b

9

);

жаемъ мы сїи испражненїя, тъмъ способнье можемъ угеличить остроту, нами выгоняемую. Правда, что Натура дълаеть сїе и дълаеть часто; но искусство не въ состоянїи ничего учинить болье, какъ только показать Натурь путь: ибо острота можеть находиться и въ самыхъ фибрахъ. Но чрезь поправленїе остроты достигаемъ мы далье: ибо когда мы знаемъ сїе учинить, то м бываемъ въ состоянїи отвращать наибольшую часть бользней.

Я почель за нужное изэтстить о семь моихь читащелей, дабы посль при льчении разныхь степеней любострастной больчи тьмь короче могь из ясниться.

О болеутолительных в средствах в.

Единственное желаніе страждущаго болью человіка есть облегченіе; иногда весьма нужно бываеть дать Натурь время, дабы могла она тьмъ скорье освободиться от вреднаго раздраженія. Маковый соко или соннос зелье есть для сего наипригодивишее, но купно и опаснвишее средство, когда неосторожно дано будеть.

Вопервых в не надлежало бы никогда давать опія, как в только вв самой крайней нуждв.

Вовшорых вы не надлежало бы давашь онаго вы воспалишельных вы лихорадках ви шогда, когда большія уязвленія существують: ибо чрезы разслабляющее дыйствіе, оказываемое онымы на чувственныя жилы, препятствуєть оный усиліямы Нашуры, старающейся о изберженій бользненной матерій или мочею или пошомы, и служить кы умноженію вы крови находящейся остроты, которая, какы скоро нервная система получить прежнюю крыпость, сы большею силою свирытствуєть нежели прежде.

Однакож в можно давать сонное зелье в сильных в судорожных в движен в движен в движен в судорожных в движен в судорожных в движен в судорожных в су

be

HO

1a

И-

В

ы

R

e

ть, коликь, дизентерти или вы кровавомы понось, вы запорь мочи, истерическихы припадкахы, вы бышенствь матки и т.п.; но при всемы томы требуется великое предвидынё и осторожность. Что касается до прёма и состава, вы которомы оное удобные дается, описано будеты ниже; почему и замычу теперы только то, что снотворное и вредное свойство маковаго сока, не уменьшая болеутолительнаго дыствія онаго, большою частью отыто быть можеты. На семы основывается составы, который ниже сего обываень будеть.

# О служащих в средствах в противу остроты.

До селъ царствовала въ семъ по моему мнънію великая темнота: ибо ложное мнъніе, выгонять вредную остроту посредствомъ испражненій, причинило много вреда и подало поводъ къ незнанію противу остроты служащихъ средствъ.

Подъ средствамижь остроту притупляющими разумью я такія, которыя служать кь поправленію всякой остроны, въ тель находя. щейся, то есть какь Венерической, так в и не Венерической; в в ртути имвемь мы таковое средство. Но не могу я дозольно надивишься, чито пребывающь до сель вы заблужденіи вь разсужденіи дъйствія оной. Ея свойство, производить слинотеченте, оказывается какъ въ здоровыхв, шакв и больныхв; шакожде способна она какъ у шъхъ, шакъ и у другихъ причинить злосвойственныя въ рошу язвы. Но какъ могло шакъ долго господствовать такое мивніе, чтобь отвращать одно вло произведениемъ другаго, а особливо въ наши просвъщенныя времена, то подлинно кажешся при эръломъ разсужденій удивишельнымь. Я и не знаю ни одного такого поступка вЪ древнихь, конорый бы июлико прошавень быль здравому разсудку, какь сей принятый новъйшими, что

пребудеть навсегда пятномъ для Врачебной науки.

Естьли ртуть дана будеть надлежащимъ образомъ, то есть она величайшее и общественнъйшее средство: ибо нътъ такой бользни, которая происходить отв остроты, естьли только она къ уврачеванію способна, чтобъ не можно было посредствомь оной выльчить. Почему и весьма ошибаются ть, кои ограничивають унотребление оной единственно на Венерических в бользиях в: ибо всв бользни, происходящія отв остроны, сходешвують въ припадкахв; а опыть доказываеть, что одинакія средсіпва ві оныхі употреб. ляемы бышь должны.

Нъть остроны въ человъческомъ тълъ, которая бы не была всосана и поправлена ртутью. Но какъ скоро сте всякую остроту побъждающее средство потеряеть равновъсте, то дълается вреднымъ; почему и можно въ нъкоторыхъ случаяхъ тъмъ болъе ожидать хороша.

Часть III. И и

го усптха, чтм вы меньшемы количествы употреблена будеть: ибо чрезы сте получаеть она время проницать вы малыште сосуды, перебрать всякой уголокы вы тыль и оказать желаемое дыстыте.

### о вифшнихъ показаніяхъ.

## О кровопусканіи.

Нѣтъ ничего обыкновеннѣе въ лихорадкахъ какъ предложенѣе крово-пусканѣя, хотя и нѣтъ ничего не приличнѣе онаго. Посредствомъ крово-пусканѣя уменьшаемъ мы, правда, количество крови; но мы не въ сестоянѣи поправить чрезъ то худое состоянѣи поправить чрезъ то худое состоянѣе оной, ни выпустить находящуюся въ оной остроту. Сколь ни кажется послѣднее несоотвътствующимъ здравому разсудку, однакожъ оное утверждали и испытывали ко вреду многихъ тысячь. Но во времена наши потеряло сёе средство мно-

го хвалы, да и давно пора: ибо по моему мнинію не столько погибло въ Европъ отъ войны, сколько отъ ланцета.

0

t

Я не буду долго останавливаться при описаніи пользы и вреда, причиняемых оным в в лихорадках и других в бользнях в, но замьчу только то, что оное препятствует в благим в дьйствіям в Натуры и оную разслабляєть. Сіе есть еще только одно из в многих в дурных в слъдствій, кровопусканіем в причиняемых в; но поелику предлежить нам в разсуждать здъсь о Венерических в бользнях в, в в коих в оное не должно употребляемо быть, то прочее оставим в.

Все, что можемъ мы ожидать отв кровопускантя, есть уменьшенте крови и ослабленте упругости плотныхъ частей; отв опустънтя кровавыхъ сосудовь должно претерпъвавать и целое, и кровавыя жилы должны непременно всосать несколько сукровицы и другихъ влагъ. При семъ можетъ и то

случится, что естьли находится въ твав какая либо острота, хотя и на вившней поверхности онаго, то заражается оною и кровяная мясса, как уже везьма слишком в подтверждаеть сте опыть. Да, я утверждаю, что способь, предлагаемый нъкоторыми Авторами при пользованіи первой степени начинающейся элосвойственной гонорреи, а именно: выпускать повторительно очень много изъ руки крови, давашь легкія прохладишельныя и слабишельныя средства, и оставлять употребление ршуши до послабленія лихорадки есть надежнъйшій пушь вогнашь Венерической ядь вь составь крови; отв чего и находимъ мы обыкновенно, что таковые больные бывають подвержены печальнымь припадкамь Венерической бользни, прежде нежели примушся за истинный способь авченія. Утверждають, что ртуть слишком в растворяеть кровь, и способна произвесть чрезв то воспаленіе; но сіе тогда только произходить,

когда даепіся оная ві слишком і боль-

Разсудоко и опыто показываюто, что ничто не бываето тако сильно перемънить тълосложение и навсетда оное разрушить, како сильныя кровотечения; со симо сходствуето чрезмърное кровопускание: извъстно также, что многие, хотя и ускользнули ото смерти, но учинились чрезо то на всю жизнь неспособными, хотя во семо и не признаются.

## О нарывны х б.

Кажется, что страждущія любостраспіною бользнію вовсе оть оныхь свободны, котя и столько же вы пользу оныхь сказать можно, какь и нъкоторыхь другихь, у коихь оныя употребляются.

Поелику не принадлежать оныя не посредственно кь моему предметну, то извяснюсь я о семь весьма кратко, и припомню только то, что ть, кои думають, что посред-

И и 3

ствомв оныхв можно отвлечь худые соки, весьма отибаются. Все, что можно отв нихв ожидать, есть то, что онв пришягають соки ко внешнимв частямв, и раждають вв твлё остроту, которая возбуждаеть различныя двйствія онаго кв большей двятельности.

Бывающь случаи, вы конхы нарывныя средства приносять пользу, и могуть споснышествовать благополучному перелому, но обыкновению употребляются оныя изы десяти разы девять разы не у мыста, и оное средство причиняеть часто болые вреда, нежели самая болызнь.

## О купаніи.

Купанїе почиталось из древле для вдравія полезнымь, а я съ моей стороны почитаю оное за одно из в наиполезный ших в правительных в средствь. Сїє дылаю я не только для того, что сохраняеть оно тыло вы чистоть, но и по тому, что слу-

жить къ поправлению остроты, имфеть противосудорожныя дъйсшвія, умножаеть количество соковь и слъдственно спосившествуеть также различнымъ отдъленіямь; а чрезь сіе удовлетворяеть почти всьмь Врачебным'в показаніямь. Выгода, кою имъемь мы оть купанія, есть стольобщественна, что нъть почти болъзни, въ которой бы не приносила она пользы. Сте было древнимъ не безвизвъсшно, кои упопребляли оное сь излишествомь, да и новышие равно шому послъдующь. Люди содълывають обыкновенно злоупотребленіем в своим все то вреднымв, что опредълено для ихв пользы. Не безь удивленія чишаемь мы описаніе о великолъпіи и множествъ публичных пришельных источников древняго Рима; нашь Башь есть вь разсужденій сего малой Римв.

Что касается до дъйствія умыванія и купанія, що соотвътствуеть оное степени теплоты и холода и частямь въ водъ содержащимся.

Теплыя воды имъють въ себъ подобно припаркамъ и теплой діэть начто мягчительное; она придають сперва, кажется, еще болве крвпости плотнымь частямь и побуждають оныя кь большему дъйствію; но какь скоро теплота оныхв разжидитв жидкія части, отв чего маленькіе сосуды еще болье расшянушся, а сверьхь того и жидкія части вь оных умножатся, то должны они причинишь наконец в разслабление въ плотныхъ частяхъ: продолжишельное же употребление теплыхъ водь не только дъйствуеть такъ. но оно и пріобучаеть тело къ большей шеплошь и кр расшяженію плошных в частей онаго, а чрезв сїе двлаются способными учинить шть по кръпкими напряженными волокнами снабдънное левкофлегмаши. ческимъ. Сїи сушь вредныя дъйствія теплых водь; почему и должны онв усотребляемы быть умвренно, и въ крайней нуждъ спуденыя бани оказывають протавное

дъйствие: ибо холодъ, уменьшая природную теплоту крови, от в которой сохраняется она жидкою, стущаеть жидкия части, уменьшаеть количество оныхъ и укръпляеть плотныя части.

Но прохладишельная баня, сходствуя св природною шеплошою твла нашего, не можеть оказывать шаковых в двйствій шеплоты и холода, то есть разжижать и стущать кровь.

Влажныя свойства бани достойны наиначе нашего вниманія, особливо вь такихь случаяхь, гдъ существуеть острота. А сверьхь того служить оная также и къ освобождению кожи от вредных веществь, кои не только зачыкають кожныя стверзлія, но и весьма удобно могуть войти вь крозь.

Теперь приступаемь мы кв дъйствіямь особенных в бань и кв разлячію оных в отв обыкновенных в. Тетлыя бани или купальчи п оизводять притеченіе соковь кв той ча-

4 acm & 111.

сти, которая парится, холодныя напротивь того соки прогоняють. Становление ногь вы теплую воду было уже издавна какъ способствующее мъсячному очищению средство вы употреблении, и что умывание ногы и рукъ студеною водою умножаеть отдъление мочи, то имъль я много случаевь испытать.

Однакож в купанія всего тала превосходят в частныя: ибо какая бы часть тала ни страдала, однако и прочія принимают в в ном в участіє; почему он такую же им вот в нужду в в помощи, как в и страждущія части.

Поелику ничто не служить болъе къ сохранентю здравтя какъ чистота и купанте, то и ничто толико не служить къ возвращентю онато въ случат потери.

Что надлежить до состава, то почитаю я морскую воду за наилучшую, и совътую употреблять для сего умъренно холодиую, особливо въ лихорадкахъ, и тогда, когда воспалентя

существують; чьмь долье больной вы шаковой купальны пробыть можеть, не чуветвуя озноба, тьмы большую и будеть имыть от оной пользу. За мысто морской воды можно вы шакихы мыстахы, гды достать оной не можно, развести вы свыжей воды не много соли и селитры, вскипятить оную и прежде употребленыя опять простудить.

Въ случаяхъ, естьли кожа шелудива, можно употребить прежде мыльную пъну для размягченія оной и для прочищенія поровь, дабы ванна тьмъ сильнъе могла дъйствовать; сіе надлежить повторять часто, по крайшей мъръ по одному разу въ день, до выздоровленія больнаго.

## О Хирургических в показаніях в.

Когда разсмотримъ тщательно экономію животныхъ, то найдемь, что Врачебная наука и Хирургія

такъ тъсно соединены между собою, что тот, кто не свъдущь въ одной, долженъ таковымъ быть и въ другой. Столько же нужно положить явственныя основанія от предразсудковъ свободной Естественной науки основаніемъ каждой части цълительной науки: ибо безъ таковой неограниченной вольности разсматривать истинное состояніе вещей бываемъ мы въ показаніяхъ нашихъ водимы слъпымъ предразсудкомъ, и успъхъ зависить от нечаянности.

Разсужденіе мое касается здъсь только до употребленія наружных в средство и до дъйствій оных в. Первое Хирургическое показаніе во всъх в внышних в воспаленіях в и опухолях в есть разрышеніе (refolutio). Разрышительныя или разбивательныя средства почитались вгоняющими внутрь, почему и не удивительно, что мягчительныя и гноящія средства предпочитались оным в вы таких в случаях в, гдъ существовала тракая матерія, как в в Венериче-

ю,

й,

V-

16

3-

V-

6-

й

4.

1-

).

И

Ь

ской заразъ. Но въ семъ случаъ, такъ какъ и во многихъ другихъ истолкованіяхь действій животныхь, ни опышь, ни здравой разсудокъ довольно не участвовали. Намъ извъсшно, что опухоли весьма различнымъ образомъ разбивающся; легкія же изь оныхв оказывающем наиполезнайшими. Я не буду описывать здъсь шъхъ средствь, кои противу воспаленій снаружи употребляемы были, и различныя слъдствія оныхв; но шолько върно, что хотя спиртовыя средства, камфора и т. д. и были иногда полезны, однако онв не только увеличивали часто воспаленіе, но и вгоняли оное въ другія части.

И так вединственная цаль всьх вразращительных в и разбивательных в средства должна устремлена быть единственно к в поправлению остроты; а ему содъйствует в употребление ртути.

Изъ сказаннаго легко можно предспавить себъ мои мысли въ разсужденіи нагноенія. Весьма я удивляюсь, что сте показанте не престаеть еще нъкоторых в искусных в Врачей водить по ложному пути: ибо естьли разсмотрим в мы Натуру онаго, то скоро найдем в, что посредством в онаго единственно умноженте вредоносной матерти производится, и то вло, кое мы истребить вознамъриваемся, увеличивается.

И такъ я столькожъ мало одобряль сваривающія средства, какъ и предпедшія: ибо какъ нагноеніе состоить наипаче въ способствованіи и умноженіи гнилости, то служить свареніе только къ раздраженію воспаленія и къ побужденію сильнаго и излишняго отдъленія.

Теперь приступаемы мы кы огищающимо средствамы. Онь бываюты вы гніючихы ранахы нужны, но не по тому, что онь очищають, какы обыкновенно думають, а по тому именно, что отражають онь гнилость, смывая тлетворную матерію: ибо доколь основаніе раны пребудеть испорченнымь, дотоль и вытекаеть 9.

изь оной вдкая машерія. Но естьли очищающія средства поправляють купно остроту, то можемъ отъ оных вожидать всякаго добра. Бакія средства бывали часто для ранв, для коих оныя употреблены были, вредны, а иногда были и полезны; но сте происходило совстмъ отъ другихъ причинъ, нежели обыкновенно думають: ибо дъйствія сереброселитреннаго камня, или Фагаденской воды, должно приписать въ ономъ растворению серебра, а въ сей растворенію сулемы, которыя служашь кв поправленію остроты соковъ; приписывавшіе же дъйствіе оных в вакому свойству и употребаявшіе вибсто оных обыкновенный вдкій камень нашли себя кв немалому вреду страждущей части обманушыми.

Наконецъ и показаніе заживленія было равнымь образомь слишкомь съ явными сопряжено заблужденіями, чтобъ быть приняту новъйшими Врачами, я разумью: возобновленіе

потеряннаго вещества посредствомъ мясо нарощающихв, соединяющихв и заживляющих в средство; сте есть единственно дъйствіе Натуры: ибо кв наполненію и заживленію раны, по исправлении остроты, ничего болъе не требуется, как охранять оную от внъшних в насилій, дабы Натура могла безпрепятственно наполнить оную новым веществом в и оную закрышь. Сему споспъществуется наилучше наложентем в корпін; но поелику в любострастных в язвах в острота обыкновенно до совершеннаго исцаленія продолжается, то можно напудобнъе покрывать оныя очищающимъ ртутнымъ средствомъ.

Но вообще, когда существуеть въ тълъ острота, снаружи или внутри оная находится, то главнъйшая цъль должна стремиться къ тому, чтобь оную поправить и истребить: ибо всъ старанія наши выгнать оную или посредствомъ при-

нужденных в испражнений, чрезв нагноеніе или чрезъ другіе еще сильнъйшіе способы, супь пішетны; а когда и бываетъ иногда удачно, то дълается сте нечаянно. Металлы имъюшь таковую силу вь большей или меньшей степени, но ни одинъ изъ оныхъ не имъетъ такой силы какъ ртуть. Однакожъ естьли разсмотримь, какь оная дъйствуеть, пю увъримся, что употребление сего противу всякой остроты служащаго средства наибольшей изв всъхв лъкарствъ требуетъ осторожности; ниже сего буду я имъщь случай сказашь о семь болье.

Изъ сказаннаго мною не должно однакожъ заключить, что я всъ цълительныя испражняющія средства отметаю, ибо такого мнънія не имъю; я хотъль единственно показать слишкомъ частое употребленіе оныхъ, отъ чего тъло болье претерпъваеть вреда, нежели получаеть пользы.

Я коснулся здъсь только общественнаго, частное же узримъ въ послъдстви.

Прежде окончанія сей Главы замвчу еще полько по, что намвканія, чинимыя здісь для разсудительных , суть безыскуственныя въщанія разума и опыта, и что я не другую какую имъю къ тому причину, какъ быть полезнымъ. Въдаю, что безыскуственный образъ преподаванія и избясненія мыслей моихъ будеть для меня безуспъшенъ въ тактя времена, въ кои красноръчивому образу писанія толико удивляющся, но единственное честолю. бїе мое состоить въ томь: преподавать ясно и распространить нъкоторый свыть о предметь моемь.

#### TAABA IV.

О льтении первой заразы.

Тоелику дъйствія наши всегда эдравымь разсуждентемь, а не предразсудкомъ пушеводимы бышь должествують, то и весьма справедливо, чтобъ всякой, желающій преподать начто ко благу цалаго, должень быль объявить свои побудительныя къ тому поичины, дабы могли объ оныхъ судить, поколику оныя основащельны или неосноваmельны сушь; а безb сего ник mo не обязань внимать ему. Почему и желаю я также быть судимымъ. Побудительная причина предпріятія моего есть та, чтобь быть полезнымв, и я надъюсь, что последствіе подтвердить намъреніе мое. И такъ намъренъ я безъ всякаго предисловія пушеводишельствовать и здісь читателю по мъръ силъ моихъ съ шою легкостію и върностію, каковыя только можеть представить оть предразсудка свободный разумь, опыть и чистосердечие.

Но дабы учинить пользованіе всёхо степеней понятнымо и яснымо, то предположу замёчательное употребленіе предшествующаго: ибо послёдующее есть краткое токмо извлеченіе оныхо основаній, приведенныхо во порядоко, или паче основательная теорія основанная на практико, благополучнымо успёхомо утвержденная.

# О пользовании злосвойственной гонорреи.

Первый припадокь злосвойственной гонорреи есть пріятное ощущеніе вы тайныхы частяхы, перемыняющееся мало по малу вы раздражительную, острую и непріятную боль, кы которой присовокупляется истеченіе гноеватой сукровичной матеріи у мужщины изы мочеваго ствола, а у женщины изы маточнаго влагалища; кы сему присовокупляются также купно рызы при мочеиспуска-

ніи, лихорадка, воспрепящствованное испареніе, головная боль, слабость всего тъла и т. д., которыя соотвъшствуя тълосложенію и лътамъ человъка, сначала сильно свиръпствують.

И такъ первое показание должно стремиться къ тому, чтобъ возбуждать легкое испарение, поправлять остроту мочи, уменьшать судороги въ мочевыхъ орудияхъ и волокнахъ и охранять тъло отъ общественной заразы.

Кровопусканте уменьшаеть, правда, количество крови, и причиняеть чрезь то на нъкоторое время ослабленте волоконь; но понеже подаеть оное поводь къ всасывантю яда изъ наружныхъ частей въ испражненные сосуды, то должно оное оставить.

Проносныя могуть испражнять находящееся вы кишкахы и произвесть изтечение водянистой влаги; но поелику оныя раздражениемы своимы умножають судороги нервовы, удерживають остроту, мочею и

M

K

испариною испражняемую, и способствують возместейю яда во внутреннія части штла, то должны отминены быть какт средства вредныя и личенію препятствующія.

Но чтобь достигнуть вышепомянутаго намърентя съ поправлентемъ купно остроты, то надлежить употреблять слъдующий противосу дорожный порошеко:

Возьми пересищенной селитры 2 унціи, сурьмяной киновари 2 драхмы, услажденной ртути 6 разв приподнятой одинв скрупулв.

Киноварь и сладкую ршушь должно разтереть на марморъ съ небольшимъ количествомъ воды до тъхъ поръ, пока сдълается неощутительнымъ порошкомъ; потомъ примъщать селитру и раздълить порошокъ на 24 равныя части.

Сего порошку принимается въ день два раза, или смотря по нуждъ примъшивая какого либо балсамическаго сирона, сколько нужно для сдъланія пишья, или другаго чего къ принятію способнаго-

Сей порошокъ производить по причинь вытычная селитры легкое испарение и усиливаеть отдъление мочи; от киновари укрощаеть сулороги въ волокнахь, а оть сладкой ртуши поправляеть остроту, находящуюся въ сокахъ.

А сверьх в того имветь смвшеніе каломеля или другаго ртутнаго средства съ селитрою великую пользу: ибо посредсивомъ сего раздъляется она болве по всему твлу, препятствуется двйствовать на слиноточивыя железы: ибо селитра производить легкую испарину и дъйствуеть на мочу, какъ единственные пуши, кои опредълила Натура, кажется, для изгнанія остроты. Почему сей порошокъ не только полезень вь воспалентяхь, отъ Венерическаго яда происходящихв, но можеть по вышепомянутой причинь употреблень быть и во всякой другой воспалительной бользни, въ коихъ хотя мальйшія оказываются судороги и острота (\*).

Внимание наше заслуживаетъ наибол ве мъстопребывание гонорреи. У мужщинъ находишся оное около двухъ дюймовъ въ верьху мочеваго ствола, а въ тайных в частях в у женщинъ бываеть пребывание оной различно, и есшь настоящая начинающаяся язва. А когда таковый случай находишся, то и должно обходишься вр ономр какр ср язвою: непосредственное употребление лъ. карствь есть върно наинадежнъйшее; а сего произвесть въ дъйство инаково не можно, какъ посредствомъ впрыскиваній. Но поелику впрыскиванїе почтено врачебными Писателями предпріятіемь вреднымь, то из-

<sup>(\*)</sup> Для воспрепящствованія різу, ко торый оная иногда чувствительным в особам в причиняеть, можно накапать на сахарь двіз или три капли существеннаго масла Аглинской мяты и примъщать къ питью.

слъдуемь забов причины, ихъ къ тому побудившта.

).

Одно заблуждение весьма удобно раждаеть другое, а гдв основание не швердо, шамв и здание на ономв сооруженное не долго пребываеть. Поелику думали, что таковыя язвы надлежить пользовать Бакими и съъдающими средствами, почему и для впрыскиванія таковыя употребляли, какв - то: бълой и Римской купорось, известковую воду и т. д., кои посредствомь раздраженія своего, нъжную внутреннюю мочеваго ствола оболочку еще болье раздражали, и слъдовашельно язвы размножали, причиняли воспаленіе, и зло со всъми припадками онаго увеличивали; многіе больные учинились жертвою нельпаго сего пособія. Другіе напротивь того принимали, что гивздо гоноррен всегда въ съменной железь находишся, и изв того заклю. чали, что, когда течение гонорреи какимъ бы то образомъ ни было, прекращение будеть, то можно по-Часть III. KK

саб скоро изгнать ядь посредствомь слабительныхв, рвотныхв, кровопусканія и т. д. Они употребляли вь семь намърении разные для впрыскиванія сосшавы, ко коимо примъшивали бълилы, квасцы и другія вяжущія средства. Что должно произойти изъ таковаго ихъ предпріяшія, осшавляю я на судь каждаго. Иногда прибавляли каломеля, иногда минеральнаго эбіопа, иногда сулемы, а иногда св клейкостью смъщанной рмути, не вь томь еднакожь намърении, чтобъ поправить остроту, но чтобь разжидить истекающую матерію, истребить дикое мясо и т. д.; а понеже оныя существа, которыя по Натурь их вредны суть, вь оныхь составахь вь большемь находились количествь, то и уничтожали онъ хорошія дъйствія примъщанных в онымь немногихъ полезных вещей. Но таковыя впрыскиванія не могли бы обольстить вредными своими дъйствіями въ сравнении другихв, коихв составь 3

20

H

лучшія имвлю основанія и по тому лучшія оказывалю двиствія, естьлибю не имвли неосновательнаго мнвнія, что всв впрыскиванія сутьравны. Но разсудоко научаето, что когда впрыскиваніе принаровлено ко поправленію и истребленію Венерической остроты во язвинь, матерію источающей, то должно оное довершить и непосредственное льченіе

Вышесказанное мною подтверждено долговременным в опытом в, и я признаюсь чистосердечно, что сообщение сего легкаго и надежнаго способа лачения гонорреи, задушать ядь при его зарождении и отвратить порчу многах в молодых в людей обоего пола и их в насладников в, было главнайшею причиною объявления сего трактата. За похвалою, сколь она ни лестия, я че гоняюсь; я награжден в уже удовольствием в, спосташествовав в начто ко благу человачества.

### отъ остроты служащее опрыскивание.

Возьми сладкой ртути, шесть разд приподнятой, произвольное колитество; три оную сд небольшимд колитествомд воды на марморв, пока сдълается мълкою, такд стобд плавала вд водь; потомд разболтай вд удобномд сосудь, наливши довольное колитество воды; послъ, когда вода отстоится, слей оную, высуши ртуть постепенно. Смъщай в скрупулд сей сладкой ртути сд одной унцею воды и сохраняй вд склянкъ.

Recipe mercurii dulcis sexies sublimati, quantum libet; laerigetur cum paululo aquae super marmor aonee stat subtilissimus, ita ur prompte suspendatur in aqua, deinde in vase idoneo aqua multa assusa circumagitetur; postea reponatur dum aqua limpida siat; aquam essunde, et gradatim mercurius exsiccetur. Hujus mercurii dulcis scrupulum unum misce cum aquae uncia una et in phiala serva.

Прежде употребленія сей инбекцій должно оную взболшать; а впрыскивать одинъ, два или три раза и еще чаще, естьли то потребно будеть: но сте должно дълать вскоръ послъ испущентя мочи. Для впрыскиванія довольно небольшаго количества, которое должно посредствомЪ передней кожицы, сколько можно, удерживать въ мочевомъ стволъ, и прежде испущенія обмазать онымі пльшку. Но естьли мочевый каналь очень чувствителень или плъшка инфламирована, что весьма часто происходить у тьхь, кои вь первый разв получають гоноррею, такъ какв и у молодыхв горячихв людей, то можно трубочку насосца, для удобнъйшаго запущенія оной, обмазать прежде ртутною мазью.

Посредством сей инвекціи можно в короткое время выльчить основательно наизлосвойственную гоноррею, истребить дикое мясо, совершенно исправить остроту и совсьм затворить язвины. Она слу-

жить также ко всякимь фистуламь, вь какой бы части тъла оныя ни находились Она разбиваеть антоноогненныя воспаленія, поправляя остроту и истребляя судорожное сожащие плотных в частей. Она отвемлеть тнилую и вакую остроту посредствомъ ея гнилости и остротъ сопротивляющейся силы, и превращаеть помощію оной развідающую сукровицу въ хорошій гной; а понеже освобождена она отв раздражающихв соляных в частиць ртути, то дъйствуеть она слабо и всасываеть остроту, не причиняя никакого раздраженія.

Употребляя впрыскиванія, не нужно прилъпляться ко времени; но чъмь варанте оное употреблено будеть, тъмъ скорте кончится и больть какъ въ мужескомъ, такъ и въ женскомъ полъ. А какъ таковое впрыскиваніе есть невинно и здоровыхъ частей не повреждаеть, то слъдуеть, что оное вскорт послъ появленія гонорреи употреблено быть

можеть; и естьли употребится оное тотчась посль нечистаго сонтія, то задушаеть ядь при первомь его зарожденіи. Естьли за сію откровенность мою будуть меня хулить, пю скажу вь оправданіе мое, что намъреніе мое при семъ было то, чтобь сдълать добро, и что мнъ отвратить элоупотребленія не можно. Знаніе вышепомянушаго не можеть вредить добродътельному; но невичных в супругь невърных в мужей предохранить оное хотя неизвъстным в образомь отв многихь золь, коимь накотпорыя постыднымо образомо подвержены бывающь; а что касается до порочных в машинистовь, то послужить оное, можеть быть, кь ихъ исправленію, по крайней мъръ желаю я сте ко благу оныхъ.

У женщинъ выдъчиваетъ впрыскиванте не только застарълую злосвойственную гоноррею, но и всякую ъдкую и непртатную бъль, которая была прежде запущена или не усмотръна надлежащимъ образомъ.

А что такое есть быль, показали мы уже вы своемы мысть; а изы сказаннаго тамо явствуеть, что кръпишельный средства недостаточны сушь къ отвращенію оной: ибо над. лежить поправить прежде остроту, къ чему ничто не бываетъ такъ пригодно, какъ теперь описанная инъекція; что надлежить до мыловки (talium), Аравійской камеди, улитокъ, змвинаго булюну или ослинаго молока, то могуть оныя, можеть быть, оказать накоторыя полезныя дыствія, потому что отв обыкновенной пищи отличаются; но есть. ли оставимь всякое шарлатанство, то должны признаться, что жареные или вареные угри, или Roaffbeet и плумбиуддингь сушь столькожь дъйствительны, а можеть быть и еще дъйствительные. Но въ случав, когда швло и мышечных волокна слабы суть, а соки изобилують мокрошою, що можно вмѣсшо несправедливо крѣпительными почишаемых и вмъсто вяжущих и раз\_ дражительных редство употребить следующую крыпительную настойку:

Возьми Канадскаго балсама три унціи, бакаутной смолы полунціи,
двоенаго виннаго спирта одино
фунто. Сіи настанваются во легкой теплоть, взбалтывая погаще;
посль когда отстоится, то тистая настойка со осаду сливается
или процьживается. Прибавь ко
сему существеннаго масла перитной
мяты двь драхмы. Сей настойки употребляется маленькая ложка во рюмкь вина, воды или
сдъланнаго со небольшимо колитествомо балсамитескаго сыропа
литья два или три раза во день.

Recipe balfami Canadensis uncias tres, gummi guajaci unciam semis, spiritus vini reclisicati librae mensuram. Digerantur leni calore saepius agitando, deinde faecibus subsidentibus tincturam limpidam essunde sive percola. Huicadde olei essentialis menthae piperitidis Hacmib III.

drachmas duas. Hujus tincturae cochlear minimum in cyantho vini, aquae vel haustu secundum artem sasto cum paululo syrupi balsamici pro lubitu bis vel ter de die capiendum.

Вещи, собранныя въ семъ составъ соопвътствують показанію и силь, ошь оныхь ожидаемой; ибо посредствомъ Канадскаго балсама и бакаутной смолы двиствують оныя посредствомъ усиленнаго раздражентя, производимаго ими въ шълъ, слегка на мочу; а посредствомъ масла перичной мяшы укрѣпляють нервы не только въ желудкъ, не и во всемъ шълъ. Почему сїя насточка и не шолько пригодна для слабых в женских в сложеній, но и для всьхв флегматиковъ. Она есть не только наисильный нее средство для возстановленія испорченнаго аппетита и сваренія въ первыхъ пушяхъ, но и для возстановления въ мочевыхъ и дътородных в орудіях в и во всем в тьль надлежащей протяжительной силы. Я осмыливаюсь даже утвердить, что оная столько же служить ко плодородію, и столько же удачно унимаеть закорентлое стменотеченіе у мужщино и у женщино, како и вст кртность придающія средства, которыя ото обладателей оныхо похваляются, но коихо пріусотовленіе содержится во тайнть.

Посредствомъ сего легкаго и купно дъйствительнаго способа можно выабчишь наизлосвойственныйшую гоноррею и предварить всъ худыя сабденвія оной, естьли противосудорожный порошокь и противу остроты служащее впрыскиваніе немедленчо употреблены будушь; и сабдовашельно предупреждено будеть произнествие шанкеровь, пріапизма, паховиковь, опуколи ядерь и всёхь худыхь следствій оныхв; но естьли уже оныя произошли, то должно ихв истребить, почему и надлежить употреблять прежде объявленныя средсшва.

Иногда случается, что гивадо гонорреи занимаеть мъсто въ мочевомъ стволъ очень высоко, такъ что впрыскиваемая влага посредствомъ обыкновеннаго насосца достигнушь онаго не можешь; ибо сколько бы силы при впрыскиваніи ни упопребляли, однако впрыскиваемая матерія ръдко или никогда не достаеть выше, какь простирается трубка насосца. Но гоноррея обыкновенно не засъдаеть сначала такъ высоко, естьли ранка въ мочевомъ стволъ не будеть растравлена не надлежащимъ образомъ лъченія. Въ такомъ случав, гдв не могу я достать гивздо гонорреи обыкновеннымъ насосцемъ, то употребляю витой катетерь, который принаравливаю такь, чтобь можно было утвердить оный кв насосцу (\*), и такимъ образомъ впрыскивалъ я сь хорошимь успъхомь. Витой катетерь, употребляемый для сего на-

<sup>(\*)</sup> См. 5 таблицу.

0

мъренія должень быть гладокь и гибокь. Но естьли мочевый стволь или отв нерадьнія больнаго, или отв худаго пользованія наполнень мясистыми наростами или затвердьніями, которыя препятствують истеченію мочи, и естьли не премьно нужно будеть употребить свычки, потому что витаго катетера запустить не можно, или и вь случав неимьнія онаго, то можно сдылать ихь слыдующимь обравомь:

Возьми ртутисто пластыря дев унціи, лаку полдражмы, Венецейскаго терпентину одиу дражму, сладкой ртути шесть разь приподиятой и предписаннымь образомь приготовленной дев дражмы, красной осажденной ртути также приготовленной одинь скрупуль. Терпентинь при легкомь огны распускается, дабы прибавлений лакь свонымь соедиимлея, по томь кладется пластырь, а послы сладкая ртуть, смышения сь осажденною. Все хорошенько размышивается, дабы че-

A A 3

го не отсёло и горячее смъщение не пригоръло.

Recipe emplastri mercurialis uncias duas, laccae optime pulverisatae drachmam dimidiam, terebinthinae Venetue drachmam unam, mercurii dulcis sexies sublimati et more praescripto praesparati drachmas duas, mercurii praecipitati rubri eodem modo praeparati scrupulum unum. Leni igue lique stat terebinthina, ut lacca injesta coëat, deim emplastrum adde, postremo autem mercurium dulcem praecipitatum mixtum. Omnia probe misceantur, ne separatia contingat et mixtura fervida siat empyreumate vitato.

Послъ сего берушся куски шонкаго полошна дюймовъ десять въ длину и два въ ширину, скатанныя слегка цилиндрами. Сти обмакиваются въ горячую и очищениую микстуру такъ, чтобъ одна только сторона омочена была жидкосттю. Когда оные застынутъ, то разръзывается каждый кусокъ въ длину на тесть равныхъ частей, изъ коихъ каждая скатывается пирамидально отводново конца кв другому на гладкомв марморв, намазанномв мыломв сперьва пальцами, а послъ какимв нибудь швердымв и легкимв тъломв до надлежащей формы, такв чисов были совершенно гладки.

Сін суть наилучшія свычки, которыя мнъ извъстны; ибо онъ имъюшь свойенно поправлянь острону, истреблянть вырощения и зальчивашь упоривищія язвины, не причиная при томъ никакого раздраженїя, и не жасаясь здоровых у частей. Лакв и терпентинъ придающь сему смешению вязкость или клейкость; а малое количество красной осажденной отупи лишается Бакаго своего свойства большего частію отвітого, потому что очень мвако истерта, и такъ морото размашана сь цалымь, однако довольно еще сильна для истреблентя находящихся зашверавлосшей, не касаясь однакожь здоровых в частей.

Вь разсужденій свічекь имію я напомнишь шолько шо, что оныя, какъ бы слабо сдъланы ни были, не инаково должны употребляемы быть, какъ только въ крайней нуждъ, и что употребление оных в должно оставишь, какъ скоро препяшешейе ошвращено будеть; поелику оныя оставляють посль себя слабость вь мочевомъ стволь, по причинь безпрестаннаго растяженія, ими причиняемаго въ гонорреяхъ, въ конхъ Венерической ядь причиниль вь разных в частях в норы, особливо в съменной железь; во относящихо съменных сосудах и в съменных в хранилищахъ не могушь свъчки принести большой пользы. А впрыскиванје посредствомъ гибкаго катетера приносило въ семъ великую пользу, и я быль столько счастливь, что освободиль нъкошорых в больных в отв ихъ недуга, коимъ они нъсколько льшь страдали, не смотря на болье нежели одинь разв претерпънное слиношечение. Въ таковых в случаях в

ď

мотушь также и кровопусканія и чистительныя принаровленныя кв талосложенію больнаго полезны бышь; однакожь не вь такомь намърении, чтобъ испразднить оными ядь, но облегчить всасывание впрыскиваемой влаги, дабы частицы каломеля тъмъ удобиве могли входишь въ фистулозные каналы; что и точно происходить, естьли учинено будеть отвлечение соковь или посредствомъ чистительных , или посредством ь кровопусканія, или другимъ какимъ образомъ; но въ то же время надлежишь стараться обезопасить кровь пристойными средствами. Сабдующее проносное можеть употреблено быть для достиженія помянутой цваи.

Возьми порошка ялапнаго кория полскрупула (болье или менье,) сладкой ртути шесть разь при-подиятой три грана, аписоваго масла или масла перичной мяты дев капли. Сдълать искуственно съ довольнымъ количе-

етвомъ балеами ческаго спропа бо-

Recipe pulveris radicis jalappue forupulum femis (plus aut minus,) morcurii dulcis fexies fublimati grana tria, olei avisi sive menthae piperitidis guttas duas. Fiat secundam artem cum syrupi balfanici quantitate sufficiente bolus aut haustus ad libitum.

А есшьли дозволить шьлосложеніе больнаго, що вы шакомы случав имбють следующія пилюли превосходное двистеїє:

Возьми гумми гумту, чистаго сахару каждаго по арахмъ, сладкой ртути шесть разъприподиятой одинь скрупуль, коришневаго масла двъ капли. Смъщай въ мълкой порошокъ, потомь саълай ев небольшимъ количествомъ воды сорокъ пилюль, и осыпь опыл порошкомъ искусственной киновари.

Recipe gummi gambogtae, fachari puristcati ana drachnam unam, mercurii dulcis sexies sublimati scrupulum unum, olei cinnumomi guttas duas. Misce, siat pulvis subtilissimus, denique cum paululo aquae formentur pilulae quatraginta, involvendae pulvere cinnabaris sasticii.

Сін пилюли сушь превосходны, в особливо въ влажныхъ шълосложеніяхъ, когда нужно быгаешъ произвесть испражненіе низомъ. Оныя супь надежное и дъйствительное средство отв глисновъ у дъпей и весьма пользують отв худокровія. Въ переполненномъ желудкъ шакже приносять онь пользу и дъйствують обыкновенно снизу и сверху.

Составь имъеть сладующія свойства: сахарь раздаляеть слабительныя части гумми-гутта, почему и дъйствуеть оный не такь сильно; каломель поправляеть о троту, каришневое масло отвращаеть разь, а осыпаніе киноварью далается для того, чтобь обезопасить желудокь оть тошноты. Я даваль оныя сь великою пользою матросамь и другимь настоящимь больнымь, такь и такимъ, которые мнили быть больными. Но естьли при таковыхъ обстоятельствахъ больной очень исхудаль, чувствуеть лихорадку, или бакте соки имъеть, то должно оть кровопускантя и другихъ сильныхъ испражнентй воздержаться при помощи небольшаго: ибо терпънтя и точнаго наблюдентя дтэты принесуть впрыскивантя и противосудорожный порошокъ столько же пользы, какъ и другой способъ лъчентя, который могь бы я съ достовърносттю предложить.

Бываешь иногда шейка мочеваго пузыря, а иногда и самый мочевый пузырь мъстопребыванйемь гонорреи; вы такомы случать не могу яничего луч-шаго присовътовать, какы впрыскивание посредствомы гибкаго катетера.

Равнымь образомы можеть служить ста инвекція наилучшимь средствомы для поправлентя порчи вы маткь, или поступкомы неискусной бабки или аккушера, или другими причинами причиненной. Для

715

Ъ

V a

И

0

54

H

A

×

удобивишаго же достижения сей цвли прилагаю здёсь рисуноко особливаго рода сприца, который употребляль я въ таковыхъ случаяхъ, и который обыкновенные во всякомъ намърении превосходить. Ибо понеже впрыскиваемая въ маточное влагалище и въ мочевой стволъ у мужщинъ влага не далъе простирается какЪ инструментъ, то савдуеть, что естьли инбекція должна взойти въ морщины маточнаго влагалища и достигнуть маточнаго устья, то должно и маточное влагалище нъсколько разширишь; а хошя бы впрыскивание въ машку и не нужно было, однакожъ требуется для достиженія пользы непремънно, чтобъ инструменть доставаль до маточнаго усшья.

Должно еще напомнить, что въ гонорреи и другихъ гноетеченїяхъ впрыскиваемая влага (\*) должна со-

<sup>(\*)</sup> Переводчикъ съ Аглинскаго языка увъдомляетъ здъсь, что онъ посред-

стоять не изв другаго чего какв коломеля и воды, и ни что не можеть кь оной примъшано быть, которое бы не было оней вредно, или по крайней мъръ не уменьшило ея дъйствительности. Также за нужное починаю упомянущь и то, что ть, кои принисывають помянутой инбекціи удерживающее свойство, весьма ошибаются. Я совътоваль оную изъ собственнаго опыта, и въ утверждаемомъ мною столько увъренъ, что думаю о всъхъ употребленію оной сопротивляющихся, что они двлають сте отв неразумія и предразсудка, либо изв любосшяжанія.

Надлежить еще вы разсуждении употребления нашей интекции замытить слыдующее, а именно: можно употреблянь оную три раза вы день,

ством в инвекцій, состоящей изветь венія изветьковой воды, розовато меда и небольшаго количества сулемы, выльчиваль гонорреи въ гораздо кратчайшее время.

To

) ...

0

пока истечение сабалется тусто: сте ділается у нікопорыхі ві про-Долженін двапіцэпін чешырехв часовь; посав сего должно употребляшь оную шолько два раза в день, то есть по утру и въ вечеру, пока потеряеть течь желпой цвъть, сдълается бълою и тягучею, и количество оной уменьшинся: тогда довольно будеть употреблять оную только по утрамь; а какв скоро сдълается течь прозрачною и появится въ мочь нъкопорыя только волоконцы, то дозольно будеть употреблять оную чрезь день, пока течь совсъм в прекратится. Сте разумвется обыкновенно только въ долгопродолжавичихся гонорреях1: ибо вы новопроизшедших в совершается лъченіе помощію нашего способа ві восемь или десять дней, естьли оный заблаговременно употреблень, и надлежащая дізта наблюдена будеть; весьма ръдко продолжаещся оное долье, развъ от неискуснаго содержанія, а иногда и еще ранъе оканчивается. Нъкоторые изъ больныхъ моихъ освободились совершенно отв наизлосвойственнъйшей гоноррен въ пять и б дней, а еще у нъкоторыхъ происходило сїе даже въ продолженіи 24 часовъ. Теплая ванна весьма много способствуеть лъченію; сія и осторожно наблюдаемая діэта споспътествують служить наипаче воспрепятствованію вожженія и распространенія яда; кровопусканіе же и проносныя служать напротивь того въ новопроизтедтей гонорреи единственно къ распространенію Венерическаго яда по всему тълу.

О пользованіи шанкеровд и Венеритеских дязво вообще.

Что касается до шанкеровь, то можно отвратить оные совершенно при возрождени гонорреи употребленйемь инъекции. А естьли оные точно произошли, или особливо естьли нъсколько уже времени существовали, то требують большаго вспоможения, однакожь растворение

каломеля въ водъ бываешъ и въ семъ случаъ по большой части достаточно.

Фимозись или незалупа, присоединяющаяся иногда ко гонорреи, происходишь или ошь пошаенных в шанкеровь, или оные и производишь. Примочки и припарки бывають вь такомъ случат излишни, а впрыскивание вдких в растворений, на пр. бълаго купороса, Римскаго купороса и ш. д. промежду головки и передней кожицы служишь только къ умноженію зла. Но вышеписанная инбекція наша поправляеть въ скоромъ времени острону и уменьшаетъ чрезв- то опухоль крайней плоти, такъ что можно обнажить головку. и разсмотръть состояние танкеровъ.

Въ какомъ бы мъсть оные ни находились, и какъ бы злокачественны ни были, однакожъ никогда не требують употреблентя прижигательнаго камня, ни Римскаго купороса, ни другихъ ъдкихъ средствъ, равнымъ образомъ и сваривающія

Yacma III. M M

средства суть въ семъ случат без-

Слъдующій церать удовлетворяеть посредствомь остроту утушающей, чистительной и живительной силы своей всъ наружныя показанія не только вь шанкерахь, но и вь другихь язвахь, какь бы оныя велики и злосвейственны ни были.

Возъми красной осажденной ртуты полунцін, каломеля дев унцін, свинцоваго сахару одну унцію, 6 tacro cocky remupe yulin, ayuшаго деревяннаго масла в унцій, бергамотовой эссенцін 20 капель. Сладкая ртуть, смешанная съ осажденною, третея съ неболь-MINME KOANTECMEOME BOASING TACKAком в марморь высамой мылкой порошокъ; высушивается, емвшивается съ свинцовымъ сахаромъ и опять трется. Воскъ съ мисломь при легкомь огнъ распускается, примъшивается порошокъ, потомъ эссенція, и все вміcmt miniciemen do mixa nopa, noка церать застынетьRecipe mercurii praecipitati rubri semiunciam, mercurii dulcis sexies sublimati
uncias duas, sachari saturni unciam
unam, cerae albae uncias quatuor,
elei olivarum optimi uncias sex, esentiae bergamot guttas viginti. Lavigetur
mercurias dulcis praecipitato mixtus super marmor planum cum paululo aquae,
ut siat pulvis subtilissimus, exsicca,
misce cum sacharo saturni, iterumque
laevigetur. Lique siat cera cum oleo
igne leni, insperge pulverem, adde
essentiam, et agitentur simal omnia donec frigescat ceratum.

Į

Сей церать можно надежно употреблять вмъсто всъхь мазей, пластырей и цератовь, изданныхь за собственнодъйствующія противу язвы и закожныхь бользней, какь бы оныя ни назывались, конхь составленіе или содержится вы тайнь, или для нользы человъческаго рода объявлено. Излишне было бы описывать здъсь дъйствія онаго вы бользняхь, Венерическою или другою какою остротою причиненных вы язвы ли бы то были, или вышеписанныя сыпи; но довольно того, что отв онаго столькож вольно тользы и воспоможен вожидать можно, как в отв какого либо другаго наружнаго средства.

И так в присоединю еще только то, что сей церат в можно употреблять для каждой страждущей части твла, и втирать оный, или, смотря по надобности, намазавши на корпію прикладывать. Во встх вышеномянутых в случаях прибътаю я к в сему церату.

О пользованій фимозиса или незалупы, парафимозиса или неотлупы, корды и пріамизма.

Естьли ядь Венерической займеть нъкоторыя особливыя части, то произходять помянутые недуги.

Естьли незалупа и неотлупа произойдуть от шанкеровь, то оные помощію объявленных в средствь вы скоромы времени отвращаются.

Но ядь бываеть иногда заключень вь сукровичныхь сосудахь крайней плоти, и причиняеть тамо гуммы и инныя затвердълости, кои другаго требують вспоможенія. Вь такомь случав живая ртуть имветь предь прочими пріуготовленіями прешмущество по причинь удачныйшей большей ея вы кожные поры проницательности: почему и должны мы прибытать ко ртутной мази и другимь сь живою ртутью составленнымь средствамь.

Въ пртугошовленти оной опиступаю я отъ Лондонской диспензаторти только въ разсужденти Венецейскаго терпентина и сърнаго балсама: ибо хотя и служать оные къ
удобнъйшему ртутныхъ частиць раздроблентю; однакожъ я опасаюсь,
что оные отъемлють нъсколько у
ртути пронзительнаго ея свойства,
отъ коего дъйствтя здъсь все зависитъ, и могуть посредствомъ раздражентя, которое они произвесть
М м з

въ состояния, причинить воспа-

### РТУТНАЯ МАЗЬ.

Возьми сепкаго сала мытаго в функть, перечищенной ртути полфунка, діахильнаго плавтыря дев драхмы. Ртуть растираетен съ пластыремь, смышаннымь съ небольшимь количествомь сала до тых порь, пока всы шарики оной изгезнуть; потомы прибавь остальное салон смышай хорошенько; канослым же можно прибавить капли двы масла розоваго дерева, или столько же бергамотовой эссенціи.

## UNQUENTUM MERCURIALE.

Recipe axungiae porcinae lotae libram unam, argenti vivi purificati femilibram, emplat stri diachilon drachmas duas. Ope emplastri, cum paululo axungiae mixti, frituretur argentum vivum, donec globuli omnes evanescant; deinde adde exungiae reliquam probe miscens, ad sinem adsicere poteris clei thodii guttam unam aut alteram, aut essentiae Bergamot tantillum.

## ДІАХИЛЬНОЙ ПЛАСТЫРБ.

Возъми масла деревнинаго 4 фун-

Recipe olei olivarum libras quatuor, lithargyri fesquilibram.

Глент должно расшереть съ водою на марморъ, потомъ варить въ масломъ на легкомъ огнъ, прибавляя понемногу воды и мъшая безпрестанио, пока масло и глетъ совершенно соединятся и составятъ надлежащую густоту пластыря.

## РТУТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ.

Возьми діахильнаго пластыря і фунть, перечищенной ртути полфунта.

Ртуть растирается съ небольшимъ количествомъ описанной мази, пока всё шарини разобнотся, потомъ примешивается къ разогретому пластырю и хорошень-ко смёшивается, пока соединятся.

#### EMPLASTRUM MERCURIALE.

Recipe emplastri diachylon libram unam, argenti vivi purificati semilibram.

Frituretur argentum vivum cum exigua quantitate unguenti nuper descripti, donec omnes evanescant globuli, deinde emplastro immisce liquesacto, bene movens donec coëant.

# свинцовый экстрактъ.

Возгли глета хорошо истертаго і фунть, уксусу винограднаго лучшаго 4 фунта. Сіе настанвается презь ивсколько времени въ тепломъ мъсть, потомъ варится при безпрестанномъ мъщаніи, пока глеть по возможности растворится и экстракть получить густоту сиропа. Естьли на остальной глеть нальется свъжей уксусь и по вышеписанному уварится, то получится прибавокъ къ экстракту.

### EXTRACTUM SATURNI.

Recipe lithargyri optime laevigati libram unam, aceti vini optimi libras quatuor.

Digerantur per aliquod tempus, deinde coquendo et commovendo, quantum seri potest, solvatur litharogrus; costionem. continuans donec extractum syrupi crassitudinem habeat. Si litharogro ad fundum manenti novum opponas acetum, operationem repetendo extracti additamentum habebis.

12.4

38

t.

Z

y.

Ртутная мазь бываеть обыкновенно достаточно для разрашения опухолей, естьли бережно вь оныя втираться будеть, и гораздо превосходить примочки; развъ только часть оной кь онымь примътена будеть, иго вы такомы случав являють и примочки безподобное дъйстве.

Неотлупа пріємлемъ ичогда на себя (какь выше объявлено) дурной видь, особливо естьли или сначала запущена, или худо пользована будеть; но какь бы сильно оная не свиръпствовала, однако оть нижесльдующаго средства обыкновенно уменьшается и проходить.

Часть III. Н н

# ПРОТИВУВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ МАЗЬ.

Возьми свинцоваго извлеченія, ртутной мази, церета противу остроты, каждаго поровну. Смьшай корошенько на марморь.

### LINIMENTUM ANTIPHLOGISTICUM.

Recipe extracti faturni, unquenti cum mercurio, cerati contra acrimoniam, fingulorum pondera aequalia. Probe misceantur super marmor.

Естьми намазаво сей мази на холстину, наложить на неотлупу и головку, то являето она превосходныя дъйствія, и во состояніи даже остановить омертвоніе: ибо кромо дойствія противу остроты, служащаго церата и ртутной мази, холодительное свойство свинца споспошествуєть весьма много ослабленію напряженных волоконь. Но не смотря на хорошее дойствіе сей мази во воспаленіяхь, совотую я упо-

Я

y-34

F-

r-

0-

er

a

И

H

0

0

шреблять оную умъренно, особливо ради свинцу; потому что я всегда опасаюсь вредных в отв онаго следствій, развъ шолько въ шакомъ количествъ употреблена будеть, чтобь не очень разслабить волокна, и онъ осшанутся способны изгнать оный опять вонь. Вь легких случаяхь прошиву остроны служащій церать довольно досшаточень; описанная нами мазь можеть также посредствомь уксуса савлана быть слабве, который св оною легко соединяется, еспиьди пелько несколько пруда упопреблено будеть, и доставляеть превосходное средство противу всякаго рода внъшних воспаленій, или оть обожжения горячею водою, или доугими вещами, или и отв рожи произшедших в.

Струнообразное напряжение (chorda) выльчивается вы скоромы времени носредствомы помянущой иныекци, особливо естьли оное не давно произошло, и иныекція до гитада онато достигнуть можеть. Но бываеть

иногда, что хорда, естьли Ренери. ческой ядь заключень шакь, чио авкарство должно прежде обойши другими пушями, прежде нежели достигнеть до того мъста, пребываеть нъсколько времени упорна; вь такомь случав можно доститнушь намбренія посредствомо ньсколько времени продолжающатося втиранія небольшаго количества ртушной мази. Можно шакже оштрашишь сте зло посредством в на лайку намазаннаго отупнато пластыря, наложа оный снаружи им то мъсто, гдъ напряжение ощущается и на такъ, и употребляя купно инъекцію.

А естьли случится, что опухоль женской крайней плоши и тайных тубь будеть мокрошная, какыто вы мокрошных и изнуренных в сложентях в хотя рыдко случается, то требують помянутыя средства прибавлентя раздражающаго, дабы ртуть тымо удобные могла проникнуть и оказать свое дысп.вте-

## летучій ртутный линименть.

Возьми ртутной мазы одну унцію, масла сассафрасоваго корил 20 напель, камфоры однив спрупуль, летучато нашатырнаго спирту полунціи.

Камфора растирается помощію нёскольких виннаго спирта вы самой мёлкой порошокы, по томы прибавляется масло, а послё мазь; кы симы прибавляется по предшествующемы смёшеній мало по малу летучій спирты, и будеть линименть.

# LINIMENTUM MERCURIALE VOLATILE.

Recipe unquenti cum mercurio unciam unam, olei radicis fassafras guttas viginti, camphorae scrupulum unum, spiritus volatibis salis ammonizci semiunciam.

In pulverem subtilissimum ope guttulae aut amplius spiritus vinosi redigatur H H 3 camphora, dein adde oleum, postesque unquentum, quibus in unum corpus redactis gradatim injice spiritum volatilem, ut siat linimentum.

Сей линименть разбиваеть вы скоромь времени мокротную опухоль, и приносить также и вы нъкоторыхы другихы случаяхы, о копхы ниже упомянуто будеть, нарочитую пользу.

Пріапизмі обыкновенно и сі прочими воспалительными припадками проходиті; но естьли оні весьма силені и всеобщее воспалительное сожатіе существовать и всі нервы купно сострадать будуті, то суть обільленныя средства недостаточны. Кровопусканіе будеті здісь непремінно нужно, и можеті у полнокровныхі людей сміло учинено быть; однако не должно ві семі случать оставить безі употребленія наші противовоспалительной порошокі, потому что оный обезопаситі кровь оті заразы, которой больной всегда le

-

послѣ кровопусканія подвержень бываеть. Также и клистиры имѣють здѣсь свою пользу, ибо они утоляють судороги и отвлекають остроту; и такъ естьли купно наблюдаема будеть скудная діэта и употребится снаружи противовоспалительной линитенть, то можно еще подать больному руку помощи, естьли только смерть не сидить уже, такъ сказать, на носу.

## О пользовании бубона.

Ръдко происходить бубонь вскорь посль нечистаго соитя, развъ что гоноррея или кровопускантемь, проносными или вреднымь пользовантемь задержана будеть. А какъ скоро онъ появится, какая бы тому причина ни была, то больной близокъ ко всеобщей заразъ. Естьли послъдуемо будеть по вышеписанному методу въ недавной гонорреи, то никогда не произойдеть бубона; но когда онъ уже однажды есть, то дол-

жно стараться истребить оный. Естьли захващишь оный сначала, то учинить сте не такъ трудно. Ежели положинь на оный на лайкъ намазанный ртутный пластырь, обръзавь прежде съ бубона волосы и вмазавь вь оный насколько ртутной мази, то в скором времени разобъется, оссбливо естьли купно употреблень будеть противовоспалительной порошокъ и слабительное для облегченія пользованія. Но ежели воспаление досшигло уже шакой сшепени, что можно сомнъваться о возрождении гноя, по можно употребить съ пользою следующую припарку.

Мягчишельная и прошиву осшрошы устремленная припарка.

Возьми припарки изъ молока и хльба (бълаго) свареной полфунта, противовоспалительнаго линимента полунціи, смъщай.

### По Лашинъ.

).

6

.

ť

Recipe cataplasmatis ex lacte et pane confesti semilibram, linimenti antiphlogistici semiunciam, misce.

Сія припарка прикладывается къ паху шеплою три раза въ день, и шакимъ образомъ върно узнаешь, разъръщится ли бубонъ или перейдетъ въ нагноеніе.

Когда же подлинно возродится во ономо гной, то должно оный проредать; однакожо надобно делать сте не слишкомо поспешно. Для перевязывания по вскрыти бубона бываеть обыкновенно довольно одного противу остроты служащаго церата. Однакожо объявленная принарка бываеть по большой части достаточна, чтобо произвесть во ономо разрышенте, что и долженствуеть всегда быть предметомо старания нашего. Обыкновенный способо, како льчать бубоны, совство противень здравому разсудку, и явно не со-

1

отвътствуеть врачебному показанію; стараніе привести бубонь кв скорьйшему нагноенію, во пюмо намъреній, чтобъ изгнать чрезь сіе Венерической ядь изь твла, столько же безразсудно, какъ и поступокъ при ножаръ, естьлибъ вздумали дать волю горьть цьлой улиць для спасенія прочей части города; да и послъдствие въ обоихъ случаяхъ равно, и я осмвлюсь ушвердишь, что большая часть претерпъвшихь Венерическую бользнь получили оную отв не хорошаго пользованія, особливо естьли еще бубонь употреблентемь ъдкихъ средствь растравленъ и въ противность разсудку и натуры содержень опкрышымь. Огонь зашушается не умножениемь пламени, такъ и Венерической ядь, подобный огию, должень уничножаемь бышь тамъ, гдъ появится. Натура и искусство весьма много въ семь случав между собою различествують; вътерь можеть направить огонь въ ту или другую сторону, и даже въ нашу пользу; а когда шушимъ мы огонь, що заливаемь оный водою вь томъ мъсть, гав оный появится; то же самое происходить и съ Венерическимъ ядомъ, натура можетъ извергнушь оный вь шу или другую часть, а стараніе наше должно стремиться къ тому, чтобъ истреблянь оный въ шомъ мѣсшѣ, гдѣ онъ окажется. Объявленныя здъсь средства, разбивая бубонь, уничтожають купно и ядъ Венерической; на сїє надлежало бы всегда устремлять вниманіе при разръшеніи. Способь льченія нашэго весьма отдалень оть средство внутрь вгонящихв, посредствомь коихь ядь вь другое токмо мьсто вгоняется; равным в образом в и кровопусканія и проносныя безъ помощи ртупи ничего другаго не производять, какь переносять ядь съ одного мѣста на другое. Что до меня надлежишь, що я столько удостовърень въ дъйствительности описаннаго завсь способа, что осмвлюсь ушвердишь, что еспьли оному послъдовано будеть, то не будеть нужды ни одного изъ тысячи бубоновъ проръзывать, и что сей одинь прежде употребления онаго отв нерадъния запущень.

Съ заразными желваками не имъемъ мы здъсь по настоящему ни-какого дъла; однакожъ надъюсь, что мы въ послъдствіи, когда благо-успъшныя дъйствія ртуши толико стали намъ извъстны, найдемъ въ ней и противу оныхъ доброе цълительное средство.

Что касается до зобообразнаго бубона, то можно истребить оный помянутыми средствами также удобно, како и всякими другими, и ртупный пластырь будеть вообще для того достаточень. Како вы можротных вы продолжение средство. Но во всъх сих упортых опухолях ве должно забывать, что для истребления оных потребно их впроизшество и продолжению со-

отвътствующее время. А что легжіе способы лъченія како во сихо, тако и во встхо другихо бользнахо, наидъйствительнойшіе суть, покажу обстоятельно во послъдствіи.

О пользовании опухоли во ядрахо.

Сте есть изв всъхв досель описанных в наитрудныйшее, поелику ядра вь такомь находятся положеніи, что вибшнія средства, по причинь отделенных в покрововь оныхв, не мегушь скораго надь оными произвесть дъйствія, кь сему присовокупляющся еще различныя извилины тончайших в каналов в ядерчаго существа, такъ что не ръдко принуждены бываемь прибъгать въ семь случав ко внутреннимь средствамь. Однако нично шакъ не запрудняло лаченія, крома не прилично употребляемых в наружных в средствь, какв нерадивое невнимание к в приносящимъ и опносящимь съменнымь сосудамь, на коихв, какв я выше показаль, висять ядра. А дабы относящихь сосудовь чрезь растяжение не раздра-

жить, и чрезъ то не увеличить опухоли, що должно, для облегченія шяжести ядерь, употребить перевязку, которая бы не только поддерживала шулята, но и прижимала бы со встхв сторонв наложенную припарку. Для сего намъренія изобръль я перевязку, которая, правда, очень проста; но для сего употребленія, есть по моему мнѣнію, весьма способна, и которой я, для избъжанія забсь остановки, присовокупляю рисунокъ и описание. Естьли въ опухоли ядеръ подана будетъ заблаговременно помощь, то ртутный пластырь и, ёстьли нужно, слабительное, купно съ перевязкою, истребять вы скоромь времени сей бользненный и опасный недугь. Но естьли все сте будеть для разрышентя недостаточно, и воспаление будеть продолжаться, то должно приступишь кЪ другимъ средствамъ. А въ семъ случав могушъ рвотныя нарочиттую принесть пользу, а особливо естьли оныя соединены со опушью,

или изъ оной составлены; въ нъкоторыхъ сложентяхъ можно съ пользою давать минеральной турбитъ до трехъ или четырехъ грановъ. Слъдующее рвотное употребляль я всегда съ хорошимъ успъхомъ, и оное кажется для меня надежнъйшимъ.

Возьми порошка ипекакуанны один в скрупуль, сладкой ртути 6 разь приподантой и по описанному способу приготовлениой четыре грана, смишай и сдълай по правиламь искусства катышекъ или питье.

#### По Латинъ.

Recipe pulveris radicis ipecacuannae scrupulum unum, mercurii dulcis sexies sublimati more praescripto praeparati grana quatuor, misce. Fiat secundum artem bolus aut haustus.

Сте рвотное върно разгонитъ ртутныя части по всему тълу, и чрезъ натугу онымъ причиняемую будетъ споспъшествовать испаринъ, особливо естьли больной принималъ

прежде противосудорожный порошокъ. Сей образь двиения при умвренномь употреблении слабительных в пилюль, а когда воспаление сильно, прошиву остроты служащая припарка, или прошивовоспалишельный линименть, истребять вь скоромь времени наиупорнайшую опухоль ядерь, есшьли полько не замедлили сперва употреблять пристойныя средства. Но когда уже возродишся во ядрахо тной и ощущишся вы них выбление онаго, нужно будеть учинить ему помощію ланцеша выходь, и по учинении сего перевязыващь оныя однимь прошиву остроны служащимь цератомь, избъгая при томъ употребленія ъдкихъ средствь и турундовь изъ корпіи.

O пользовании Венеритеских ви не Венерисеских виншеко.

Три рода суть Венерическихъ шишекъ. Онъ бывають или мозолистыя, затвердълыя и рогообразныя, или ракообразныя и подъ кожею сокровенныя, или открытыя и вноеточивыя. По сему различію должно быть и различное пользованіе; все дьло зависить вы семь оть непосредственнаго дъйствія употребляемых наружных средствь. Изы сего явствуеть, что при пользованіи образованіе оных почти совсьмы вы разсужденіе не пріемлется, ибо случай и положеніе причиняють наибольшое различіє.

Бородавки можно безъ всякой опасности, естьми дозволить положеніе, сръзать до самаго мяса, и заживить однимь противу остроты служащимь цератомъ; а естьми основаніе оныхъ покажется по видимому очень твердымъ, то съ большею пользою употребить можно противовоспалительной линиментъ, особливо когда небольтое воспаленіе существовать будетъ.

Заднепроходнія шишки, желваки и ш. д. суть по натурь ихв почти одно и то же, и благоустьшное оныхв издвиеніе зависить сочасть III. Оо вершенно отв запущентя ртути внутрь. Почему летучий линиментв и производитв хорошее дъйствие, особливо естьли вв летучемв нашатырномв спиртв разведено будетв нъсколько сулемы, а именно: одинв гранв оной вв одной унци нашатырнаго спирта я употребляль сие св благополучнъйшимв уснъхомв.

Шишки плоскій и широкій, имъющій подобіе земляники и винных в ягод в и т. д. могушь, естьли оныя тноеточивы суть, вы скоромы времени истреблены быть посредствомы противу остроты учрежденнаго церата, или когда явятся упорными, посредствомы противу воспалительнаго линимента истреблены быть пикь, что оны начнуты наконецы щелущится и заживають.

Бакая примочка, сурьмяное масло, прижигательной камень, присыпывание красною ртутью суть не телько безполезны, но и причиняють больному излишнюю боль. Завязки суть страшныя средства, и не

i

смотря на причиняемую оными больнымь муку и сопряженное съ оными воспаление и опасность отвращають зло только на время, и иншки выступають всегда снова, потому что корни ихъ остаются невредимы. Окуривание еще гораздо опаснъе, и осмълюсь утвердить, что употребление сего способа всегда сопряжено съ наивреднъйшими для здравия слъдствиями.


Однакожъ должно вдъсь замътить, что Венерическія шишки бывають почти всегда признакомь вкоренившейся Венерической немощи, почему и бывають наружныя средства
для излъченія оныкь не достаточны,
а должно употреблять внутреннія
средства, чтобь очистить всю систему оть ядовитой матеріи, оныя
причиняющей. Какимь образомь сіе
производится, объявлю вь надлежащемь мъсть. Однакожь упомяну
здъсь, что слинопроизведеніе, мнотими похваляемое, есть не только
вь разсужденіи сихь, но и другихь

обстоятельствъ безполезно; но и какъ одно изъ грубъйтихъ заблужденій въ дъятельной Врачебной наукъ осмъевается, и купно со всъми прижигательными средствами, куреніями, лигатурами и т. п. отъ всякаго честнаго и разумнаго мужа достойны на въки изъ врачевства изгнаны быть.

Чию касается до магких мясистыхь шишечекь, то нахожу за нужное замъшинь здъсь, что изъ многихъ, почитаемыхъ вспомогательными прошиву оных в средствами, и изв замыслогатыхв паче, нежели основа шельных в разделеній оныхв. весьма не многія полезны были. Теперь опишу я пользование оных 1. Оное напудобные и надежные производишся посредствомъ прошивовосналительнаго линимента, чрезъ что не шолько боль мгновенно ушоляется, но и совстмо отвращена быть можеть, особливо когда прошиву остроны служащая настойка купно въ надлежащее время употреблена будеть.

Впрочемъ сей образъ лъченія имветь мъсто како во другихь, такь и въ Венерическихъ болъзняхъ. А особливо разумбю я забсь шишки, подобныя случающимся у Негровь. Многія изв оныхв выльчиваль я, не удерживая ихв отв работы, особливо когда оныя ошь бользни не изшошены были, и никогда не далаль я между оными и Венерическою боавзнію какого либо различія; пбо хотя оныя въ разсуждении причинъ и различны, но въ разсужденти дъйствія сушь онв одинаковы. Вошь безыскусственный способь лъчентя, служащій кв отвращенію недуговь и припадковь, происходящихь оть перваго зараженія; чымь раные оный употреблень будеть, тымь удобные ихь отвратить и худыя следствія предваришь можно. Прошивосудорожный порошоко и скудная пища, естьли только надлежаще употреблены будуть, пришупять остроту, утолять воспаление, между тьмь какъ другія средства тожь самое

снаружи производить и внъ желаемыя дъйствія являть будуть.



#### ГЛАВА V.

О пользовании втораго заражения.

Хотя безконечно трудиве выгонять изъ тъла Венерической ядь, когда онъ по всъмъ частямъ онаго разсъялся, нежели тогда, когда онъ нъкоторыя только части онаго объемлеть; но не смотря на сїе, презираю я всъ сильно дъйствующія средства, хотя бы и досталось оное сыну наслъдственно отъ отця, и ласкаю себя надеждою, что всякъ имъющій чувство, когда о семъ здраво разсудить, то одного со мною мнънія будеть.

Весьма не разумно есть разрутать разстроенную экономію изнуреннаго уже тъла новыми мученіами. Но довольно о семь; я объявиль въ предъидущемъ ясно мой мысли о семъ, и такъ приступлю теперь къ самому пользованїю.

Главное дело состоить вы томь, чтобъ изгнать ядь или остроту, проникшую въ существо плотныхъ и жидких в частей всего твла; а сте должно дълашь мало по малу: ибо хошя ршушь и весьма скоро въ большую часть кровавой массы проникнуть можеть, однакожь ни мало не спосавшествуеть сте изляченію. Обращеніе соковь вь тончайших в сосудах в плошных в часшей. нервовь, сухихь жиль и самаго даже существа костей заслуживаетъ наибольшее вниманів; но вопрось: какимъ бы образомь достигнуть до сихъ малыхъ часшиць?

Все, что ни сказано намъ доселъ о кругообращени крови и какъ бы оное справедливо ни было, однако весьма мало споспътествуеть тому познанию, въ каковомъ мы по настоящему имтемъ нужлу. Не обращение крови чрезъ сердечныя полости,

кровавыя и боевыя жилы, сукровичные сосуды, железы и ш. д. заслуживаеть наиточнъйшее изслъдован Ге, но обращение соковь вь существь волоконь, изь коихь состоять сердце, кровавыя и боевыя жилы, сукровичные сосуды, железы, сухія жилы и нервы. Положимъ, что слинопроизведение было бы надеживищимь способомь для изверженія яда, чему я уже доказаль прошивное, то спратаивается, сколько потребно для того времени? Обыкновенно употребляется на то четыре или шесть недыль; но совершають ли соки въ продолженіе сего времени теченіе свое въ сихъ частяхь, или другими словами возобноваяющся ли части оных ? Ни одинь, думаю, разумный испытатель естества не будеть утверждать сего. Но дабы учинить делояснве, то не много завсь поостановимся, и разсмотримь продолженіе или возрощеніе надкостных выростовь (spina ventosa), вътренной ости и т. д.; медлительность сего возрощенія совершенно удостовъряеть нась, что опредъленное слинопроизведенія время для совершенія ліченія слишкомв корошко. Новоизобратенный способъ красить кости Кизлярскою марїоною (Rubia tinctorum) подасть намь, можеть быть, при надлежащемъ изслъдовании, нъкоторое объяснение о кругообращении крови въ плотныхъ частяхъ, и обогатишь Врачебную науку важнымь повнаніемь. Настоящее же намъреніе мое есль шолько по, чтобъ доказашь, что по пропорціи плотности зараженных в частей болье потребно и времени для совершеннаго истребленія яда.

Предполагая сте, объявлю я здъсь лъкарство, употреблентемъ коего самая закоснълая Венерическая зарава, естьли оная еще излъчима, можетъ изъ всего животнаго строентя изкоренена быть, и которое наиудобныйшимъ образомъ проницаетъ въ отдаленныйтя и непримътныйтя кругообращентя; поелику раздробления и п

ныя ртутныя частицы в толь малом количеств запускаются в тьло, что не можно опасаться, чтоб могли оныя причинить примътное к какой либо части стремленте, или для системы тъла вредны были, и могли бы чрез то воспрепятствовать всеобщим дъйствтям оной.

# настойка противу остроты.

Возьми звоенаго виннаго спирта 8 унцій; Канадскаго балсама 1 унцію; бакаутной смолы і унцію; сассафрасоваго масла двъ драхмы; сулемы одинъ скрупуль.

#### По Лашинъ.

Recipe spiritus vinosi restificati uncias osto; balfami Canadensis unciam unam; gummi quajaci unciam unam; olei esassafras drachmas duas; mercurii corrosivi sublimati scrupulum unum.

Разведи сулему во одной половинь спирта; во остальной же половинь разведи Канадской болсамо и бакаутную смолу. Когда же от-

стоятся, то слей осторожно тистыя жидкости св отстоя; смышай оныя и прибавь масло; естьли масло тисто и неподдвлано, то во скоромо времени соединяется.

Сей настойки дается больному поушру и ввечеру отв 10 до 20 капель въ рюмкъ вина или воды. что и продолжается до совершеннаго излъченія; въ какой бы степени болъзнь ни была, и въ какомъ бы мъстъ гнъздо свое ни имъла, въ кожь, въ железахъ, костяхъ и т. д. пусть окажется она ломотою и имъеть всъ припадки летучей Венерической бользни, и самой настояшей Венерической заразы, однимъ словомь: сїя настойка полезна во всякой бользни, которая происходить отв остроты, Венерической ли то или не Венерической.

Естьли существуеть вы птав воспаление, то можно употребить противосудорожный порошекь; а ежели волокна будуть имыть мокротистую слабость, то можно дать

аналептической или кръпительной настойки. Вь упорной остановкъ испарины, при чемъ купно затвер-дълыя опухоли существують, есть рвотное наилучшее отворительное средство. Естьли же тъло сильно, или излишними мокротами изобилуеть, и слъдовательно требуеть слабительныхъ, то приносять катартическія или слабительныя пилюли наивящшую пользу.

Сїй сущь внутреннія вспомогательныя средотва противу всякой Венерической и не Венерической остроты. Не смотря на легкость употребленія оных в, имъют в онъ большую способность выгонять изв твла остроту, чъм всильный средства, и сей легкой образ в льченія произведет в скорый шее дыствіе, нежели каковаго от в тьх в ожидать можно.

Не непристойно, думаю, будеть упомянуть забсь начто о дековтахь или цалительных в напиткахь. Сасвафрасовое и бакаутное дерево могуть

по причинъ смолянистаго и произительнаго их свойства великую принесть пользу; а что касается до других веществв, которыя изв одного только обыктовенія прибавляются, о томъ умолчу, потому что я не могу понять, какая причина побудила ввести их в в в употребленіе. Однакож скажу о толико знаменишой сарсапарилли що, что оная навърно не имъешъ сполько силы, как в равном врное количество простаго ячменя, но не смотоя на то, находишся она въ великомъ уваненія. Я не хочу никаких приводишь примеровь, только опасаюсь, что тьм дидямь, кои испытанія свои надь симь средствомь толико уважали, не доставало при ихв работь хорошей основательности во Врачебной наукъ. Однакож в я не совсъмъ отвергаю употребление оной; ибо сарсапариль и ослиное молоко могуть имвть свою пользу, особливо въ разсуждении ихъ цъны, а частію и по тому, что дають нъкоторое питаніе. Пп

Слъдующее могу я присовъщовать какъ цълительной напитокъ, имъющій пріятный вкусь, и для тъла по крайней мъръ столько же здоровый, какъ и всякой другой.

# цѣлительное пиво.

Возьми ясменю для употребленія на писо прізуготовленнаго и молотаго ясменнаго солоду 1 фунть, сассафрасоваго корня толгенаго полфунта, воды 3 штофа.

Сте варится нъсколько времени въ глинаномъ сосудъ. Потомъ, когда остынетъ и отстоится, жидкость чистая и свътлая сливается, и сохраняется въ бутылкахъ хорото закупаренныхъ.

Сїе пиво можно употреблять как' во время кушанья, так' и во всякое другое время. Оно имъетъ пріятную кислоту, которая однакож въжным раздраженіем сассафраса несравненно лучшим образом в, нежели хмълем в, притупляется.

Довольно сего о внутреннемъ пользовании вообще, при которомъ не нужно дълать много отличностей; о такихъ же, кои при нъкоторыхъ обстоящельствахъ непремънно должны быть дълаемы, упомяну въ послъдстви при пользовании различныхъ степеней.

Въ закожныхъ сыпяхъ кажешся сначала нъкоторое спасительное побужденте натуры старающимся о изгнаніи нечистоты, въ тъль находящейся, на поверхность онаго; а сему побуждению долженствовало бы нъкоторымъ образомъ вспомоществовать. Для сего нужно возбуждать посредствомъ противосу дорожнаго порошка легкое испареніе. Снаружи можно съ великою пользою употребить противу остроты служащій церать, который шолуди, коросту, лишаи, летучій и дикой огонь и ш. д. удобно прегоняеть, потому что всв сін суть только разные роды чесошки, кои единственно исправ. лентемъ соковъ отвращены быть мо-гутъ.

А ежели сыпь не совобмо вышла на поверхность кожи, и церать не можеть дъйствовать непосредственно на самую матерію, то должно употребить вышеобъявленнымь при пользовании шишекь образомЪ прошивовоспалительный или лешучій линименть. Ибо гуммы, фиматы, заднепроходнія шишки и пг. д. сушь между собою равны, и нъкоторымъ образомъ тучнаго свейства, и сухожильнаго ради мѣшка ихъ весьма трудно истребляются; по сей причинъ присовъщоваль бы я навсегда, есшьли шелько можно, и онв неопасное мъсто занимають, изкоренять оныя ножем и зальчивать послъ рану прошиву остроны служащимъ цератомъ. Сей есть наидучшій способь освободиться оть сихъ безстыдныхъ гостей.

Сыпь подобная трухъ, которая панболье на головъ и на лицъ оказывается, должна пользована быть такимъ же образомъ. Самая даже упорчъйшая короста вылъчивается симъ сильнымъ цератомъ. Но естьли чесотка кръпка и власно корою обдернута, то нужно будетъ для облегчентя лъчентя размятчить оную слъдующимъ умываньемъ:

Возьми мыльнаго линимента одну унцію, простой воды 4 унціи, сулемы 10 грановд. Разведя въ водь сулему, примьшай линиментъ.

#### По Лашинъ.

Recipe linimenti saponecei unciam unam; aquae simplicis uncius quatuor; mercurii sublimati corrosivi grana decem. Soluto in aqua mercurio, linimentum adde.

Симъ надлежить тщательно натирать чесотку, от в чего она напухнеть, сдълается мягче и потомъ стелушится; послъ сего будеть и прошиву остроты служащій церать лучшее производить дъйствіе. Естьли чесотка по всему тълу простирается, то нъть ничего полезнье, какъ частое умываніе, особливо объявленнымъ умываніемъ, которое можно вылить въ ванну къ прочей водь, и садиться въ оную, пока нужно будеть, по крайней мъръ разъ въ сунки. Таковый поступокъ купно съ преждепомянутыми средствами удобенъ излъчить самую закоснълую проказу, естьли только она не совсъмъ неизлъчима, и естьли еще не захватила другихъ частей кромъ кожи.

Недуги въ железахъ гораздо труднъе вылъчиваются, понеже оные часто весьма глубоко вкореняются; однакожъ все зависить, какъ я уже часто замъчалъ, отъ уничтожентя яда. И такъ прежде всего совътовалъ бы я со всякою разпухлою железою обходиться точно такъ какъ съ бубономъ, то есть стараться какъ можно оную разбить, только не вгоняя внутръ. А ежели покажется сте неудобнымъ, какъ-то въ нъкоторыхъ случаяхъ бываетъ, гдъ источникъ бользни для наружныхъ

средство очень глубоко находится, особливо во зобообразныхо недугахо, и гдт уже подлинно скопленте гноя ощущается, во такомо случат разумно будето доставить оному выходь. Однакожо надлежито при семь всячески избъгать употреблентя ъдкихо и прижигательныхо средство, како вредныхо и опасныхо, и брать во помощь одино ланцето како средство дъйствительныйшее, скоръйтее и надежнъйшее.

Естьли въ отверзтой ранъ найдутся фистуловные каналы, то должно прилъжно впрыскивать противу остроты служащую инъекцію, и я върно знаю, что такимъ образомъ съ помощію церата многія вобообразныя опухоли, кои прежде неизцълимыми почитались, вылъчивать будуть. Я польвоваль по сему способу много подобныхъ недуговъ, и между прочими одинъ, который много лъть продолжался и неизлъчимымь почтень быль.

Теперь станемь говорить о язвахъ въ роту и въ гортани. Сїи части не льзя пользовать, такъ какъ другія части тъла, приличнымъ состоянію их в образом в, понеже употребляемыя средства легко могуть попасть въ желудокъ. Но по счасипію можно здъсь не шолько надежно прибъгнушь къ противу остроесть, можеть быть, наинадежныйшая изъ всъхъ средствъ, употребляемыхъ досель вь горпанных в язвахь. Самое дурное слъдствіе какое можеть навлечь на себя частое употребление оной, есть слинотечение, которое однакожь посредствомЪ чистительнаго или слабишельных в пилюль легко предупредишь можно. А есшьли при существующей вы тьль лихорадкь употребленъ будетъ противосудорожный порошокъ, то возбужденное ртутью слинотечение будеть уже отвращено мочегонительным в свойством в селишры.

Поелику при язвах в в гортани и в роту дълается обыкновенно сильное притечен клейкой мокроты, которая не только спостъществует гнилости язв , но заражает и здоровыя части, и слъдовательно должно часто оную обмывать: то совътую для сего употреблен слъдующее полосканье.

## ТНИЛОСТИ СОПРОТИВЛЯЮЩЕЕСЯ ПОЛОСКАНЬЕ.

Возьми самаго хорошаго уксусу, розовой воды, каждаго по 4 унцін; переспиценной селитры, квасцово, каждаго доб драхмы; меду 6 унцій, сулемы 5 граново.

Разведя сулему во розовой водь, смьшай все вмысть.

#### GARGARISMA ANTISEPTICUM.

Recipe aceti optimi, aquae rosarum singulorum uncias quatuor'; nitri purificati aluminis, singulorum drachmas duas; melles sex uzciam, mercurii sublimati corrosivi grana quinque. Soluto mercurio in aqua rosarum misceantur omnia.

Сте полосканье весьма пригодно, не только вы Венерическихы, но и вы другихы даже наизлосвойственный шихы гортанныхы повреждентяхы. Египетской меды почитаю я за ничто; мыдь есть всегда не надежный металь, особливо когда опасатыся должно, чтобы не вошла оная вы самое тыло; да и врачевство можеты легко обойтись безы оной.

Выросты и язвы в Шнейлеровой плевь заслуживають равнымы образомы трательное вамъчание. Инфекція есть вы оныхы, пока еще оную употребить можно, приличныйшее и дыствительныйшее средство; а естьли будеты существовать заваль, то должно прочистить для оной мысто. Сначала и вы легкихы случаяхы можно употребить сы пользою слыдующій порошокы вмысто обыкновеннаго нюхальнаго табаку.

# противу остроты служащий нюхальной порошокъ

Возьми лавендулевых цавтово одну унцію, фіялковаго корня полунціи, сладкой ртупи 6 разб приподнятой и приготовленной два скрупула.

Лавендула и фіялковой корень претворяющся особенно ед мёлкой порощоко, потомо все смёшивается.

#### По Лашинъ.

Recipe florum lavendu'ae unciam unam, radicis iridis florentinae semunciam, mercurii dulcis sexies sublimati et praeparati scrupulos duos.

In pulverem subtilem redigantur separatim lavendula et iris, deinde misceantur omnia.

Сей нюхальный порошоко выгоняето остроту изо развых в впадино, во коихо она накопляется, а посредствомо фіялковымо корнемо и давендулою причиненнаго чиханія открывается входо для ртути. Въ заушныхъ опухоляхъ есть равномърно инъекцїя наилучшее средство; от опухоли же въ вискахъ можно употреблять съ хорошимъ успъхомъ холодительной линиментъ.

Для больных глазв надлежить употреблять наружныя средства; для глазных выковы есть церать напориличный на на самое глазное яблоко; а инвекція как вы мылка ни была, все имы вы себы нычно песчаное или песковатое, то совытую я слыдующее.

## общая глазная вода.

Возьми воды трезв стеклянной шлемв перегнатой тетыре унціи; сулемы одинд гранд. Смъщай и дай 24 гаса устояться, потомв слей оставя осадку.

#### По Лашинъ.

Recipe aquae ex alembico virreo destillatae uncias quatuor; mercurii corrosivi sublimuti granum unicum. Misce, stent per horas 24 et esfunde, faecibus relistis. Естьли пустищь временно одну или двѣ капли сей воды вѣ глазъ, то истребить оная всѣ пятна, воспаленія и выросты наружной роговой плевы. Она исправить даже, по причинѣ пронзительнаго ел свойства, и внутреннія погрѣшности, не повреждая ни мало силы зрѣнія.

Скироватые желваки суть весьма упорны, однакожъ могуть при помощи терпънія, хорошаго тълосложенія и дізты, посредсивомъ противовоспалительного линимента гораздо чаще изавчены бышь, нежели какъ воображають. Самый даже открытый ракв, напужаснъйшая и влосвойственнъйшая изв встхв язвв, преодол ввается, естьли не слишком в вокругь себя развыль; противу остроты служащимо цератомо, когда только не будеть смъщень сь другими веществами, которыя вредныя сабденняя причинимы могуть. По крайней мъръ узналь я изв опыта и благополучнаго успъха, что сей церать есть наилучиее остротъ Часть III.

сопротивляющееся средство, почему и могу совътовать употреблять оный во всъхъ родахъ язвъ.

Теперь приступаем вы кв пользованію болящих в костей. Сія работа есть претрудний вая; но она по тому только такова, что скоро соскучиваются отв продолжительности легкаго образа личенія, каковаго сей случай требуеть.

Разсматривая возрощение костныхъ бользней, видимъ мы, что недугъ шихо и по малу усиливается, и что соединенная съ онымъ боль тъмъ жесточае, чъмъ сильнъе борьба ядовитой матеріи съ здоровою частью бываеть. А понеже различныя дъйспвія могуть имъть одинакую причину, то и довольно для встхв одного средства. И такъ для костных выростовь (exokoles), наростовь (hyperostoses) и т. д. совъщую я, купно съ преждеописаннымъ внутреннимъ лъчениемъ, употреблять снаружи только противовоспалительный или летучій линименть, такь какь

вь гуммахь, фимахь и т. п. Сей при хорошей діэть сдълаеть вы надлежащее время все то, чего только оть лькарства ожидать можно. Естьли бы слинопроизведзніе было дьйствительно, то долженствовало бы оное наидьйствительныйшимь оказаться вы бользняхы костей. Однако единогласно утверждають, что оное здъсь совсьмы безполезно, и что увеличиваеть только недугь, такь какь оный по настоящему и во всъхь другихь важныхь бользняхь тожь самое производить.

Въ разсуждени загнившихъ костей и ихъ отщепления имъю я напомнить только то, что чъмъ легче суть избранныя средства, тъмъ лучши приносять онъ успъхъ; скобление костей причиняло часто болъе вреда, нежели приносило пользы. Тщетно стараются истребить загнившую часть, пока натура не покроетъ здоровую часть кости надкостною плевою; отщепки мало по малу отдълятся и отщепятся, и

наконець сами собою оппадушь. А естьли новообразованная надкоспіная плева слишком в раздражена будетв, то снова воспаляется, и опидепленіе продолжается до тько порь, пока весь члень будеть вы опасности отдвлишься, и въ самомъ двлв часто отпадаеть, чтобы другимь способомъ отвратить можно было. Завсь должень я равномърно замътить, чию Арцъева мазь или желшой базиликонъ, не смотоя на то, что издавна употребляемы были, суть неприличныя средства. Онъ раздражають остроту, не поправляя оной; все, что ни сказано о разбивательной силь оныхв, есть только худо уразумънное поняшіе, и весьма поступять хорошо, естьли совстмъ не будуть употреблять ихь въ язвахъ. Противу остроты служащій церато подасть всякое возможное вспоможение, не имъя нужды въ прибавлении другаго средства. Однакожъ бываеть иногда при отщепленіи нужно доставить матеріи вы-

ходь, для чего и можно сдълашь отверзтіе; однако надлежьть преж де от дълить тщательно загнившую часть, дабы можно было оную немедленно вынушь и совершишь операцію, сколько можно, съ меньшимъ воспаленіемъ. Ибо слишкомъ усиленное воспаление можеть воспрепятствовать нажному костотворенію здоровой кости и привесть оное въ безпорядокъ, и уничтожить тъмъ прежнее авченіе, выключая сильную боль, какую причиняеть оное больному. И такъ изъ сего ясно слъдуеть, что при таковомь разпроспраненіи надлежить употреблять авкарской ножичекъ (бистури).

Вътренная ость есть страшный и жестокою болью сопровождаемый недугь; понеже гноенте мозга и кости старается пробить себъ путь наружу, а сверьхъ того какъ больнь, такъ и лъкарства дъйствують на разстроенную кость весьма медлительно. Такъ какъ сей жестокой недугъ достигаетъ мало по

малу до совершенной степени, возрастаеть купно и воспаление мягких в частей.

Ежели по сей или по другой какой причинъ произойдеть вожженте, такь, что омертвънтя опасаться должно будеть, или оное уже вь самомь дъль существуеть: то можно почесть слъдующую примочку за наидъйствительнъйшее средство для остановлентя оть омертвънтя происходящей гнилости.

## примочка противу гнилости.

Возьми виннаго слирта по 4 унціи, свинцоваго извлетенія одну унцію, камфоры двѣ дражмы, сулемы одинд скрупулд. Разведи камфору и сулему въ слиртѣ, а извлетеніе въ уксусѣ, лотомъ смѣшай мало по малу.

### По Лашинъ.

Recipe spiritus vinosi, aceti, singulorum uncias quatuor, extracti saturni unciam unam, camphorae drachmas duas, mercurii corrosivi sublimati scrupulum unum. Solve camphorum et mercurium in spiritu, extractum autem in aceto, deinde gradatim misce.

Сею примочкою намачиваются компрессы и перевязки, также и антоноогненныя части оною, смотря по обстоятельствамь, примачиваются. Естьли существуеть омертвыйе, то надлежить сдылать вы ономы до здороваго мяса насычене, и продолжать примачиване купно сы прочими для сего пригодными средствами, и тогда возымыеть лычене блягополучный ходы, естьли только больной не совсымы уже изнурень. Язву должно пользовать по вышелисанному.

Костные наросты и членосоставныя срощенія бывають иногда очень безчувственны, понеже происходять оть испорченной членосоставной влаги. Почему и требують иногда, кромь остроту поправляющихь средствь, раздраженія, дабы возбудить двиствіе плотныхь частей, особливо естьли существуеть купно параличь и бълая опухоль съ оными соединенна. Въ таковыхъ случаяхъ окажеть слъдующая катаплазма хорошее дъйствіе.

## ПРОТИВОПАРАЛИЧНАЯ КАТА-ПЛАЗМА.

Возьми крѣну полфунта, летусаго линимента со ртутью одну унцїю. Изрѣзавши и истолокши крѣнд смѣшай сд линиментомд. Прикладывать два раза вд день.

Сте средство можно также употреблять вы спинных бользняхы и костомясистыхы наростахы (ofteofarcofis); равнымы образомы и вы параличы класть по требовантю на составы.

Естьли составь начнеть гноиться, то должно нарывь непремынно вскрыть и матерію выпустить. Однако таковый случай можеть и наискусныйтему лыкарю надылать много труда; легкія же средства суть и здысь наилучтія.

Я не буду дол е мъшкать при пользовани недуговь вы костяхь. Они суть какь видомь, такь и положениемь, весьма многоразличны. Что можно бы было сказать здъсь еще болье о семь, то разумъли бы одни опытные лъкари; а для сихь вышепомянутых замъчаний для наставления вы повстръчающихся случалхь довольно.

Теперь приспічним д опять кв употребленію внутренних средствь. Легко представить себъ можно, что во всъхъ помянутыхъ недугахъ бываеть иногда боль преужасная, и что несчастному больному великое сдълаешь благодъяніе, естьли доставишь ему во семь жестокомь состояніи съ надежностью нъкоторое облегчение. Дабы можно было хорошенько судишь о ночной Венерической боли въ рукахъ, ногахъ, черепъ и ш. д. причиняемой выросшами, въщреною осшью или гнилью въ костяхь: то представимь себь оную наподобіе зубной боли, которая, Часть Ш. Cc

естьли отв порчи зуба происходить, много имбеть подобнаго съ сими недугами. Но вопервых в надлежинъ, какЪ я уже сказаль, употреблять болеутолительныя средства, даже и въ самой жестокой боли, съ велижею осторожностію; а вовторыхъ надлежить учреждать оныя такь, чтобь онв кромв облегчения, достявляемаго оными нервной системв, сопрошивлялись купно и острошъ, оную боль причиняющей; а сверьх в того содержали бы нервы во обыкновенной ихъ упругости. Въ слъдствёе сего основанія могу предложить слъдующее болеу толи тельное, какъ надежнъйшее и наилучшее въ подобныхъ случаяхъ.

## БОЛЕУТОЛИТЕЛЬНЫЯ КАПЛИ.

Возьми сопнаго зелья одну унцію, двоснаго виннаго спирту, купоросной нафты, каждаго пять унцій; существеннаго масла, перичной мяты одну дражму, сулемы десять грановь.

Разтворя сонное зелие въ спирть, процеды, потомы приблев прочіл морошенько смышнеся. Пріемь есть 10 или 12 капель.

#### ESSENTIA ANODINA.

Recipe opii unciam unam, spiritus vinost rectificati, actheris vitrioli, singulorum uncias quinque; olei essentialis menthae piperitidis drachmam unam; mercurit correstvi sublimati grana decem.

Opio in spiritu soluto cola deinde adde caetera probe miscens. Dosis sint guttae

decem aut duodecim.

Сти болеушолишельныя капли можно давать вы случать нужды, купно сы прошивовоспалишельными порошками, или прошиву острошы служащею шинктурою, или по обстоятельствамы и сы другими лъкарствами.

Я не буду упоминать здъсь о различных и благопріятных припадкахь, каковые обыкновенно приносить купно съ собою Венерической ядь, и которые должны воспослъдовать оть разстроенной и вь безпорядокъ приведенной экономіи животной; равнымь образомь не буду говорить о вспомогательныхъ противу оныхъ средствахъ, понеже разумный практикъ можеть уже изъ предъидущаго узнать мое о семъ мнъніе, и учинить по тому разумное сужденіе. Я присовокуплю вдъсь нъкоторыя только примъчанія на нъкоторые трудные случаи, которыя могуть служить для отвращенія грубыхъ во Врачебномъ искусствъ погрышностей, коими нъсколько больныхъ пожертвовано.

У больных венерическою или другою бользый страждущих в, приключается иногда внезапно воспалительное мочеваго пувыря сожатие; а особливо, когда давно существующій ядв проникнет в в сжимательную мочеваго пузыря мышку. В в сем случа в употребляют весьма часто катетер , употребление коего есть не только весьма трудно, но по причин сожатія часто и совсть не возможно; а естьли в в на-

правленіи онаго упорствовать будушь, то не только умножать сожатіе и воспаленіе, но могуть чрезь то причинить и самую смерть. ВЪ семь случав совъщую я особливое средсшво, а именно: сшановишь ноги въ студеную воду. Я знаю, что сте средство въ отчаянныхъ сего рода случаях влагоуспышное являло дъйствие, когда всъ другия употребляемы были тшетно; сте есть надежнайшее средситьо во всах в воспалишельных в запорах в мочи. Промывательныя изв студеней воды, св небольшимъ количествомъ селитры, суть равномърно пригодны; только не должно оставлять внутренняго упопребленія противосудорожных в порошковь, и прошиву остроль служащей интекціи гибкимъ катетеромъ, по испражнении прежде мочи. Опасеніе, что можно въ подобныхъ задержаніяхь мочи, становленіемь ногъ въ студеную воду воспренятствовать обращению крови, есть не основащельно; напрошивь того есть

оно сильное противосудорожное, послъ коего слъдуетъ обыкновенно легкое испаренїе.

Ближайшее примвчание заслуживаешь язва въ шакъ. Сей недугъ есить чрезвычайной важности: онъ причиняется весьма часто безвременным в употреблентем в катетера, который не надлежало бы никогда употреблять въ задержаніяхъ мочи, а только въ настоящихъ, отъ камня происходящихъ запорахъ. Но отъ чего бы оный ни произошель, постараемся изыскать потребное въ крайнемъ случав вспомогательное средство. О наилучшемъ онаго пользобаніи, пока еще шолько воспаленіе существуеть, говориль я уже прежде; но при ощущенти дъйсшвишельнаго машерін зыбленія есшь весьма разумно учинить отверзтіе. Однакожъ, по наставлению нъкоторых Писателей, чтобь запустить прежде въ шаковыхъ случаяхъ кашетерь, не только умножается безь всякой нужды боль, но препят-

ствуеть и самой операціи; а равнымь образомь и засовывать вь проходъ палецъ ни къ чему не нужно. Надлежить заставить больнаго стать на постель на кольнки, и пригнушь голову сколько можно далье промежду кольнокь. Вь семь положении удобно будешь разсмошръшь части надлежащимъ образомъ, и во время операціи ничню не можеть возпренянствовать. Естьли потребуеть нужда, тот можно заставить кого нибудь держать больнаго въ семъ положении. Потомъ надлежить вскрыть язву ландетомь, но не глубже, какъ сколько надобно. А чтобь надлежало вскрывать всв полости, то сте есть несправедливое мивніе, котпорое многих учинило несчастными. Какъ скоро язва вскрыта, то должно всв полости и впадины оной легкимъ, гибкимъ и гладкою головкою снабденнымъ шупомъ осторожно изслъдовашь, и впрыскивашь въ каждую изь оныхь, какь можно осторожные,

Cc 4

противу остроны служащую инвекцію. Язва перевязывается противу остроны служащим вератом ; а буде существуєть воспаленіе, то можно употребить вышеписанную припарку. Ежели время и обстоятельства дозволять, то суть промывательныя прежде и послъ операціи наставляемыя весьма пригодны; но ни подъ каким видом в нейдуть сильно дъйствующія проносныя, или другій раздражительныя средства.

Вскрывъ такимъ образомъ мочевый стволъ, надлежить язву, естьли дозволить вожжене, по возможности очистить. А когда начнется оная затягиваться, то должно употреблять свъчка, дабы сохранить отверзте сколько можно чистымъ и отъ мясистыхъ выростовъ свободнымъ. Сей образъ лъченя удался мнъ въ двухъ отчаянныхъ случаяхъ, и бельные совертенно выздо ровъли. У одного изъ нихъ проходила нъсколько времени сквозь язву моча такъ, что сначала сомнъвался о совершенномъ выздоровлении его, которое однакожъ благополучно воснослъдовало.

Другая гораздо непріяшнъйшая, и сама по себъ весьма ужасная операція, есть отняшіе мужескаго члена. Естьми означенныя теперь средства заблаговременно употреблены будуть, то будеть сте печальное предпріятіе не нужно. Но ежели существуеть уже омертвыйе, и оное печурисныя твла проникло; естьли воспаление вмѣсто цвътущаго и напряженнаго вида приняло уже на себя видь шемной, черноватой и помертвелой; естьли кожа въ гниломъ уже находится состояни и нестерпимое от себя издаеть зловоніе: то должень Врачь, призванный къ таковому несчасиному больному, не медля ни мало, отръвать поврежденный члень. Завязокь, прижигательных в орудій, для остановленія крови и т. д. должно въ семь случав всячески избъгать какъ

средство неприличныхо и вредныхо, и я не могу понять, како и одино при таковомо жестокомо поступко мого исцылиться.

Наидучийй способь есть, чтобъ имъть въ готовности для перевязки шелковинами снабданныя иглы, сухую корпію, посыпанную каломелемь (\*) и вышепомянушую, остротъ прошивящуюся примочку. Приготовя надлежащимъ образомъ мъсто больному для лежанія, надлежить отдвлить широкимь ножичкомь помершетлую часть от части здоровой, и захвашишь иглами объ боевыя жилы; пошомъ должно наложишь каломе. лемь посыпанную корпію, а сверьхь оной помянушою примочкою намоченные компрессы, и оставить больнаго для успокоенія. По временамЪ надлежинъ давань пронивосудоро-

<sup>(\*)</sup> Каломсль, смъщанный съ прухмаломъ и насыпанный на корпію, еснь, можеть быть, наилучшее раноцълительное средство для опръзаннаго члена, и заслуживаеть вниманія Врачей.

жные порошки и болеутолительныя капли, повщоряя наставливаніе промывательных в. Многіе совытують употреблять вы такомы случав Перуанскую корку; но по моему мнвнію можеть больной удобно обойтись безы оной при наблюденіи помянутых правиль.

Наконедь скажу еще нъчто объ операціи отнимать скирроватое или помершевлое янчко. Ле Дранв описываеть спо операцію слишкомь обстоящельно, и методъ его запутываеть только по моему мивнію и дълаеть оную опасною. Завязки, предписанныя имъ для съменныхъ боевых в жиль, сушь не шолько безполезны, но и причиняють вожженїе. Входь съменных в артерій у начальственной боевой жилы есть очень тесень, такь что кровь весьма медленно въ оныя вшекаешь и обращается, и въ такомъ случав мало отличаются онь оть жиль крововозвращных в; почему и страхв его, что больной можеть до смерти изойти кровью, вовсе неоснователень. Равнымь образомь суть и распоряжения его неосновательны, посредствомы коихы хочеть оны воспрепятствовать, чтобы разлученные съменные сосуды не вошли обратно вы брюхо; ибо сте не только произойдеть, но и должно произойти, когда больной будеты выльчень. Понеже сти части учинятся неупотребительными, то оны сами собою сморщатся, в со временемы совсымы изчезнуть, какы вто при вскрынти кастратовы примыченс.

Операція можеть сь меньшим в трудомь и сь большею достовърностью
со стороны Оператора, и сь меньшею
болью и большею безопасностію со
стороны больнаго учинена быть слъдующимь образомь: больнаго должно
положить на спину, и приказавь
ему раскорячить ноги, вельть держать его вы семь положеній искуснымь помощникамь; нотомь должно разръзать ножичкомь шулята
вдоль больнаго яичка, такь чтобь
одинь разрызь быль для изьятія

янчка достаточень; послъ сего должно разширить окруженные брющиною съменные сосуды, къ коимъ укръплено янчко, и отръзать оные какъ можно ближе къ брюху; по учинени сего перевязывается рана помянутымъ образомъ каломелемъ посыпанною корпіею, и компрессами, объявленною примочкою намоченными, для отвращения воспаления. Такимъ образомъ при надлежащей рачительности лъчение въ скоромъ времени совершено будетъ.

Опасеніе, что можеть вы животь изы оставщихся съменных сосудовы произойти кровотеченіе или накопленіе съмени, есть не основательно; ибо естьли разсудимы, что оные окружены брютиною, и истеченіе должно непремыно простираться до учиненнаго разсыченія: то не можеть оное никаких важжных имыть слыдствій. Сверьхы того, понеже разлученные сыменные сосуды міновенно смыкаются, и оть внышняго воздуха и всякаго раздра-

женія укрышы сушь, що часим удобно между собою соединяющся, а истекшее всасывается, особливо въ хорошемъ шълосложения, сосъдственными сукровичными сосудами. (те доказывается простымь въ разныхъ земаяхь употребительнымь способомъ класть животныхъ (\*), такъ какъ и евнухотвореніемъ у Восточных в народовь, гдв двлають стю операцію съ величайшею легкостію и надежноснію, вмісто того, что она навсегда сопряжена бываеть съ величаї шею въ разсужденій жизни опасностію, естьли учинена будеть съ такъ многими ненужными обстоятельствами по совету накоторых в Писашелей.

Но сте умозрънте могу я одобрить по двумъ въ опасныхъ слу-

<sup>(\*)</sup> Чтобъ удостовъринься въ недеживитихъ способахъ дълать каспрапло, дълалъ я сило разными способами умолодыхъ сорововъ, и песлъ в крывалъ ихъ, дабы гепытать особенное дъйствие каждато способа.

чавх в учиненным в опытамв. В в первом случав было поидавленное яйцо, при чем в приближающееся омершавней угрожало прекращением в жизни, в другом в скирроващое яйцо преужасной величины у одного Негра; в обоих в случаях в следоваль я вышепомянутому способу, и был в столько счастлив в что оба больные без в наимальйшаго опаснаго припадка достигли в короткое время прежняго их в здравия и веселости.

Прежде нежели кончу, почитаю я за нужное сказать еще нвито о внутренномы моемы пользованія. Не смотря на легкія лькарства, которыя совытовалы я какы наилучшее и надежныйшее средство для изгнанія яда изы шыла; и не взирая на даваемые для сего намыренія малые пріємы ртуши, бывають однакожы сложенія столько различны, и столько происходить перемынь вы одномы и томы же тьлы, что должно всегда принимать обстоятельства вы

разсужденіе; почему и дійствія безконечно различны бывають. Ртуть въ какомъ бы видъ дана ни была, поражаеть иногда и вь мальйшемь количествь слиноточивыя железы, особливо естьли другія отдъленія и испражненія кажушся бышь осшановленными. А поелику совъщую я всегда отвращать пришечение влагь кЪ слиннымъ железамЪ, понеже точно увърень, что оныя препятствують хорошему ошь ршуши ожидаемому двиствію: то почитаю всегда разумным в прошивополагать произвольнымъ дъйствіямъ другія испражненія, какв - то: слабительныя, мочегонишельныя, пошогонишельныя и т. д., чрезь которыя можешь тьло опять въ порядокъ приведено быть; а разумный практикь должень уже знать, съ какою осторожностію оныя употреблять надлежить.

Такожде должень я замъщить, что мнъніе яко бы ртуть было единственно противувенерическое средство. Есть изъ всъхъ новъйшихъ

врачебных в наших в предразсудков в явнымь образомь одинь изв наигрубыйшихь. Опышь показуеть намь, что остроив противящаяся сила оной простирается на всъ бользни человъческаго шъла, кошорыя ошъ остроты происходять. Я сказываль вь разныхь мъсшахь сей книги, какъ и ежедневный опыть подтверждаеть, что всякая от Венерического яда рожденная бользнь, также и отв разных другах , ош Венерических в существенно различных в причинь, какь снаружи, такь и внутри, возродиться можеть. И такъ благоразумному Врачу надлежитъ оставить таковый предразсудокв, и располагать авчение свое по Натурь, дъйствію, положенію и виду бользни, а не всегда по дъйствующей причинъ оной; потому что не смотря на различие оных в, могуть дыйспівія одинаковы бышь.

Вь слъдствие сего разсмотръния и строжайших в наблюдений, есть ртуть и извоной составы, как в Часть III. Т т

всеобщее, остроть противящееся средство, безпрекословно наипревосходнъйшее лъкарство, какое имъемъ мы во всемь врачебномь веществословій, не только въ Венерическихъ, но и во встх в других в бользняхв, коимъ шъло человъческое подвержено бываеть, безь различия ихв наименованія, их в причины, дъйствія, пораженной части, пола или лътъ больнаго. Но какъ непреступаемый во врачествь законь всегда надлежиръ памящовать, что наилучшее и полезнъйшее лъкарство можеть. отъ неразумнаго употребленія содълашься ядомв.

Въ разсуждении любострастных вользней царствовали от времени до времени наивреднъйште предразсудки. Каждое стольте имъло свои особенныя модныя заблуждентя, компорыя подобно непроницаемым воблакам всную истинну сокрывали. Въ настоящемъ времени вкрадывается, кажется, предразсудокъ, будто бы гоноррея по Натуръ своей

отв любострастной бользни разнствуетв, и не имъеть вы себъ никакой заразительной злосвойственности; но которая однакожь оказывается вы шанкерахы и другихы недугахы (\*).

Я не буду далбе извясняться о нельпости сего заблужденія. Но понеже оное есть такого рода, что можеть многихь вовлечь вь пагубу: то увъщеваю всякаго мыслящаго человька, желающаго сохранить здравіе свое, беречься оть таковаго обольстительнаго предразсудка. Статься можеть, что застарьлая вкорения паковою быть можеть, однакожь не смотря Т т

<sup>(\*)</sup> Естьлибъ утверждали мивите сте незначущтя ссобы, то приписалъ бы сте невъжеству ихъ, и не удостоилъ бы дальнаго внимантя. Но весьма удивительно то, что люди знаменитые и въ искусствъ извъстные могутъ толико заблудиться и утверждать еамо по себъ столь вреднос и смъха достойное мивнте.

на ея льготу, можеть оная рано или поздно привесть больнаго въ неожидаемую разстройку, и самую даже жизнь его подвергнуть опасности; но недавно произшедшая гоноррея у людей раздражительныхъ испровергнеть, по моему мнънію, при мальйшемь даже разсужденіи, всякой предразсудокь, который слишкомь не разумень, чтобь заслужить возраженіе.


Ядь Венерической можеть, подобно огню, разнымь образомы возгорыться и разныя поразить части;
и вы семь то состоить разнообразность бользней. Пока еще хотя
мальйшая искра онаго останется
вы тыль, то и все тылесное строеніе оты повсемьстной заразы не
безопасно. Все вспоможеніе, каковаго требуеть здысь Натура оты
искусства, состоить вы томы,
чтобы затушать сей разрушительный огонь, гды только кы оному
приступить можно; вспомоществовать благимы усиліямы экономіи

живошной, и нѣжною разсудка рукою привесть натуру цаки на прямый ея путь, от в котораго она по причинѣ от в остроты произшедших в безпорядков в уклонилась.

Слъдовавши въ семъ пользованіи предписанію здраваго разсудка, опыта и искренняго сердца, надъксь върно имъть въ послъднихъ минутахъ моихъ по крайней мъръ то удовольствіе, что я, какъ върный человъческаго общества членъ, для показанія истинны должность свою въ семъ случаъ по крайнему старанію моему исполнилъ.

Конецъ третьей и последней Части.







# изъяснение перваго рисунка.

# ФИГУРА ПЕРВАЯ

- Предстивляето мужескія могевыя и дъпородныя орудія со передней стороны; при темб по возможности наблюдено естественное положеніе всякой гасти.
- А. Низходящая вътвь большой боевой жилы.
- В. Раздъление оной вы томы мъстъ, гдъ отсылаеть она нъсколько вътывей вы нижния конечности.
- С. Объ почки: правая изъ нихъ находишся нъсколько пониже лъвой.
- D. Восходящая вътывы пустой жилы.
- Е. Выданвающія боевыя и кровавыя жилы.
- F. Съменные, боевые и кровавые сосуды, которые имъють начало свое отв начальственной боевой и пустой жилы и отв выдаива-

- ющих в сосудовь, и перебъгая другь чрезь друга, впадають вы ядра.
- G. Мочевые протоки, нивходящіе от в почекь вы мочевый пузырь.
- Н. Относящіе сосуды, которые съмя из в янчек в в съменныя хранилища приносять.
- I. Ядра или яички.
- К. Мочевый пузырь.
- L. Щейка мочеваго пувыря, въ которой находится сжимательная мышка, препятствующая непроизвольному изтечению мочи.
- М. Подвемлющая мужескій члень
- N. О. Прочія кв подвятію онаго служащія части.
- Р. Мужескій двтородный удв.
- Q. Плъшка или головка онаго.
- R. Паховыя железы.
- S. Часть заднепроходной кишки.

# ФИГУРА ВТОРАЯ

Представляето разскиенную поску.

- А. Железистое существо оной.
- В. Выдаивающая боевая жила.

- С. Выдаивающая кровавая жила.
- D. Тазь, въ которомь отделенная моча собирается.
- Е. Мочевый протокъ, относящій мо-чу въ мочевый пузырь.

# ФИГУРА ТРЕТЬЯ

Изображает в шулята и шулятный мышокд.

- А. Ядра.
- В. Приносящіе и относящіе съменные сосуды.
- С. Такъ.
- D. Шулятный мѣшокЪ.
- Е. Преграда онаго.

# ФИГУРА ЧЕТВЕРТАЯ

Показует дот локровов освобожден-

- А. Железистое существо онаго.
- В. Бълочная оболочка.
- С. Съменные сосуды.
- D. Ошносящій сосудь.

· Yacma III.

# фигура пятая

Изображаето янгко, наполненное ртупью.

- А. Часть янчка съ бълочною плевою.
- В. Часть янчка безь оной.
- С. Ставленная часть онаго.
- D. Съменные сосуды, окруженные клъщчетою плевою.
- Е. Ошносящій съменный сосудь.
- F. Между онымъ и съменными сосудами находящаяся клъщчещая плева.
- G. Яичный барышокЪ.
- Н. Длинивишая часть янчка.
- І. Крашчайшая часть онаго.
- К. Часть, гдъ брюшина отделяется.

# ИЗЪЯСНЕНИЕ ВТОРАГО РИСУНКА.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ПЕРВОЕ

Представляето мужескій дѣтородный удо со стороны во натуральномо его лоложеній, стобо видѣть кривизну мотеваго ствола како при возстаній слена, тако и при ослабѣній онаго.

- А. Мочевый пузырь.
- В. Часть заднепроходной кишки.
- С. Отверстве сной.
- D. Шейка мочеваго пузыря.
- Е. Мочевый каналь; промежду О и
   С. находящаяся часть называется Такомь.
- F. Мъсто, гдъ соединяются лобковыя кости.
- G. Мъсто подвемлющих в мышек в и т. д.
- Н. Лобковая часть.
- L. Чрево или брюхо.
- М. Мужескій члень вы напряженномы состояніи.

- N. Павшка или головка.
- О. Мужескій члень вы слабомы со-
- Р. Шулятный мъшекъ.
- Q. Яичко.
- R. Съменные сосуды.
- 5 Относящій сосудь.
- Т. Мочевый протокъ.
- U. Съменное хранилище.

#### изображение второе

Представляето ту тасть люгеваго ствола, которая ближе ко заднепроходной кишкь.

- А. Часть мочевато пузыря.
- В. Мочевые протоки.
- С. Относящие съменные сосуды.
- D. Съменныя хранилища.
- Е. Съменная железа.
- F. Часть мочеваго ствола.
- G. Кровавые сосуды съменных в хранилищъ.
- Н. Мокрошныя железы.
- Двъ не большія железки, лежащія близь съменной железы.

- К. Ускорительная мышка, въ срединъ разсъченною и растянутою представленная.
- L. Корень мочеваго ствола надутый и отб ускорительных в мышек в обнаженный.
- М. Трешья пара дътороднаго уда мышекъ.
- N. Подвемлющія мышки онаго.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТІЕ

Изображаеть вскрытое, ото тасти петуристое могеваго ствола твло и плъшку.

- А. Печуристое тъло.
- В. Внушренная сторона мочеваго ствола.
- С. Впадина, печуристымъ тъломъ плъшки образуемая, къ которому печуристыя тъла дътороднаго уда прилъпляются.
- D. Верьхняя часть плышки.
- Е. Нижняя часть оной.
- F. Уздочка дътородоудная.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Показываето паховыя железы и по-

- А. Железы.
- В. Янчко.
- С. Портнячья мышка.
- D. Прямая бедренная M.
- Е. Трехголовая М.

# изъяснение третьяго рисунка.

#### изображение первое

- Представляеть мужескій тлень св верьху, и такь, какь оный вы напряженномы состояній нахо-
- А. Часть сжимательной задняго прохода мышки.
- В. Расшянушая поперешная мышка.
- С. Дътородоудныя боевыя жилы.

- Разпростерныя подремлющія мышки.
- Е. Кровавая дътороднаго уда жила.
- F. Печуристыя тьла онаго.
- G Отдъленная от онаго кожа.
- G. Сукровичные сосуды.
- Н. Чувственныя дътороднаго уда жилы.
- Передняя кожица или крайняя плошь.

#### изображение второе.

- А. Часть дътороднаго уда-
- В. Крайняя плоть.
- С. Головка или плъшка.
- D. Вънецъ, или позади головки находящіяся железы.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТІЕ

Показуеть мужескій тлень снизу.

- А. Часть сжимательной задняго про-
- В. Поперешныя дътор. уда мышки.
- С. Подвемлющія мышки онаго.

У у 4

- Печуристыя тъла мужескаго члена.
- Е. Печуристое тьло мочеваго ствола.
- F. Уздочка дътороднаго уда.
- G. Павшка.
- Н. Боевыя жилы.
- I. Нервы.
- К. Корень дѣтороднаго удя, ускорительною мышкою покрытый.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Представляето переднюю касть мотевого ствола разсытенною, для показанія отдыляющихо каналово мокротныхо железо, и отверстій мокевыхо протоково.

- А. Часть мочеваго пузыря.
- В. Отверстія мочевых в протоков в.
- С. Пътушья головка, купно съ отверствемъ изпражняющаго канала съменной железы.
- D. Отверстія мокротных в железь.
- Е. Части съменных в сосудовъ.
- F. Относящие съменные сосуды.
- G. Мокротныя железы.
- Н. Корень дътороднаго уда.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ПЯТОЕ

Показуето сѣменныя хранилища и относящёе сѣменные сосуды надутыми.

- А. Внутреннія клітки сіменных хранилищь.
- В. Наружный ихв видв.
- С. Неразсъченный относящій сосудь.
- Отверстве, проходящее сквозь пътушью головку.
- Е. Разсъченный относящій сосудь.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ШЕСТОЕ

Представляето продолговатое разсъгение дътороднаго уда, ото тего предстивляется зрънию внутренное состояние петуристыхо тъло и преграда оныхо.

- А. Печуристыя тьла.
- В. Преграда оныхъ.
- С. Покровъ.
- D. Ноздреватая плъшка.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ СЕДЬМОЕ

Изображаето попересное разсѣсение дѣтороднаго уда.

- А. Отверстве кровововвратной жилы.
- В. Мочевый стволь.
- С. Печуристыя тъла.
- D. Въшьви боевых b жил b.
- Е. Покровъ печуристыхъ тълъ.
- F. Общій покровъ.

# ИЗЪЯСНЕНІЕ ЧЕТВЕРТАГО РИСУНКА.

#### изображение первое

Представляето родотворныя орудія со стороны

- А. Мочевый пузырь.
- В. Маточное влагалище.
- С. Матка.
- D. Часть маточных b трубъ.
- Е. Часть заднепроходной кишки.
- F. Венерина гора.

К. G. N. Срамота.

К. N. Большая щель.

G. Тайныя губы.

Н. Нимфы.

І. Женскій удв.

К. Крайняя плоть онаго.

L. Мочевый стволь.

М. Отверстве маточнаго влагалища.

N. Takb.

О. Отверстве заднепроходной кишки.

Р. Мочевые протоки.

Q Миртообразные сосочки.

#### изображение второе

Показуеть матку и матогное вла-

А. Матка.

В. Внушренная сторона маточнаго влагалища купно съ морщинами и опіверзающимися въ оныхъ железами.

С. Маточное рыльцо.

D. Отверстве мочеваго канала.

Е. Миртообразные сосочки.

Е. Крайная плошь женскаго уда.

- F. Женскій дътородный удь.
- G. Вившняя, сторона маточнаго влагалища.
- Н. Маточныя трубы.
- І. Яичникъ съ его покровомъ.
- К. Яичникъ безъ покрова.
- L. Съменные сосуды.
- М. Изсъченная часть маточной трубы.
- N. Широкїя маточныя связки, кои подлинно не что иное суть, какъ продолжение брюшины.
- О. Основание машки.
- Р. Кругаыя связки.
- Q Внашніе оныха концы, кои ка лобковыма костяма украпляют ся и ва женскома уда оканчиваются.
- R. Нъсколько кровавых в сосудов в, кои от в съменных в сосудов в кв маточным в трубам в и кв маткв идутв.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТЬЕ

Показуеть женскій дітородный удо со паграничными его частями, во положеніи, во какомо накодятся оні во время соитія.

- А. Женскій удь вы разширенномы его состояніи.
- В. Большая кровавая жила.
- С. Боевыя и чувственныя жилы.
- D. Крайніе концы печуристых в твав дътороднаго уда, отдвленных в отв лобковых в костей.
- Подъемлющія дъшороднаго уда мышки.
- Бедры дътороднаго уда въ наполненномъ состояніи.
- G. От кровавых в дътороднаго уда сосудов в разширенное печуристое тъло.

# ИЗЪЯСНЕНІЕ ПЯТАГО РИСУНКА.

#### изображение первое.

Представляеть опредъленный для женщинь сприць въ нашуральной его величинъ, который долженъ быть савлань изв слоновой кости. А. Задняя часть онаго, которая должна быть плотно сдълана, дабы пистонь Е. тымь удобные могь движимъ быть. В. Передняя трубка, которая должна быть сдълана изъ плотней слоновой кости, я въ которой должень быть узкой каналь просверлень, такь какь видно изъ пунктованных в диній С., и которая вь концв D. можешь имьть разные выходы. Сїя часть должна св заднею плошно сеинчена бышь, и въ F. совершенно смыкапиься.

Когда должно будеть впрыскивать вы маточное влагалище, то должны вы концъ инструмента просветлены быть дирочки, дабы впрыскиваемая влага вошла вы разныя морщины онаго. Ежели же опредълено впрыскивание для машки, то довольно одного отверстия въ срединъ, а прочия можно тогда залъпить воскомъ.

#### ИЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРОЕ

Представляеть обыкновенный сприць изы слоновой кости, который такь принаровлень, чтобы входиль вы гибкой катетеры. А. Сприцы. В. Гибкой катетеры. С. Серебреная проволока, которая входить вы катетеры. В. Трубочка сприца, которая можеть вы случать нужды привинчена быть.

#### **UZOBPAKEHIE TPETER**

Изображаешь прямой лькарской ножичекь, кошорый весьма удобень кь ошнятию мужескаго члена для кастрации и ш. д.

### ИЗОБРАЖЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Покатуеть кривой лъкарской ножичекь, который снабдень головаою, которая есть продолжение тупика сего инструмента и служить вывсто кондуктора. Онь есть наилучшій инструменть ко вскрытію фистулозных в каналовь, или вь заднепроходной фистуль, или вь язвъ вь такь.

#### изображение пятое

Представляеть инцизіонной ланцеть для вскрытія нарывовь вообще, бубоновь, опухлыхь ядерь и т. д. Ръжущая часть инструмента должна быть гладка и остра.

#### изображение шестое

Изображаеть подвязку шулять, посредствомы которой ядра вы опухоли оныхь, или вы другихь вы тулятахь случайностяхь, могуть поддержены быть. А. Повязка вокругь живота, которая должна быть прежде повязана. В. Повязки поддерживающія. С. Сумка, вы которую ядра вкладываются. Пунктированныя линеи D. показують, что часть В. должна проходить сквозь часть сумки. С. F. Наложенная подвязка съ переди. G. Подвязка съ зади, для показанія, что оная въ испражненіи не препятствуеть.

# изображение седьмое

Представляеть натуральную величину сумки, которая ничто иное есть, какь вдвое сложенная холстина, вы краяхы А. сщитая, а вы верьху В. и вы низу С. отверстая.

#### изображение осьмое.

Подвязка обыкновеннаго роду.

# изображение девятое

Представляещо некоторыя избобыкновениейщихо недугово костей.


- А. Здоровая кость.
- В. Отщепляющаяся кость.
- С. Головка косши въ костныхъ на-

Часть III. Фф


- D. Костный выростокъ.
- E. Выростокь, наполненный ракообразнымь растъниемь.
- F. Выросток в кости рода гуммов в который от в самой кости от личается.





РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 30963-0


























Whet 4304/

